

تست تمرینی بهداشت و اپیدمیولوژی- سلامت دهان و جامعه

پدید آورنده (پدید آورندگان)

مهسا شیری

ناشر

دانش آموختگان تهران

تاریخ انتشار

۱۴۰۰/۶/۸

ویرایش

ویرایش نهم - شهریور ۱۴۰۰

فهرست

• پیشگفتار

• بهداشت عمومی ✓

• سلامت و بیماری ✓

• آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ✓

• نقش سازمان‌های ملی و فراملی در توسعه‌ی سلامت ✓

• کلیات بهداشت محیط ✓

• مروری بر واژه‌های رایج در بهداشت عمومی ✓

• وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری‌های واگیردار کشور ✓

• بررسی و کنترل همه‌گیری‌ها ✓

• تعاریف و اهداف اپیدمیولوژی ✓

• میزان‌های ابتلا ✓

• میزان‌های باروری و مرگ و میر ✓

• سایر شاخص‌های اپیدمیولوژیک و تعریف بیماری و سلامت ✓

• غربالگری ✓

• انواع مطالعات اپیدمیولوژیک ✓

• نسبت‌ها در مطالعات ✓

• مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها ✓

• سطوح پیشگیری ✓

• جمعیت‌شناسی پزشکی ✓

• بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اولیه

• سطوح مراقبت‌های بهداشتی

• تاریخچه‌ی بهداشت حرفه‌ای در جهان، ایران و اصول بهداشت حرفه‌ای

• اهداف بهداشت حرفه‌ای

• راه‌های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه‌ای

• نقش بهداشت حرفه‌ای در توسعه‌ی پایدار

• پیشنهادها: ایمنی کار و خطرات و بیماری‌های ناشی از کار

• روش‌های پیشگیری از بارداری

• بهداشت باروری

• تغذیه با شیر مادر

• رشد و نمو کودکان و بلوغ

• بهداشت روان

• واکسیناسیون

• بهداشت دهان و دندان

پیشگفتار :

این کتاب مجموعه سؤالات ۲۰۸ امتحان علوم پایه‌ی پزشکی و دندان‌پزشکیه که بر حسب مبحث طبقه‌بندی شده و با پاسخ کلیدی یا تشریحی در اختیار شما قرار گرفته. ۲۰۸ امتحان یعنی از تمام امتحان‌های علوم‌پایه‌ی قطبی از شهریور ۹۳ تا شهریور ۹۸ + امتحان‌های میان‌دوره و پایان‌دوره‌ی کشوری تا خرداد ۱۴۰۰.

آپدیت جدید تست تمرینی شامل این موارد:

۱- جواب کلیدی همه‌ی تستا بازبینی و ایرادات اصلاح شد

۲- سؤالات تکراری ادغام شدن

۳- سؤالات مهم با علامت مشخص شدن و یه جواب کوتاه بهشون اضافه شد که اگه بلد نبودى نیاز نباشه برگردى به کتاب

۴- میزان اهمیت مباحث و جاهای کلیدیش مشخص شده

۵- سؤالات جدید کشوری دی ۹۹، اسفند ۹۹ و خرداد ۱۴۰۰ با پاسخ کوتاه اضافه شد

بهداشت عمومی

تعداد سوالات: ۹

درجه سختی: آسان

نکته پرتکرار: ازدیاد جمعیت جوان جز چالش پیش روی سیاست گذاری بهداشت عمومی نیست

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

تمامی گزینه‌های زیر در مفهوم بهداشت عمومی مطرح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 تأمین راه کامل مادی

گزینه 2 مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری

گزینه 3 تأمین و ارتقای تندرستی انسان‌ها

گزینه 4 حفظ توانمندی بشر

نمایش پاسخ

الف

سوال 2

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مهم‌ترین چالش‌ها و خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم غلط است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 جوانی جمعیت به دلیل رشد روزافزون آن

گزینه 2 افزایش میزان حوادث غیر مترقبه‌ی طبیعی

گزینه 3 بروز جنگ‌های منطقه‌ای و تبعات فاجعه‌بار انسانی آن

گزینه 4 آلودگی‌های رو به افزایش زیست محیطی

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

کدامیک از گزینه‌های زیر جزء دامنه‌ی فعالیت‌های بهداشت عمومی نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 آموزش بهداشت عمومی

گزینه 2 بهداشت محیط

گزینه 3 بهداشت فردی

گزینه 4 بهداشت سالمندان

نمایش پاسخ

ج

سوال 4

کدامیک از گزینه‌های زیر جزء چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاری بهداشت عمومی نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 ازدیاد جمعیت جوان

گزینه 2 بروز جنگ‌های منطقه‌ای

گزینه 3 داروهای اعتیادآور و مواد مخدر

گزینه 4 افزایش حوادث غیر مترقبه

نمایش پاسخ

الف

سوال 5

کدامیک از گزینه‌های زیر از مهم‌ترین چالش‌ها و خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم میلادی به شمار نمی‌رود؟ (پزشکی شهریور ۹۷-
قطب شیراز)/(پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 افزایش میزان حوادث غیر طبیعی

گزینه 2 آلودگی رو به افزایش زیست محیطی

گزینه 3 افزایش جمعیت جوان

گزینه 4 بروز جنگ‌های منطقه‌ای

نمایش پاسخ

ج

سوال 6

کدام مورد زیر جزء چالش‌های مهم موجود در سیاست‌گذاری عمومی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت در هزاره‌ی سوم میلادی نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب
همدان)

گزینه 1 بروز جنگ‌های منطقه‌ای

گزینه 2 جوان بودن جمعیت در کشورهای در حال توسعه

گزینه 3 مواد مخدر و داروهای اعتیادآور

گزینه 4 آلودگی‌های رو به افزایش زیست محیطی

نمایش پاسخ

ب

سوال 7

براساس رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت، کدام گزینه جزء مهم‌ترین چالش‌ها و خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم میلادی است؟
(پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 عدم پیشگیری و کنترل مناسب بیماری سل

گزینه 2 عدم کنترل مرگ مادر و کودک در برخی کشورها

گزینه 3 افزایش فقر و سوءتغذیه در مناطقی از جهان

گزینه 4 افزایش میزان حوادث غیر مترقبه‌ی طبیعی

نمایش پاسخ

د / بهداشت عمومی یعنی مجموعه‌ی دانش و هنر پیشگیری از بیماری‌ها و تأمین حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی. افزایش میزان
حوادث غیر مترقبه‌ی طبیعی جزء مهم‌ترین چالش‌ها و خطرات موجود در سیاست‌گذاری بهداشت عمومی در هزاره‌ی سوم میلادی است.

سوال 8

کدام مورد زیر در باره عفونت بیمارستانی صحیح نیست؟(دندان‌پزشکی و پزشکی شهریور۹۹- کشوری)

گزینه 1 بیمار هنگام پذیرش بیمارستان دچار این عفونت نمی‌باشد.

گزینه 2 لایم عفونی بیماری ممکن است پس از ترخیص بیمار ظاهر شود

گزینه 3 منشا عفونت از تجهیزات و خدمات بیمارستانی است

گزینه 4 بیمار هنگام پذیرش در دوره کمون این بیماری عفونی بوده است

نمایش پاسخ

د / از آنجایی که منشا عفونت از بیمارستان می‌باشد دال غلط است.

سوال 9

اصلی‌ترین هدف آموزش بهداشت چیست؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹ – میان‌دوره)

گزینه 1 ارزیابی دانسته‌ها و باورهای مردم

گزینه 2 بررسی راهکارهای حل مشکلات بهداشتی

گزینه 3 آموزش رفتارهای سالم و بهداشتی

گزینه 4 برانگیختن حس مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی

نمایش پاسخ

د / برانگیختن حس مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی اصلی‌ترین هدف آموزش است.

سلامت و بیماری

تعداد سوالات: ۷۱

درجه سختی : آسان

نکات پرتکرار:۱- روحیه انتقادپذیری و سازگاری فرد با خود و دیگران و قدرت تطابق با شرایط محیطی و قضاوت صحیح در بر خورد با مسایل جز بعد روانی سلامت است

۲- داشتن هدف و صبر برای رسیدن به هدف و پابندی اخلاقی و تعاون داشتن و حسن ظن و توجه به مسایل معنوی و انعطاف پذیری و داشتن هدفی مشخص جز بعد معنوی سلامت است

۳- طیف سلامت:سلامتی کامل- سلامتی نسبی- بیماری خفیف-بیماری متوسط- بیماری شدید- بیماری کشنده- مرگ.

۴- سلامت از دیگاه آماری: تمامی مقادیر کمتر وبیشتر از 2 انحراف معیار غیر طبیعی اند.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندانپزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدام جمله در مورد سلامت و بیماری صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شه‌ریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 گاهی شایع بودن یک صفت ناهنجار به خصوص در بعد روانی و یا اجتماعی باعث می‌شود که به عنوان یک وضعیت نرمال تلقی شود.

گزینه 2 در الگوی آماری تمام مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از یک انحراف معیار از میانگین غیر طبیعی است. (با فرض توزیع نرمال)

گزینه 3 مفهوم سلامتی مطلق است و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مفهوم آن یکسان است.

گزینه 4 تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت یک تعریف ایده‌آل و دست یافتنی است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 2

از نظر سازمان جهانی بهداشت تعریف سلامتی عبارت است از: (دندان‌پزشکی شه‌ریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 رفاه کامل جسمی- روانی

گزینه 2 نبودن بیماری و نقص عضو

گزینه 3 تأمین و حفظ و ارتقای تندرستی

گزینه 4 سالم‌سازی محیط‌زیست، بیماریابی و مهار بیماری‌های واگیر

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

در تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت، به کدامیک از ابعاد سلامتی اشاره نشده است؟ (پزشکی شه‌ریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 معنوی

گزینه 3 اجتماعی

گزینه 4 روانی

نمایش پاسخ

ب

سوال 4

کدامیک از ابعاد سلامتی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت گنجانده نشده است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 روانی

گزینه 3 اجتماعی

گزینه 4 روحی (معنوی)

نمایش پاسخ

د

سوال 5

بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ی طیف سلامتی و بیماری به ترتیب عبارت است از: (دندان‌پزشکی شه‌ریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 مرگ- سلامت نسبی

گزینه 2 سلامت کامل- بیماری غیر آشکار

گزینه 3 سلامت کامل- مرگ

نمایش پاسخ

ج

سوال 6

در خصوص تعریف سلامت از دیدگاه آماری همه‌ی گزینه‌های زیر درست است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 فراوان‌ترین رویداد یا عادی‌ترین حالت طبیعی اطلاق می‌شود.

گزینه 2 تمام مقادیر کم‌تر یا بیش‌تر از دو انحراف معیار غیر طبیعی قلمداد می‌شود.

گزینه 3 از اشکالات این تعریف این است که همه‌ی پدیده‌ها توزیع نرمال ندارند.

گزینه 4 از مشخصات این تعریف این است که در همه‌ی مکان‌ها قابل استفاده است.

نمایش پاسخ

د

سوال 7

طیف سلامت و بیماری به ترتیب کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 سلامت کامل، سلامت نسبی، بیماری خفیف

گزینه 2 سلامت کامل، سلامت نسبی، بیماری متوسط

گزینه 3 سلامت کامل، سلامت نسبی، بیماری غیر آشکار

گزینه 4 سلامت نسبی، سلامت کامل، بیماری خفیف

نمایش پاسخ

ج

سوال 8

داشتن قوه‌ی قضاوت صحیح در برخورد با مسایل از نشانه‌های سلامتی در کدام بعد است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 بعد جسمی

گزینه 2 بعد روانی

گزینه 3 بعد اجتماعی

گزینه 4 بعد معنوی

نمایش پاسخ

ب

سوال 9

هدف‌دار بودن زندگی، پابندی اخلاقی و تعاون مشخص کننده، کدامیک از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 اجتماعی

گزینه 2 معنوی

گزینه 3 روانی

گزینه 4 جسمی

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن عکس‌العمل مناسب در برابر مشکلات و حوادث زندگی جنبه مهمی از کدام بعد سلامتی را مدنظر قرار داده است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 بعد جسمی

گزینه 2 بعد معنوی

گزینه 3 بعد روانی

گزینه 4 بعد اجتماعی

نمایش پاسخ

ج

سوال 11

قدرت تطابق با شرایط محیطی کدامیک از ابعاد سلامت را شامل می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 بعد جسمی

گزینه 2 بعد اجتماعی

گزینه 3 بعد روانی

گزینه 4 بعد معنوی

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

کدامیک از موارد زیر از معایب تعریف آماری نرمال از سلامت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 در این روش افراد به دو جمعیت طبیعی و غیر طبیعی (بیمار و سالم) تقسیم می‌شوند.

گزینه 2 تمام صفات تابع توزیع نرمال هستند.

گزینه 3 عملاً دست نیافتنی است.

گزینه 4 باید برای هر جامعه جداگانه تعیین شود.

نمایش پاسخ

د

سوال 13

کدامیک از موارد زیر از معایب تعریف آماری نرمال برای سلامت محسوب نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 تمام مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از دو انحراف معیار از میانگین، غیر طبیعی تلقی می‌شوند.

گزینه 2 شایع بودن یک صفت الزاماً دلیل بر طبیعی بودن آن صفت نیست.

گزینه 3 تمام صفات تابع توزیع نرمال نیستند.

گزینه 4 باید برای هر جامعه جداگانه تعیین شود.

نمایش پاسخ

الف

سوال 14

معمولی‌ترین بعد سلامتی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 روانی

گزینه 2 جسمی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 15

سازگاری افراد با خود و داشتن روحیه انتقادپذیری از نشانه‌های کدام بعد سلامت است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 اجتماعی

گزینه 2 معنوی

گزینه 3 جسمی

گزینه 4 روانی

نمایش پاسخ

د

سوال 16

داشتن روحیه‌ی انتقادپذیری از نشانه‌های سلامتی در کدام بعد است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 معنوی

گزینه 2 شغلی

گزینه 3 اجتماعی

گزینه 4 روانی

نمایش پاسخ

د

سوال 17

در صورتی که فرد قدرت تطابق با شرایط محیطی و سازگاری با خودش را داشته باشد، کدام بعد از سلامتی و رفاه را برخوردار است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 روانی

گزینه 2 روحی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 جسمی

نمایش پاسخ

الف

«سازگاری فرد با خودش و دیگران» کدام بعد از ابعاد سلامتی را نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 فرهنگی

گزینه 2 اجتماعی

گزینه 3 روانی

گزینه 4 معنوی

نمایش پاسخ

ج

داشتن هدف در زندگی، از نشانه‌های سلامتی در کدام بعد است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 بعد اجتماعی

گزینه 2 بعد روانی

گزینه 3 بعد شغلی

گزینه 4 بعد معنوی

نمایش پاسخ

د

تلاش برای اهداف عالی‌تر زندگی و تحمل مشکلات و بردباری بیش‌تر به کدامیک از ابعاد سلامت ارتباط پیدا می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 روانی

گزینه 2 جسمی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ج

ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط و محیط شغلی جزء کدامیک از ابعاد سلامت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 روانی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

د

از بین عوامل مؤثر بر سلامت (Determinants of health)، «طبقه‌ی اجتماعی فرد» جزء کدامیک از عوامل زیر به حساب می‌آید؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 عوامل محیطی

گزینه 2 شیوه‌ی زندگی مردم

گزینه 3 عوامل ژنتیکی و فردی

گزینه 4 وسعت و کیفیت ارائه‌ی خدمات

نمایش پاسخ

ج

کدامیک جزء تعیین کننده‌های اجتماعی سلامتی تعیین می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 جنس

گزینه 2 امنیت

گزینه 3 شیوه‌ی زندگی

گزینه 4 تغذیه

نمایش پاسخ

ب

همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص عوامل مؤثر بر سلامتی صحیح است بیچیز (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت تأثیر دارد.

گزینه 2 بیماری‌های غیر قابل انتقال و مزمن در سنین بالا شیوع بیش‌تری دارند.

گزینه 3 به طور کلی «گزارش بیماری» در مردان و «مرگ و میر» در زنان بیش‌تر است.

گزینه 4 نوع بیماری‌ها، شدت بیماری‌ها و مرگ و میر ناشی از آن‌ها در سنین مختلف متفاوت است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 25

اگر بخواهیم سلامتی را براساس توزیع نرمال از دیدگاه آمار تعریف کنیم، کدام گروه از افراد جامعه‌ی غیر طبیعی در نظر گرفته می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 تمام مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از دو انحراف معیار از میانگین

گزینه 2 تمام مقادیر کم‌تر و بیش‌تر از یک انحراف معیار از میانگین

گزینه 3 فراوان‌ترین رویداد با عادی‌ترین حالت

گزینه 4 افرادی که در محدوده‌ی ۶۸ درصد حول میانگین قرار می‌گیرند

نمایش پاسخ

الف

سوال 26

«سازگاری فرد با خود و دیگران، قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل» جزء کدام بعد از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 روانی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 27

قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسایل، زیر مجموعه‌ی کدامیک از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 جسمانی

گزینه 2 روانی

گزینه 3 اجتماعی

گزینه 4 معنوی

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

کدامیک از موارد زیر از معایب الگوی آماری سلامت نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 همه‌ی پدیده‌های فیزیولوژیک منحنی استاندارد (نرمال) ندارند.

گزینه 2 بیماری و سلامت به صورت نسبی سنجیده می‌شود.

گزینه 3 همیشه عده‌ای از مردم بسیار تلقی می‌شوند.

گزینه 4 قابل تعمیم به همه‌ی جوامع نیست

نمایش پاسخ

ب. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 29

«گردآوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و انتشار به هنگام، مستمر و منظم داده‌های مربوط به سلامتی» تعریف کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 وقایع حیاتی

گزینه 2 نظام مراقبت

گزینه 3 نظام اطلاعات بیمارستانی

گزینه 4 موردیابی

نمایش پاسخ

ب

سوال 30

در surveillance (مراقبت) برای یک بیماری چه اقدامی انجام می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 از بین بردن عامل بیماریزا در جامعه

گزینه 2 جلوگیری از سرایت بیماری به دیگران

گزینه 3 حضوری بیماری تا حدی که باعث مشکل سلامتی نشود.

گزینه 4 غربالگری موارد پنهان بیماری

نمایش پاسخ

ب

سوال 31

از دست دادن یا کشیدن دندان معادل کدامیک از مراحل طیف سلامت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 بیماری غیر آشکار

گزینه 2 بیماری خفیف

گزینه 3 مرگ

گزینه 4 سلامت کامل

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت، آسایش کامل در کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد تأکید قرار نگرفته است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 معنوی

گزینه 3 روانی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 33

محورهای سلامت از دیدگاه سازمان جهانی سلامت به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 نبود نقص عضو- جامعه، روان

گزینه 2 نبود نقص عضو- روان، جسم

گزینه 3 جسم، روان، جامعه

گزینه 4 جسم، روان، عاطفه

نمایش پاسخ

ج

سوال 34

کدامیک از مزایای اولیه‌ی WHO از سلامت محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 ارائه‌ی تعریف عملی و کلی نگر برای سلامت

گزینه 2 توجه به نیازهای تعریف شده توسط افراد حرفه‌ای

گزینه 3 توجه به ابعاد دیگری از سلامت بجز سلامت جسمی

گزینه 4 تمرکز بر سیستم دندان‌ی راحت و دارای عملکرد

نمایش پاسخ

ج

سوال 35

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت، کدام گزینه از مزایای آن محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 آرمان‌گرایانه است

گزینه 2 تعریف گسترده‌ای از سلامت دارد

گزینه 3 استانداردهای سلامتی مثبت را تعریف می‌کند

گزینه 4 همه‌ی ما با این تعریف به نحوی بیمار هستیم

نمایش پاسخ

ج

سوال 36

همه‌ی موارد زیر جزء ابعاد اصلی سلامت، براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی محسوب می‌شود، بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 روحی

گزینه 3 روانی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 37

«وضعیت تعادل بین فرد و محیط افراد و توانایی پاسخ دادن به تجربیات متنوع زندگی با انعطاف‌پذیری» به کدام بعد سلامتی می‌پردازد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷-
قطب شیراز)

گزینه 1 جسمانی

گزینه 2 اجتماعی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 روانی

نمایش پاسخ

د

سوال 38

کدامیک از موارد زیر سلامت را به صورت عملکردی تعریف می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 نبود بیماری

گزینه 2 تناسب اندام

گزینه 3 توانایی انجام دادن فعالیت‌های روزمره

گزینه 4 رفاه

نمایش پاسخ

ب

سوال 39

معیارهای یک مشکل سلامت جامعه براساس همه‌ی گزینه‌های زیر تعیین می‌شود، بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 شیوع بیماری

گزینه 2 تأثیر بیماری در سطح فردی

گزینه 3 تأثیر بر سطحی وسیع‌تر در جامعه

گزینه 4 فقدان درمان‌های مؤثر برای بیماری

نمایش پاسخ

د. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 40

هرگونه انحراف، خواه عینی، خواه ذهنی از آسایش جسمی یا روانی را چه می‌نامند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 بیماریزایی

گزینه 2 ابتلا

گزینه 3 حدت

گزینه 4 طغیان

نمایش پاسخ

ب

سوال 41

سازگاری فرد با خود، چه بعدی از سلامتی را نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 روانی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ب. سازگاری فرد با خود و قضاوت صحیح در برخورد با مسائل نشان دهنده‌ی سلامت روانی است.

سوال 42

رضا مردی ۳۰ ساله که مدتی به دلایل مشکلات فراوانی که در زندگی او پیش آمده احساس پوچی و بیهودگی می‌کند و تزلزل روحی دارد، کدامیک از ابعاد سلامتی او دچار اختلال شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 روحی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 شغلی

نمایش پاسخ

ج. ایمان و هدف‌دار بودن زندگی نشان دهنده‌ی سلامت روحی و معنوی است.

سوال 43

کدامیک از موارد زیر بیش‌ترین سهم را در میان تعیین کننده‌های سلامتی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 عوامل اجتماعی

گزینه 2 ژنتیک

گزینه 3 عوامل رفتاری

گزینه 4 دسترسی به خدمات درمانی

نمایش پاسخ

الف. در بین عوامل تعیین کننده‌ی سلامتی عوامل اجتماعی بیش‌ترین سهم را دارند.

سوال 44

در تعریف «گرین» از آموزش بهداشت بر کدامیک از موارد زیر تأیید شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 ترکیبی از روش‌های آموزشی مختلف

گزینه 2 تغییر رفتارهای زیان‌بخش افراد به رفتارهای سودبخش

گزینه 3 پرکردن شکاف بین دانش و رفتار

گزینه 4 ترکیبی از تلاش‌ها برای ایجاد محیط‌های حامی سلامت

نمایش پاسخ

الف. ترکیبی از روش‌های آموزشی مختلف در تعریف «گرین» از آموزش بهداشت تأیید شده است.

سوال 45

کدامیک از گزینه‌های زیر به مثانه رویکرد «چسب زخم» برای مشکلات بهداشتی جامعه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 آموزش سلامت

گزینه 2 ارتقاء سلامت

گزینه 3 درمان بیماری

گزینه 4 پیشگیری

نمایش پاسخ

ج. چسب زخم بعد از بوجود آمدن مشکل کاربرد دارد و همانند درمان بیماری است.

سوال 46

در فرآیند ابتلای انسان به بیماری‌هایی که محیط در آن نقش دارد، کدام ارکان اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 آب- هوا- موادغذایی

گزینه 2 ویروس‌ها- تک یاخته‌ها- باکتری‌ها

گزینه 3 منبع- نحوه‌ی انتقال- حساسیت میزبان

گزینه 4 گیاهان- جانوران- مواد شیمیایی

نمایش پاسخ

ج. در ابتلای انسان به بیماری‌هایی که محیط در آن نقش دارد منبع- نحوه‌ی انتقال- حساسیت میزبان نقش مهمی دارند.

سوال 47

هدف‌دار بودن زندگی، پایبندی اخلاقی، داشتن حسن ظن، نشانگر کدام بعد از ابعاد سلامتی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 جسمی

گزینه 2 روانی

گزینه 3 معنوی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ج / ایمان و هدف‌دار بودن زندگی نشان دهنده‌ی سلامت روحی و معنوی است.

سوال 48

همه‌ی موارد زیر معایب الگوی آماری در تعیین سلامت به شمار می‌آید، بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 باید برای هر جامعه جداگانه تعیین گردد.

گزینه 2 بعضی صفات، تابع توزیع نرمال هستند.

گزینه 3 تکیه‌ی آن بر خصوصیات غیر طبیعی است.

گزینه 4 شایع بودن یک صفت ناهنجار ممکن است طبیعی تلقی می‌شود.

نمایش پاسخ

ج / معایب الگوی آماری در تعیین سلامت: باید برای هر جامعه جداگانه تعیین گردد و بعضی صفات، تابع توزیع نرمال هستند و شایع بودن یک صفت ناهنجار ممکن است طبیعی تلقی می‌شود.

سوال 49

همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص تأثیر عوامل فردی بر سلامت صحیح است بجز؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 به طور کلی گزارش بیماری در زنان بیش‌تر است

گزینه 2 مرگ و میر و شدت بیماری‌ها در سنین مختلف، متفاوت است

گزینه 3 به طور کلی مرگ و میر در مردان بیش‌تر است

گزینه 4 بیماری‌های قابل انتقال در سنین بالا، شیوع بیش‌تری دارند

نمایش پاسخ

د / بیماری‌های قابل انتقال در سنین بالا، شیوع کم‌تری دارند.

سوال 50

کدام گزینه‌ی زیر جزء فاکتورهای غیر قابل تعدیل بیماری‌های قلبی- عروقی قرار می‌گیرد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 هیپرتروفی بطن چپ

گزینه 2 سطح اجتماعی اقتصادی پایین

گزینه 3 بی‌تحریکی

گزینه 4 چاقی

نمایش پاسخ

ب / سطح اجتماعی اقتصادی پایین و جنس و نژاد جزء فاکتورهای غیر قابل تعدیل بیماری‌های قلبی- عروقی قرار می‌گیرند.

سوال 51

«سازگاری فرد با خود و دیگران و قضاوت صحیح در برخورد با مسائل» مربوط به کدام بعد سلامتی است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 بعد معنوی

گزینه 2 بعد جسمی

گزینه 3 بعد اجتماعی

گزینه 4 بعد روانی

نمایش پاسخ

د / سازگاری فرد با خود و قضاوت صحیح در برخورد با مسائل و قدرت تطابق با شرایط محیطی نشان دهنده‌ی سلامت روانی است.

سوال 52

کدام گزینه در خصوص طیف سلامتی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 مرز بین سلامتی و بیماری را مشخص می‌کند.

گزینه 2 به طبقه‌بندی مداخلات پزشکی کمک می‌کند.

گزینه 3 در یک طیف آن سلامتی نسبی و در مقابل آن مرگ قرار دارد

گزینه 4 بعد از بیماری آشکار، مرگ قرار می‌گیرد

نمایش پاسخ

ب. سلامت و بیماری مرز مشخصی ندارد. پس بهتره برای سلامتی یه طیف در نظر بگیریم که یک طرفش سلامت کامل و طرف دیگرش مرگه.

سوال 53

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با تعریف سلامتی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی واقع‌گرایانه است.

گزینه 2 تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامتی یک تعریف نسبی نیست.

گزینه 3 به واسطه‌ی این تعریف می‌توان سلامتی را اندازه گرفت.

گزینه 4 مفهوم سلامتی، براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی استانداردهای سلامتی مثبت را تعیین نمی‌کند.

نمایش پاسخ

گزینه ب و ج

سوال 54

توانایی پاسخ‌گویی به تجربیات گوناگون با انعطاف‌پذیری و داشتن هدفی مشخص کدام بعد از ابعاد سلامت را تعریف می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 روانی

گزینه 2 اجتماعی

گزینه 3 روحی

گزینه 4 احساسی و عاطفی

نمایش پاسخ

ج. تعریف سلامت از بعد روحی (معنوی): داشتن هدف / صبر و بردباری برای رسیدن به هدف / پایبندی اخلاقی، تعاون، داشتن حسن ظن، توجه بیشتر به مسائل

معنوی

سوال 55

مفهوم «توانایی شکل دادن و حفظ روابط» به کدام بعد از سلامت نزدیک‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 سلامت روانی (mental)

گزینه 2 سلامت اجتماعی (social)

گزینه 3 سلامت روحی (spiritual)

گزینه 4 سلامت جامعه‌ای (societal)

نمایش پاسخ

ب. توانایی ایجاد و حفظ روابط مربوط به بعد اجتماعی سلامتی است. اینایی که هی کات می‌کنن مریضن آقا مریض!

سوال 56

کدام‌یک از موارد زیر مفهوم سلامت را به صورت عملکردی بیان می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 نبود بیماری

گزینه 2 توانایی انجام دادن فعالیت‌های روزمره

گزینه 3 تناسب اندام

گزینه 4 رفاه

نمایش پاسخ

ب

سوال 57

تعریف سلامت (نرمال) از دیدگاه آماری چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 میانگین آماری بعلاوه یا منهای یک انحراف معیار از حدود میانگین

گزینه 2 نبود نشانه‌های آسیب شناسانه

گزینه 3 وجود نشانه‌های آسیب شناسانه

گزینه 4 میانگین آماری بعلاوه یا منهای دو انحراف معیار از حدود میانگین

نمایش پاسخ

دال. کلا اینو یادت باشه همیشه از نظر آماری نرمال اینه: میانگین آماری بعلاوه یا منهای دو انحراف معیار از حدود میانگین. کلید اشتباهی الف زده بود

سوال 58

کدامیک از گزینه‌های زیر در رابطه با تعریف عملی سلامتی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 تعریفی که سازمان جهانی بهداشت در مقدمه‌ی اساسنامه‌ی خود ارائه کرده است، یک تعریف عملی از سلامتی است.

گزینه 2 تعریف عملی سلامتی تعریفی است که می‌توان به واسطه‌ی آن سلامتی را اندازه گرفت.

گزینه 3 مفهوم بیومدیکال از سلامتی را می‌توان به عنوان تعریف عملی از سلامتی پذیرفت.

گزینه 4 شرایطی را که بدن، ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصاً اینکه از هر گونه بیماری یا درد جسمی رها باشد، تعریف عملی سلامتی است.

نمایش پاسخ

ب. یک ایراد تعریف عملی یا بالینی سلامتی این است که بر مبنای تظاهرات بالینی است و فقط شامل مواردی است که قابل اندازه گیری است.

سوال 59

تعریف سلامت اجتماعی (Social health) به عنوان یکی از ابعاد سلامت چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 نیاز به ایجاد هدف در زندگی که به تصمیم‌گیری کمک کند

گزینه 2 توانایی فکر کردن به شکل منسجم و هدف‌دار و پرورش دانش و مهارت‌های زندگی

گزینه 3 برقراری و حفظ ارتباط سالم با دیگران به نحوی که برای جامعه قابل قبول باشد

گزینه 4 درک موقعیت‌های مناسب و وفق دادن خود با شرایط ایجاد شده

نمایش پاسخ

ج. ازون سوالاست که نیاز به هیچ سوادى نداره. گزینه‌ی جیم داد می‌زنه

سوال 60

جمله‌ی زیر مربوط به کدام تعریف سلامت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز)

«سلامت حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی است»

گزینه 1 فرهنگ آکسفورد

گزینه 2 فرهنگ وبستر

گزینه 3 طب سنتی

گزینه 4 WHO

نمایش پاسخ

د. تعریف who از سلامت یه تعریف ایده‌آل و مربوط به همه‌ی زمینه‌هاست. اصلا این به کنار. به جز who کسی سلامتی رو تعریف نمی‌کنه! بقیه گزینه‌ها رو دوباره ببین!

سوال 61

تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 یک حالت وجود داشتن سلامتی، نبود بیماری

گزینه 2 دارا بودن مقاومت درونی در برابر بیماری

گزینه 3 برخورداری از آسایش کامل جسمی و نبود نقص عضو

گزینه 4 برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو

نمایش پاسخ

د. تعریف who از سلامتی: برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو

سوال 62

کدام گزینه از عوامل اجتماعی تعیین کننده‌ی سلامت نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 حمایت اجتماعی

گزینه 2 اشتغال

گزینه 3 سواد

گزینه 4 ژنتیک

نمایش پاسخ

د. عوامل اجتماعی تعیین کننده‌ی سلامت شامل ایناست: شرایط زندگی، امکانات و حمایت‌ها، تسهیلات آموزشی، نحوه‌ی ارتباط، آگاهی، وضعیت اشتغال، امنیت

سوال 63

مطابقه با طبقه‌بندی کوپر (Cooper) کدامیک به مفهوم نیاز (Need) نزدیک‌تر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 تخمین خود یک فرد از خواسته برای سلامت

گزینه 2 خواسته یک فرد از یک فرد حرفه‌ای برای کسب سلامت

گزینه 3 وضعیتی که یک فرد عادی در امر سلامت آن را به عنوان نیاز می‌شناسد

گزینه 4 وضعیتی که یک فرد حرفه‌ای در امر سلامت آن را به عنوان نیاز می‌شناسد

نمایش پاسخ

د. حفظ کن!

سوال 64

کدامیک از دو مورد زیر به تعریف اولیه‌ی سازمان جهانی بهداشت از سلامت در سال ۱۹۴۸ اضافه شد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 ابعاد سلامت احساسی و معنوی

گزینه 2 ابعاد سلامت جسمی و روانی

گزینه 3 ابعاد سلامت احساسی و روانی

گزینه 4 ابعاد سلامت جسمی و معنوی

نمایش پاسخ

الف / صورت سوال که ایراد داره و باید بگه کدام دو مورد زیر! سلامت قبلا شامل ابعاد جسمی، اجتماعی و روانی بود. بعداً معنوی و احساسی هم اضافه شد ۸۴۱

سوال 65

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد تعاریف سلامت صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 تعریف سلامت، از شرایط گوناگون فرهنگی و جغرافیایی تاثیر می‌پذیرد.

گزینه 2 بر اساس تعریف آماری سلامت، شایع بودن یک صفت ناهنجار روانی در جامعه طبیعی تلقی نمی‌شود.

گزینه 3 پویایی روند سلامت، تاثیری در مفهوم آن در طی زمان ندارد.

گزینه 4 در الگوی آماری تعریف سلامت، تمام مقادیر کمتر و بیشتر از دو انحراف معیار از میانگین، طبیعی است.

نمایش پاسخ

الف / سلامت از شرایط مختلف فرهنگی و جغرافیایی تاثیر می‌پذیرد.

سوال 66

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد تعریف شیوع دوره‌ای بیماری صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص، به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.

گزینه 2 تعداد کل افرادی که در یک لحظه زمانی مشخص، به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.

گزینه 3 تعداد کل افرادی که در هر زمانی طی یک‌سال مبتلا به بیماری یا خاصه موردنظر بوده‌اند.

گزینه 4 تعداد افرادی که حداقل در دوره ای از حیات خود به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.

نمایش پاسخ

الف / تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص، به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.

سوال 67

در چارچوب خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی کدامیک از مداخلات زیر در مورد «بیماری اسهال» مداخله ارتقای محسوب می‌شود؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹-
کشوری)

گزینه 1 تأمین امنیت غذایی

گزینه 2 تغذیه با شیر مادر

گزینه 3 مایع درمانی خوراکی

گزینه 4 آموزش بهداشت فردی

نمایش پاسخ

الف تأمین امنیت غذایی در مورد «بیماری اسهال» مداخله ارتقای محسوب می‌شود.

سوال 68

تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت چیست؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی ۹۹-میان دوره)

گزینه 1 سلامت، سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی انجام می‌شود.

گزینه 2 سلامت، عبارت از وجود نسبت معینی از عناصر گرمی، سردی، رطوبت و خشکی است.

گزینه 3 سلامت بدن، حالتی است که اعمال سیر طبیعی خود را داشته باشند.

گزینه 4 سلامت عبارت است از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی.

نمایش پاسخ

د / سلامت عبارت است از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی.

سوال 69

کدام یک از موارد زیر از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامتی به شمار می‌روند؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی ۹۹-میان دوره)

گزینه 1 وضعیت اقتصادی، اجتماعی، اعتقادات

گزینه 2 اعتقادات، سنت‌ها و تعصبات

گزینه 3 هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی

گزینه 4 تمام موارد فوق

نمایش پاسخ

د- وضعیت اقتصادی، اجتماعی، اعتقادات، اعتقادات، سنت‌ها و تعصبات ، هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی همگی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامتی به شمار می‌روند.

سوال 70

کدام یک از گزینه‌های زیر، در مورد تعاریف و مفاهیم سلامتی صحیح است؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 ریشه سلامتی اجتماعی در «محیط زیست مادی مثبت» و «محیط زیست انسانی مثبت» است.

گزینه 2 سلامت معنوی (روحی) به معنی توازن بین شخص و دنیای اطراف است.

گزینه 3 بعد روانی سلامت شامل عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر فرد از خود است.

گزینه 4 براساس فلسفه نوین سلامتی، سلامتی به عنوان یک مسئولیت صرفاً اجتماعی است.

نمایش پاسخ

الف / ریشه سلامتی اجتماعی در «محیط زیست مادی مثبت» و «محیط زیست انسانی مثبت» است.

سوال 71

اصلی‌ترین هدف آموزش بهداشت چیست؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹-میان دوره کشوری)

گزینه 1 ارزیابی دانسته‌ها و باورهای مردم

گزینه 2 بررسی راهکارهای حل مشکلات بهداشتی

گزینه 3 آموزش رفتارهای سالم و بهداشتی

گزینه 4 برانگیختن حس مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی

نمایش پاسخ

د- برانگیختن حس مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، اصلی‌ترین هدف آموزش بهداشت است.

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تعداد سوالات: ۷۵

درجه سختی: آسان

نکات: ۱- توجه اصلی فعالیت آموزش بهداشت به تغییر رفتار است ۲- در مرحله ی قصد از مراحل تغییر رفتار فرد قصد انجام کاری را دارد ولی آماده تعهد دادن به آن نیست ۳- در مرحله تدارک از مراحل تغییر رفتار فرد آماده تغییر و برنامه ریزیست ۴- در یادگیری اجتماعی مهمترین نوع یادگیری فراگیری مشاهده استو انسان از مشاهده رفتار دیگران و پیامد آن یاد میگیرد.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

توجه اصلی فعالیت‌های آموزش بهداشت بر کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان/پزشکی شهریور ۹۳_قطب شیراز))

گزینه 1 دانش

گزینه 2 نگرش

گزینه 3 رفتار

گزینه 4 کیفیت زندگی

نمایش پاسخ

ج

سوال 2

کدامیک از گزینه‌های زیر هدف اصلی آموزش بهداشت است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 افزایش طول عمر

گزینه 2 کاهش بار بیماری‌ها

گزینه 3 ارتقای کیفیت زندگی

گزینه 4 تغییر رفتارهای زیان‌بخش

نمایش پاسخ

د

سوال 3

آموزش بهداشت در کدام سطح از اثربخشی بیش‌تری برخوردار است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 سطح گروه‌های جمعیتی

گزینه 2 سطح خانوادگی

گزینه 3 سطح عمومی جامعه

گزینه 4 سطح فردی

نمایش پاسخ

د. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 4

متغیر وابسته‌ی اصلی در اکثر فعالیت‌های آموزش و بهداشت و ارتقای سلامت کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 آگاهی

گزینه 2 نگرش

گزینه 3 ارزش

گزینه 4 رفتار

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

شما به عنوان پزشک خانواده کدامیک از شاخص‌های زیر را جهت برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح سلامت مردم تحت پوشش خود انتخاب نمی‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 شاخص‌های جمعیتی مانند ترکیب سنی و جنسی

گزینه 2 میزان‌های مرگ و میر نوجوانان

گزینه 3 شاخص‌های استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری

گزینه 4 شاخص‌های پوشش مراقبت‌های دوران بارداری

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

برنامه‌های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در کدامیک از محیط‌های زیر قابل اجراء است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 ورزشگاه‌ها- مراکز خرید و بنگاه‌های خیریه

گزینه 2 دانشگاه‌ها- مراکز تحقیقاتی و آموزشی و مدارس

گزینه 3 مساجد، کلیساها و اماکن مذهبی

گزینه 4 همه‌ی موارد

نمایش پاسخ

د

فردی سیگاری، آماده ایجاد تغییر در رفتار خود و برنامه‌ریزی برای ترک سیگار است، طبق الگوی مراحل تغییر، این فرد در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵-
قطب تبریز)

گزینه 1 تدارک

گزینه 2 حفظ

گزینه 3 پیش قصد

گزینه 4 قصد

نمایش پاسخ

الف

ثبت نام در کلینیک ترک اعتیاد به منظور برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف رفتاری مطلوب براساس «الگوی مراحل تعیین»، در کدام مرحله قرار می‌گیرد؟ (پزشکی
اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

ج

فردی برنامه‌ریزی کرده است که از ابتدای ماه آینده در کلاس‌های ترک سیگار شرکت کند و از مصرف سیگار خودداری نماید. وی در کدام مرحله از تغییر رفتار قرار دارد؟
(پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 قصد

گزینه 2 پیش قصد

گزینه 3 عمل

گزینه 4 تدارک

نمایش پاسخ

د

کدامیک از الگوهای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با ارزیابی کیفیت زندگی افراد جامعه آغاز می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 پرسید- پرسید- پروسید

گزینه 2 باور بهداشتی

گزینه 3 رفتار برنامه‌ریزی شده

گزینه 4 مراحل تغییر

نمایش پاسخ

الف

کدامیک جزء الگوهای برنامه‌ریزی در آموزش بهداشت جامعه محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)(دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 رفتار برنامه‌ریزی شده

گزینه 2 بازاریابی اجتماعی

گزینه 3 یادگیری اجتماعی

گزینه 4 مراحل تغییر

نمایش پاسخ

ب

مشارکت دادن مردم جزء کدامیک از الگوهای برنامه‌ریزی در آموزش بهداشت است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 الگوی پریسید- پروسید

گزینه 2 الگوی جامع آموزش بهداشت

گزینه 3 الگوی عمومی برنامه‌ریزی

گزینه 4 الگوی باورهای بهداشتی

نمایش پاسخ

سوال 13

معروف‌ترین و رایج‌ترین الگوی برنامه‌ریزی در زمینه‌ی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان/پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 الگوی باورهای بهداشتی

گزینه 2 الگوی جامع آموزش بهداشت

گزینه 3 الگوی بازاریابی اجتماعی

گزینه 4 الگوی برنامه‌ریزی پریسید- پروسید

نمایش پاسخ

سوال 14

در استفاده از تکنیک بازاریابی اجتماعی جهت ارتقای سلامت افراد و جامعه کدامیک از اصول زیر به کار گرفته نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 محصول

گزینه 2 مخاطب

گزینه 3 ترویج

گزینه 4 مکان

نمایش پاسخ

سوال 15

همه‌ی موارد زیر از اصول بازاریابی اجتماعی است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 مخاطب

گزینه 2 محصول

گزینه 3 هزینه

گزینه 4 مکان

نمایش پاسخ

سوال 16

کدام الگو (نظریه)های مورد استفاده در آموزش بهداشت جزء الگوهای برنامه‌ریزی محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 الگوی مراحل تغییر

گزینه 2 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده

گزینه 3 الگوی پرسید- پروسید

گزینه 4 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی

نمایش پاسخ

سوال 17

براساس الگوی مراحل تغییر، «برنامه‌ریزی» برای ترک سیگار جزء کدامیک از مراحل چرخه‌ی تغییر محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

سوال 18

براساس الگوی «مراحل تغییر رفتار» در کدام مرحله، فرد آماده‌ی ایجاد تغییر در رفتار خود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک هدف رفتاری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 قصد

گزینه 2 پیش قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

سوال 19

در کدامیک از انواع الگوهای برنامه‌ریزی آموزش بهداشت مبنای فعالیت آموزشی، ارزیابی‌های اجتماعی، رفتاری و محیطی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 الگوی جامع آموزش بهداشت

گزینه 2 اعتقاد بهداشتی

گزینه 3 پریسید- پروسید

گزینه 4 الگوی مراحل تغییر

نمایش پاسخ

سوال 20

کدامیک از نظریه‌ها یا الگوهای آموزش بهداشت به منظور تغییر رفتار استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 نظریه یادگیری اجتماعی

گزینه 2 الگوی جامع آموزش بهداشت

گزینه 3 الگوی پریسید- پروسید

گزینه 4 بازاریابی اجتماعی

نمایش پاسخ

سوال 21

اگر فردی خود را در معرض ابتلا به بیماری قلبی احساس کند، احتمال انجام ورزش منظم در او بیش‌تر می‌شود. این موضوع در الگوی اعتقاد بهداشتی چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 منافع درک شده

گزینه 2 موانع درک شده

گزینه 3 شدت درک شده

گزینه 4 حساسیت درک شده

نمایش پاسخ

سوال 22

در مدل الگوی باورهای بهداشتی، کدام عامل اثر مستقیم بر احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی مناسب توسط فرد را دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 محرک‌ها

گزینه 2 برداشت فرد از میزان خطر بیماری

گزینه 3 برداشت فرد از میزان شدت

گزینه 4 برداشت فرد از میزان آسیب‌پذیری

نمایش پاسخ

سوال 23

براساس الگوی مراحل تغییر کدامیک از گزینه‌های زیر جهت تغییر رفتار نادرست است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 در مرحله‌ی تدارک فرد رفتار مورد نظر را در پیش می‌گیرد.

گزینه 2 در مرحله‌ی پیش قصد تغییر رفتار هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.

گزینه 3 در مرحله‌ی قصد فرد هنوز آماده تعهد برای اقدام نیست.

گزینه 4 در مرحله‌ی تثبیت فرد برای حفظ تغییرات و مقاومت در برابر وسوسه‌های بازگشت می‌کوشد.

نمایش پاسخ

سوال 24

براساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی بیش‌تر رفتارهای فرد براساس کدام مورد صورت می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 برداشت فرد از سختی و آسانی سرانجام نرساندن آن رفتار

گزینه 2 شناخت و قضاوت خود فرد از مسائل بیرونی

گزینه 3 نگرش فرد نسبت به یک رفتار

گزینه 4 مشاهده‌ی رفتار دیگران و تقلید

نمایش پاسخ

در کدامیک از نظریات زیر، یادگیری برحسب مشاهده صورت می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز/پزشکی اسفند ۹۵_ قطب شیراز)

گزینه 1 الگوی باورهای بهداشتی

گزینه 2 الگوی عوامل تغییر

گزینه 3 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی

گزینه 4 نظریه‌ی اشاعه نوآوری

نمایش پاسخ

ج

فردی با دیدن یک تابلوی تبلیغاتی که افراد را به پوشش ترک سیگار دعوت می‌کند، سیگاری روشن می‌کند و به دوست خود می‌گوید «با سیگار یا بی‌سیگار، خواهیم مرد!». براساس الگوی پروچسکا، این فرد در کدام مرحله از تغییر رفتار قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 حفظ

گزینه 2 قصد

گزینه 3 پیش قصد

گزینه 4 تدارک

نمایش پاسخ

ج

در کدامیک از الگوهای تغییر رفتار، احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی بستگی مستقیم به دو ارزیابی خطر تهدید و ارزیابی منافع و موانع رفتار بهداشتی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 الگوی مراحل تغییر

گزینه 2 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده

گزینه 3 الگوی باور بهداشتی

گزینه 4 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی

نمایش پاسخ

ج

کدامیک جزء الگوهای (نظریه)های تغییر رفتار در آموزش بهداشت محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی

گزینه 2 الگوی باور بهداشتی

گزینه 3 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده

گزینه 4 الگوی جامع آموزش بهداشت

نمایش پاسخ

د

جوان ۲۶ ساله‌ای پنج سال است که سیگار می‌کشد. او با توجه به خطرات سیگار بر سلامت، برای ترک به کلینیک مراجعه کرده است. وی در نظر دارد که سیگار را ترک کند ولی در مصاحبه حاضر نیست که برای اقدام به ترک تعهد بدهد. براساس الگوی مراحل تغییر رفتار، در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۶_ قطب مشهد/پزشکی اسفند۹۶_ قطب شمال و اصفهان و کرمان/پزشکی ریفرم و کلاسیک ۹۸_ قطب تهران)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

ب

هدف اصلی و اساسی ارتقای سلامت (Health promotion) و فعالیت‌های مرتبط با آن کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 روند توانمندسازی مردم با هدف تغییر شیوه‌ی زندگی

گزینه 2 اتخاذ بهترین روش درمان بیماری

گزینه 3 بکارگیری بهینه‌ی سرویس‌های ارائه‌ی خدمات سلامت

گزینه 4 آموزش بهداشت فردی چهره به چهره

نمایش پاسخ

سوال 31

طبق الگوی مراحل تغییر مردی که پی به مضرات سیگار کشیدن برده و ترک سیگار را در نظر گرفته در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

پدیدار شدن احساس مسولیت نسبت به دیگران و غلبه بر احساس، در کدام مرحله از مراحل آمادگی برای ازدواج رخ می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد و اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 داشتن انگیزه

گزینه 2 بلوغ روانی

گزینه 3 پیدایش صمیمیت

گزینه 4 بلوغ اجتماعی

نمایش پاسخ

د. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 33

به کارگیری کدام تئوری رفتاری برای ترک سیگار در افراد دارای سرطان دهانی منطقی‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 مراحل تغییر

گزینه 2 باور سلامتی

گزینه 3 خود کارآمدی

گزینه 4 پرسید- پرسید

نمایش پاسخ

ب

سوال 34

هدف اصلی و اساسی، ارتقای سلامت (Health – Promotion) و فعالیت‌های مرتبط با آن کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 اتخاذ بهترین روش درمان بیماری‌ها

گزینه 2 به کارگیری علم و هنر جهت کمک به مردم برای تغییر شیوه‌ی زندگی

گزینه 3 آموزش بهداشت فردی چهره به چهره

گزینه 4 به کارگیری بهینه‌ی سرویس ارائه‌ی خدمات سلامت

نمایش پاسخ

ب

سوال 35

در بازاریابی اجتماعی برنامه‌ی ترک سیگار، پیمودن فاصله تا مرکز ترک سیگار مربوط به کدام اصل بازاریابی است؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 محصول

گزینه 2 هزینه

گزینه 3 مکان

گزینه 4 ترویج

نمایش پاسخ

ب

سوال 36

مهم‌ترین اقدام بهداشتی در پیشگیری از کانسر سرویکس کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 انجام اقدامات بهداشتی جامعه

گزینه 2 انجام غربالگری‌های جمعی

گزینه 3 تغییر در رفتارهای بهداشتی

گزینه 4 تأمین سرویس‌های خدمات بهداشت فردی

نمایش پاسخ

ج

مهم‌ترین هدف آموزش بهداشت کدام مورد است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 افزایش آگاهی

گزینه 2 تغییر رفتار

گزینه 3 ارتقای دانش

گزینه 4 ارتقای نگرش

نمایش پاسخ

ب

در نوجوانانی که والدین یا دوستانشان مواد مخدر یا سیگار مصرف می‌کنند، احتمال مصرف بیش‌تر است. این موضوع با کدامیک از نظریه‌های آموزشی سلامت ارتباط بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 الگوی باورهای بهداشتی

گزینه 2 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی

گزینه 3 الگوی مراحل تغییر

گزینه 4 نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده

نمایش پاسخ

ب

کدامیک از الگوها با نظریه‌های تغییر رفتار، بر برداشت فرد از میزان خطری که او را تهدید می‌کند و همچنین ارزیابی فرد از منافع و مواقع عمل بهداشتی تأکید دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 نظریه‌ی اشاعه نوآوری

گزینه 2 نظریه‌ی یادگیری اجتماعی

گزینه 3 الگوی باورهای بهداشتی

گزینه 4 الگوی مراحل تغییر

نمایش پاسخ

ج

با توجه به الگوی مراحل تغییر، در کدام مرحله از تغییر رفتار، فرد آماده ایجاد تغییر رفتار و برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک هدف رفتاری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

ج

در مرحله‌ی «ارزیابی بوم شناختی» در مدل پرسید- پروسید، آگاهی، نگرش‌ها و باورها در کدامیک از عوامل زیر طبقه‌بندی می‌شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 زمینه‌ساز

گزینه 2 تواناساز

گزینه 3 تقویت کننده

گزینه 4 محیطی

نمایش پاسخ

الف

در کدام مدل آموزش بهداشت وظیفه‌ی متخصصان آموزش بهداشت هدایت گروه هدف از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 الگوی بوم شناختی اجتماعی

گزینه 2 الگوی باورهای بهداشتی

گزینه 3 الگوی مراحل تغییر

گزینه 4 الگوی نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده

نمایش پاسخ

سوال 43

آقای سیگاری به منظور ترک سیگار، در برنامه‌های کلینیک ترک سیگار وارده شده است ایشان براساس الگوی مراحل تغییر رفتار Prochaska در کدام مرحله قرار دارد؟
(پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

سوال 44

«افزایش قیمت سیگار» جزء کدامیک از رویکردهای ارتقای سلامت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 جهت‌دهی مجدد به خدمات سلامت

گزینه 2 ایجاد محیط پشتیبان

گزینه 3 تقویت فعالیت جامعه

گزینه 4 ایجاد سیاست عمومی سالم

نمایش پاسخ

سوال 45

تشخیص در کار انفرادی کلینیکی، مترادف با کدامیک از گزینه‌های زیر در سلامت جامعه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 ارزیابی نیاز

گزینه 2 تحلیل داده‌ها

گزینه 3 طراحی برنامه

گزینه 4 اجرای برنامه

نمایش پاسخ

سوال 46

فرد سیگاری هر چه خود را بیش‌تر مستعد ابتلا به بیماری سرطان ریه احساس کند، احتمال ترک سیگار در او بیش‌تر است»
عبارت فوق بیانگر کدام بخش از الگوی بارور بهداشتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 محرک‌های محیطی

گزینه 2 میزان شدت بیماری

گزینه 3 میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری

گزینه 4 میزان منافع ترک اقدام غیر بهداشتی

نمایش پاسخ

ج. فرد به خاطر ترس خود از سرطان ریه سیگار را ترک می‌کند. این الگو میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری نام دارد.

سوال 47

در مورد «الگوی مراحل تغییر» که از الگوهای تغییر رفتار در آموزش بهداشت است در کدام گزینه مراحل آن به ترتیب صحیح ذکر شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 پیش قصد، قصد، تدارک، عمل، حفظ

گزینه 2 پیش قصد، قصد، تدارک، حفظ، عمل

گزینه 3 قصد، پیش قصد، عمل، تدارک، حفظ

گزینه 4 قصد، پیش قصد، تدارک، عمل، حفظ

نمایش پاسخ

الف. الگوی مراحل تغییر به ترتیب شامل پیش قصد، قصد، تدارک، عمل، حفظ می‌باشند.

سوال 48

یک فرد سیگاری آماده تغییر رفتار و برنامه‌ریزی برای ترک سیگار است. براساس الگوی مراحل تغیر رفتار، وی در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و اصفهان)

گزینه 1 عمل

گزینه 2 قصد

گزینه 3 پیش قصد

نمایش پاسخ

د. فرد هنوز آشکارا سیگار را ترک نکرده است و وارد مرحله‌ی عمل نشده. در مرحله‌ی تدارک قرار دارد.

سوال 49

در برنامه‌های بهداشتی مربوط به تبلیغ فعالیت بدنی و کاهش وزن، نحوه‌ی کنار آمدن با سختی رژیم غذایی و وجود باشگاه ورزشی رایگان در محله‌ها ذکر شده تا مردم بیش‌تر به این رفتار متمایل شوند. این اقدامات مربوط به کدام اصل از بازاریابی اجتماعی است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 مکان

گزینه 2 محصول

گزینه 3 هزینه

گزینه 4 ترویج

نمایش پاسخ

ج. چون رایگان ذکر شده اشاره به اصل هزینه دارد.

سوال 50

در «بازاریابی اجتماعی» برای آموزش سلامت، منظور از محصول کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 رفتاری که می‌خواهیم ترویج کنیم.

گزینه 2 هزینه‌هایی که افراد می‌پردازند.

گزینه 3 محل‌هایی که خدمات سلامت عرضه می‌شوند.

گزینه 4 رسانه‌های گروهی که مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایش پاسخ

الف. در آموزش سلامت محصول یک کالا نیست بلکه رفتاری است که می‌خواهیم ترویج کنیم.

سوال 51

هدف آموزش بهداشت بیش‌تر کدامیک از تغییرات زیر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 تغییر آگاهی جامعه

گزینه 2 تغییر نگرش جامعه

گزینه 3 تغییر انگیزش جامعه

گزینه 4 تغییر رفتار جامعه

نمایش پاسخ

د / آموزش بهداشت روی رفتارهای مردم برای افزایش سطح بهداشت مانور میدهند و دنبال تغییر رفتارهای بد هستند.

سوال 52

کدامیک از مراحل زیر جزء مراحل ۶ گانه‌ی الگوی جامع آموزش بهداشت محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 ارزیابی همه‌گیر شناختی

گزینه 2 ارزیابی محیطی

گزینه 3 بازاریابی اجتماعی

گزینه 4 مشارکت دادن مردم

نمایش پاسخ

د / مراحل ۶ گانه‌ی الگوی جامع آموزش بهداشت: مشارکت دادن مردم- تعیین اهداف- تعریف مشکلات- طراحی برنامه- فعالیت‌های اجرایی- ارزشیابی نتایج

سوال 53

علم و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه‌ی زندگی به منظور نیل به وضعیت مطلوب سلامت همان مفهوم است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 آزمون بهداشت

گزینه 2 ارتقای سلامت

گزینه 3 بهداشت عمومی

گزینه 4 پزشکی پیشگیری

نمایش پاسخ

ب / ارتقای سلامت به معنای کمک به مردم برای تغییر شیوه‌ی زندگی به منظور دستیابی به سلامت است.

سوال 54

«ارتقای سلامت» عبارت است از ترکیبی از فعالیت‌های آموزش بهداشت و.....(پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 مراقبت‌های بهداشتی در سطح اول، دوم و سوم

گزینه 2 حمایت‌های محیطی، سازمانی و اقتصادی از رفتارهای منجر به سلامت

گزینه 3 پوشش حداکثری ایمن‌سازی علیه بیماری‌های واگیردار در جامعه

گزینه 4 آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوانان و فرزند پروری به والدین

نمایش پاسخ

ب / ارتقای سلامت به معنای کمک به مردم برای تغییر شیوه‌ی زندگی به منظور دستیابی به سلامت است و ترکیبی از فعالیتهای آموزش بهداشت و حمایت‌های محیطی، سازمانی و اقتصادی از رفتارهای منجر به سلامت است.

سوال 55

عبارت زیر بیانگر برداشت فرد از کدام بخش از الگوی باور بهداشت است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

«اگر سیگار بکشم ممکن است من هم مثل سایرین به سرطان ریه مبتلا شوم»

گزینه 1 محرک محیطی

گزینه 2 میزان شدت بیماری

گزینه 3 میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری

گزینه 4 میزان منافع ترک اقدام غیر بهداشتی

نمایش پاسخ

ج / فرد به خاطر ترس خود از سرطان ریه سیگار را ترک می‌کند. این الگو میزان آسیب‌پذیری نسبت به بیماری نام دارد.

سوال 56

فرد چاقی برای دریافت رژیم غذایی به کلینیک تغذیه مراجعه کرده است. براساس الگوی مراحل تغییر رفتار (Prochaska) در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک

شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

ج / فرد هنوز آشکارا اقدام به رژیم گرفتن نکرده است و وارد مرحله‌ی عمل نشده. در مرحله‌ی تدارک قرار دارد.

سوال 57

در ترک سیگار، مقاومت در برابر وسوسه‌های بازگشت به سیگار کشیدن، مربوط به کدام مرحله‌ی الگوی تغییر رفتار است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب

کرمان)

گزینه 1 قصد

گزینه 2 تثبیت

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

ب / پایداری بر تصمیم خود و برنگشتن به شرایط قبلی در مرحله‌ی نگهداری و تثبیت است.

سوال 58

اولین گام در تغییر رفتار کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 باور پیدا کردن به تغییر رفتار

گزینه 2 آگاهی یافتن از مزایای رفتار جدید

گزینه 3 آگاهی یافتن از عواقب رفتار قبلی

گزینه 4 تمام موارد فوق

نمایش پاسخ

الف / اولین گام در تغییر رفتار این است که ابتدا باور کنیم می‌خواهیم تغییر رفتار دهیم.

سوال 59

آقای سیگاری ۴۵ ساله‌ای به شما مراجعه می‌کند. وی از تنگی نفس حین ورزش شکایت دارد و فکر می‌کند این مشکل به دلیل مصرف سیگار است. در مورد ترک سیگار

از شما سؤال می‌کند ولی هنوز مردد است. این فرد طبق الگوی مراحل تغییر، در کدام مرحله قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 قصد

گزینه 3 تدارک

گزینه 4 عمل

نمایش پاسخ

ب / قصد در واقع همان مرحله‌ی تفکر است مانند فرد سیگاری‌ای که به عواقب و مشکلات سیگار کشیدن پی برده و مایل است آن را ترک کند اما هنوز آماده‌ی دادن تعهد

برای اقدام نیست.

سوال 60

براساس منظور ایجاد سیاست عمومی سالم «Bu» کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 شناسایی فرصت‌ها برای ایجاد تغییرات منجر به سلامت

گزینه 2 معطوف کردن توجه به تأثیر سایر بخش‌ها بر بخش سلامت

گزینه 3 توانمند سازی افراد و جوامع در فرآیندهای کسب سلامت

گزینه 4 سوق دادن تمرکز از فراهم آوردن خدمات درمانی به سمت هدف کسب سلامت

نمایش پاسخ

ب

سوال 61

امکان انتخاب نوشیدنی بدون قند در سلف سرویس مدارس" در کدام حیطه‌ی اقدامات ارتقاء سلامت دهان قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 تقویت فعالیت جامعه

گزینه 2 جهت‌دهی مجدد به خدمات سلامت

گزینه 3 ایجاد سیاست عمومی سالم

گزینه 4 ایجاد محیط حمایت کننده

نمایش پاسخ

د

سوال 62

کدام‌یک از موارد زیر در مورد «ارتقا سلامت» صحیح است؟ ((علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره)

گزینه 1 فرآیند توانمندسازی افراد به منظور تغییر دادن شیوه زندگی

گزینه 2 حل بهتر مشکلات

گزینه 3 استفاده بهتر از خدمات بهداشتی

گزینه 4 آموزش بهداشت چهره به چهره

نمایش پاسخ

الف در مورد ارتقا سلامت فرآیند توانمندسازی افراد به منظور تغییر دادن شیوه زندگی صحیح است.

سوال 63

کدام‌یک از موارد زیر، «پیشگیری ثالثیه» محسوب می‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره)

گزینه 1 ارتقا سلامت

گزینه 2 غربالگری

گزینه 3 جلوگیری از ناتوانی

گزینه 4 تشخیص و درمان زودرس

نمایش پاسخ

ج جلوگیری از ناتوانی، پیشگیری ثالثیه است.

سوال 64

یک سیستم مناسب مراقبت از بیماری‌ها بایستی کدام‌یک از اطلاعات زیر را فراهم نماید؟(علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره)

گزینه 1 چه کسی آلوده به عفونت شده است

گزینه 2 عفونت با چه سرعتی در حال انتشار است

گزینه 3 اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و میر

گزینه 4 داده‌های مورد نیاز برای تصمیم گیرندگان

نمایش پاسخ

ج / یک سیستم مراقبت از بیماری باید اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و میر را فراهم نماید.

سوال 65

در قرنطینه کدام‌یک از گروه‌های زیر، تحت پوشش برنامه سلامتی هستند؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹ - میان‌دوره)

گزینه 1 مبتلایان اخیر

گزینه 2 افراد در فاز نقاهت

گزینه 3 تماس یافتگان

گزینه 4 حاملین مزمن

نمایش پاسخ

ج / در قرنطینه، تماس یافتگان تحت پوشش برنامه سلامت هستند.

سوال 66

بر اساس مرحله چهارم الگوی برنامه‌ریزی پریسید پروسید (ارزیابی آموزشی و بوم شناختی) کدام‌یک از عوامل زیر در گروه عوامل تقویت‌کننده قرار می‌گیرند؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان بهداشتی و همسالان

گزینه 2 قوانین و مقررات

گزینه 3 باورها و دانش افراد در مورد موضوع خاص

گزینه 4 مهارت‌های فردی در انجام کارها

نمایش پاسخ

الف / نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان بهداشتی و همسالان در گروه عوامل تقویت‌کننده قرار می‌گیرند.

سوال 67

بر اساس الگوی مراحل تغییر (Prochaska et al, 1979)، اگر فردی در فرآیند تغییر رفتار، به وجود مشکل پی برده باشد و تغییر رفتار را در نظر گرفته‌باشد ولی هنوز آماده تعهد برای انجام آن نباشد در کدام مرحله قرار دارد؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 پیش قصد

گزینه 2 تدارک

گزینه 3 قصد

گزینه 4 حفظ

نمایش پاسخ

ج / بر اساس الگوی مراحل تغییر (Prochaska et al, 1979)، اگر فردی در فرآیند تغییر رفتار، به وجود مشکل پی برده باشد و تغییر رفتار را در نظر گرفته‌باشد ولی هنوز آماده تعهد برای انجام آن نباشد در مرحله قصد قرار دارد.

در مرحله تدارک فرد آماده هست که هنوز به عمل نرسیده و انجام نداده.

سوال 68

با توجه به رویکرد و مفاهیم دندانپزشکی جامعه نگر، در مقابل معاینه بیمار در کلینیک کدامیک از موارد زیر در کار در زمینه سلامت جامعه قرار می‌گیرد؟ (علوم پایه دندان پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 طراحی برنامه

گزینه 2 ارزیابی نیاز

گزینه 3 اخلاقیات

گزینه 4 تحلیل داده‌ها

نمایش پاسخ

ب / ارزیابی نیاز بیمار، در رویکرد دندان پزشکی جامعه نگر، در زمینه سلامت جامعه قرار می‌گیرد.

سوال 69

اگر در راستای سلامت دهان و دندان یک جامعه، تلاش‌هایی در راستای اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی صورت گیرد، کدامیک از رویکردهای ارتقای سلامت برای این منظور بکار گرفته شده است؟ (علوم پایه دندان پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 Empowerment

گزینه 2 Behavioral change

گزینه 3 Preventive

گزینه 4 Social change

نمایش پاسخ

د- اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی، رویکرد Social change است.

سوال 70

نسبت خانوارهای مواجهه یافته با هزینه‌های فقرزای سلامت (بروز فقر به خاطر هزینه‌های سلامت) جزء کدام حیطه از شاخص‌های پایش و ارزیابی پوشش همگانی سلامت قرار دارد؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره)

گزینه 1 پوشش مؤثر خدمات

گزینه 2 حفاظت مالی

گزینه 3 تقویت نظام سلامت

گزینه 4 هزینه‌های سلامت

نمایش پاسخ

ب / نسبت خانوارهای مواجهه یافته با هزینه‌های فقرزای سلامت، مسئله حفاظت مالی را بیان می‌کند.

سوال 71

کدام گزینه مربوط به اهداف آموزش بهداشت بر اساس تعریف سازمان جهانی است؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره)

گزینه 1 تشویق مردم به حفظ سلامت از طریق تغییر رفتار

گزینه 2 ایجاد انگیزه نسبت به تندرستی به‌طور مستمر

گزینه 3 آموزش بهداشت به‌صورت یک فرآیند خودآموز

گزینه 4 فعالیت در جهت بیماریاریایی

نمایش پاسخ

الف / توجه اصلی فعالیت آموزش بهداشت به تغییر رفتار است و تشویق مردم به حفظ سلامت از طریق تغییر رفتار، از اهداف آموزش بهداشت است.

سوال 72

در مقایسه مراحل کار کلینیکی در دندان پزشکی با دندان پزشکی جامعه نگر، کدام یک از اقدامات زیر در دندان پزشکی جامعه نگر، معادل ترکیب مناسب مراقبت،
معالجه و پیشگیری در کار کلینیکی قرار دارد؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 ارزیابی نیاز

گزینه 2 اجرای برنامه

گزینه 3 طراحی برنامه

گزینه 4 تعیین طرح درمان

نمایش پاسخ

ب / اجرای برنامه ها در دندان پزشکی جامعه نگر، معادل ترکیب مناسب مراقبت، معالجه و پیشگیری در کار کلینیکی قرار دارد.

سوال 73

اگر در برنامه ارتقای سلامت دهان و دندان جامعه به افراد کمک کنیم که مشکلات و اولویت های خود را شناسایی کنند و مهارت و اطمینان آنان را در این زمینه ارتقا دهیم، کدام یک از رویکردهای ارتقای سلامت مورد استفاده قرار گرفته است؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 آموزشی

گزینه 2 توانمند سازی

گزینه 3 تغییر اجتماعی

گزینه 4 تغییر رفتاری

نمایش پاسخ

ب / توانمندسازی از رویکردهای ارتقا سلامت: به افراد کمک کنیم که مشکلات و اولویت های خود را شناسایی کنند و مهارت و اطمینان آنان را در این زمینه ارتقا دهیم.

سوال 74

اگر در یک برنامه ترک سیگار، حمایت های لازم از طرف مراکز فرهنگی که فرد به آنها تعلق دارد، در این زمینه صورت بگیرد، بر اساس الگوی بوم شناختی- اجتماعی مک لیروی (McLeroy.Et Al.) کدام سطح تاثیر در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ (علوم پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 میان فردی

گزینه 2 سازمانی

گزینه 3 اجتماعی

گزینه 4 سیاست ها و خط مشی ها

نمایش پاسخ

ب / حمایت لازم از طرف مراکز فرهنگی یعنی سطح سازمانی

سوال 75

در جامعه ای با شیوع بالای سرطان پوست، متخصصین در نظر دارند با استفاده از نظریه اشاعه نوآوری، رفتار استفاده از کرم ضد آفتاب را ترویج کنند. در فرآیند اجرای برنامه و طبقه بندی افراد، گروهی از آنان علاقه مند به انجام رفتار بوده ولی نیازمند انگیزه های بیرونی برای پذیرش رفتار بودند، این گروه در چه طبقه ای قرار می گیرند؟ (علوم پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 پیشگامان

گزینه 2 زود پذیرندگان

گزینه 3 اکثریت اولیه

گزینه 4 وامانندگان

نمایش پاسخ

ج / طبق نظریه اشاعه نوآوری افرادی که علاقه مند به انجام رفتار بوده ولی نیازمند انگیزه های بیرونی برای پذیرش رفتار هستند؛ در طبقه اکثریت اولیه قرار می گیرند.

نقش سازمان های ملی و فراملی در توسعه ی سلامت

تعداد سوالات: ۵۹

درجه سختی: آسان

نکات پرتکرار: ۱- سازمان غذا و کار وبانک و برنامه ی عمران ملل متحد ارتباط غیر مستقیم در توسعه سلامت دارند

۲- کنترل کیفیت داروها_ فراورده های بیولوژیک و واکسن از وظایف سازمان بهداشت جهانیست

۳- رعایت حقوق کودکان و حقوق انسانی خصوصا زنان از مضایف صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) است

۴- صندوق جمعیت ملل متحد

UNFPA

در زمینه بهداشت باروری و جمعیتی فعالیت دارد(در توسعه سلامت ایران نقشی نداشته است)

۵- محافظت از اوارگان جهان به عهده ی ادارهی کمیساریای عالی ملل متحد

UNHCR است

۶- سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)وظیفه مشارکت در صلح و امنیت جهانی و برسی آینده نگر تبادل اطلاعات تخصصی داراست

۷- ایران در منطقه مدیترانه شرقی است EMRO

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر به طور مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش ندارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز/پزشکی اسفند ۹۳_ قطب تبریز/پزشکی اردیبهشت ۹۷_ میان دوره کشوری)

گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت

گزینه 2 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

گزینه 3 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد

گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد

نمایش پاسخ

ج

سوال 2

کدامیک از سازمان‌ها، برنامه‌ها و صندوق‌های زیر به صورت مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد

گزینه 2 سازمان منع سلاح‌های شیمیایی

گزینه 3 برنامه‌ی محیط‌زیست ملل متحد

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

کدامیک از سازمان‌ها و یا صندوق‌های بین‌المللی به طور مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان/پزشکی شهریور ۹۴_ قطب کرمان)

گزینه 1 اداره‌ی کمیساریای عالی ملل متحد (UNHCR)

گزینه 2 صندوق بین‌المللی تجارت (WTO)

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار (ILO)

نمایش پاسخ

ج

سوال 4

کدامیک از سازمان‌های زیر مستقیماً در توسعه‌ی سلامت نقش ندارند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۶_ قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۶_ قطب مشهد)

گزینه 1 برنامه‌ی غذایی جهانی

گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد

گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد

نمایش پاسخ

الف

سوال 5

کدامیک از سازمان‌های زیر مستقیماً در توسعه‌ی سلامت نقش ندارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت

گزینه 2 سازمان بین‌المللی کار

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد

گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

کدامیک از سازمان‌های زیر به صورت مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۴_ قطب شیراز)

گزینه 1 بین‌المللی کار

گزینه 2 بین‌المللی تجارت

گزینه 3 آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

گزینه 4 غذا و کشاورزی ملل متحد

نمایش پاسخ

ج

سوال 7

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر به طور غیر مستقیم در امر سلامت نقش دارند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان/پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸ _ قطب تبریز))

گزینه 1 WHO (سازمان بهداشت جهانی)

گزینه 2 UNDP (برنامه‌ی عمران ملل متحد)

گزینه 3 UNICEF (صندوق کودکان ملل متحد)

گزینه 4 UNESCO (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)

نمایش پاسخ

ب

سوال 8

کدامیک از سازمان‌های زیر به طور غیر مستقیم با سلامت در ارتباط است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 یونسکو

گزینه 2 یونیسف

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد

گزینه 4 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد

نمایش پاسخ

د

سوال 9

کدامیک از سازمان‌های زیر در توسعه‌ی سلامت به طور غیر مستقیم نقش دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

گزینه 2 سازمان بین‌المللی کار (ILO)

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)

گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر در امر سلامت نقش مستقیم دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان / دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری))

گزینه 1 برنامه‌ی محیط زیست ملل متحد

گزینه 2 صندوق جمعیت ملل متحد

گزینه 3 برنامه‌ی عمران ملل متحد

گزینه 4 برنامه‌ی غذایی جهانی

نمایش پاسخ

ب

سوال 11

تعیین استانداردهای بین المللی برای غذا، مواد بیولوژیک و فرآورده‌های دارویی از فعالیت‌های کدامیک از سازمان‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 فاو

گزینه 2 یونسکو

گزینه 3 یونیسف

گزینه 4 سازمان بهداشت جهانی

نمایش پاسخ

د

سوال 12

ارتقاء و رعایت حقوق کودکان و حقوق انسانی خصوصاً زنان جزء فعالیت‌های اختصاصی کدام سازمان یا صندوق‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد/ پزشکی اسفند۹۵_ قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز/پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸ _ قطب زنجان))

گزینه 1 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت (WHO)

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)

گزینه 4 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)

نمایش پاسخ

د

سوال 13

برنامه‌های کدام سازمان بین‌المللی، بر ارتقای سلامت کودکان معطوف است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 اداره‌ی کمسیاریای عالی ملل متحد

گزینه 2 یونسکو

گزینه 3 یونیسف

گزینه 4 برنامه‌ی غذایی جهانی

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

کدامیک از سازمان‌های زیر، فعالیت‌های مربوط به حقوق کودکان را در دنیا بررسی می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ILO

گزینه 2 UNESCO

گزینه 3 UNICEF

گزینه 4 UNFPA

نمایش پاسخ

ج

سوال 15

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر، کشورهای در حال توسعه را در امور مربوط به باروری و جمعیتی یاری می‌رساند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان/پزشکی شهریور ۹۴_ قطب اصفهان)

گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد

گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت

گزینه 3 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

گزینه 4 صندوق جمعیت ملل متحد

نمایش پاسخ

د

سوال 16

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌ی بهداشت باروری و جمعیتی فعالیت می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان/پزشکی ۹۶_ قطب اسفند شیراز و همدان)

گزینه 1 UNDP

گزینه 2 UNEP

گزینه 3 UNFPA

گزینه 4 UNHCR

نمایش پاسخ

ج

سوال 17

عبارت «هدف اصلی آن مشارکت در صلح و امنیت در جهان است» با تعریف عملکرد کدامیک از سازمان‌های زیر همخوانی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 UNICEF

گزینه 2 UNFPA

گزینه 3 UNESCO

گزینه 4 UNHCR

نمایش پاسخ

ج

سوال 18

بررسی‌های آینده‌نگر و اقدام برای تعیین استانداردها و تبادل اطلاعات تخصصی از وظایف پنج‌گانه کدام سازمان بین‌المللی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 گروه بانک جهانی

گزینه 2 برنامه‌ی عمران ملل متحد

گزینه 3 یونسکو

گزینه 4 سازمان جهانی کار

نمایش پاسخ

ج

سوال 19

کدامیک از سازمان‌های زیر وظیفه‌ی اصلی مشارکت در صلح و امنیت جهان را برعهده دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۷_ قطب تبریز/پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ _ قطب اصفهان))

گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت

گزینه 2 صندوق جمعیت ملل متحد

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد

گزینه 4 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

نمایش پاسخ

د

سوال 20

اهدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای محافظت از آوارگان جهان و حل مشکلات آن‌ها به عهده‌ی کدام سازمان بین‌المللی است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت (WHO)

گزینه 2 صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA)

گزینه 3 اداره‌ی کمیساریای عالی متحد (UNHCR)

گزینه 4 یونسکو UNESCO

نمایش پاسخ

ج

سوال 21

هدف کدام سازمان بین‌المللی، رسیدگی به وضعیت کارگران است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 سازمان غذا و کشاورزی

گزینه 2 صندوق ملل برای توسعه

گزینه 3 گروه بانک جهانی

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار

نمایش پاسخ

د

سوال 22

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر در توسعه‌ی روستایی و بهبود تغذیه و امنیت غذا فعالیت می‌نمایند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان/دندان پزشکی شهریور ۹۴_ قطب کرمان)

گزینه 1 یونیسف

گزینه 2 فائو

گزینه 3 یونسکو

گزینه 4 بانک جهانی

نمایش پاسخ

ب

سوال 23

کدامیک از سازمان‌های زیر هدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای محافظت از آوارگان جهان و حل مشکلات آن‌ها را به عهده دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 گروه بانک جهانی

گزینه 2 اداره‌ی کمیساریای عالی ملل متحد

گزینه 3 برنامه‌ی عمران ملل متحد

گزینه 4 سازمان بین‌المللی تجارت

نمایش پاسخ

ب

سوال 24

تمام گزینه‌های زیر از مسئولیت‌های سازمان جهانی بهداشت است بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 ارتقای وضعیت بهداشت و تغذیه

گزینه 2 ارائه‌ی خدمات بهداشتی با هزینه‌ی کم

گزینه 3 ترویج و هدایت پژوهش‌های سلامت

گزینه 4 ایجاد انگیزه برای ریشه‌کنی و کنترل بیماری‌ها

نمایش پاسخ

ب

سوال 25

کنترل کیفیت داروها، فرآورده‌های بیولوژیک و واکسن از وظایف کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 کمیسیون مشترک ارزیابی فرآورده‌های دارویی و غذایی ملل

گزینه 2 سازمان غذا و داروی جهانی

گزینه 3 سازمان یونیسف

گزینه 4 سازمان جهانی بهداشت

نمایش پاسخ

د

سوال 26

کدامیک از سازمان‌های زیر در مجموعه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی کمک به پناهندگان فعالیت می‌نمایند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 UNFDA

گزینه 2 UNDP

گزینه 3 UNICEF

گزینه 4 UNHCR

نمایش پاسخ

د

سوال 27

کدام مورد از موارد زیر در حوزه‌ی کمک‌های سازمان بهداشت جهانی به کشورها نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 کمک به برنامه‌های پژوهشی کاربردی

گزینه 2 سیاست‌گذاری در سیستم سلامت

گزینه 3 تأمین لوازم و تجهیزات اساسی برنامه‌ها

گزینه 4 کمک به تبادل اطلاعات در زمینه‌ی مسائل پزشکی

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

مجموعه خدماتی آموزشی- بهداشتی خانواده و کودک تغذیه و بهداشت کودکان از وظایف کدامیک از سازمان‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 کشاورزی و غذا

گزینه 2 بانک جهانی

گزینه 3 یونیسف

گزینه 4 جهانی بهداشت

نمایش پاسخ

ج

سوال 29

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر در مورد سلامتی شاغلین و شرایط محیط کار نقش آفرینی می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 WHO

گزینه 2 UNESCO

گزینه 3 FAO

گزینه 4 ILO

نمایش پاسخ

د

سوال 30

کدامیک از موارد ذیل جزء وظایف اصلی اداره‌ی کمیساریای عالی ملل متحد است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 محافظت از آوارگان جهان و حل مشکلات آن‌ها

گزینه 2 کمک به توسعه‌ی کامل‌تر منابع انسانی و طبیعی در کشورهای فقیرتر

گزینه 3 مشارکت در صلح و امنیت جهان از طریق همکاری در سطح بین‌الملل در زمینه‌ی آموزش فرهنگ و ارتباطات

گزینه 4 اجرای عهدنامه‌ی منع تهیه، مصرف، تولید و ذخیره‌ی سلاح‌های شیمیایی و انهدام

نمایش پاسخ

الف

سوال 31

تعیین استانداردهای بین‌المللی برای غذا، مواد بیولوژیک و فرآورده‌های دارویی جزء مسئولیت‌های کدامیک از سازمان‌های مرتبط با سلامت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان/دندان پزشکی اسفند ۹۶- قطب دانشگاه آزاد/پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 بنیاد سازمان ملل متحد برای فعالیت‌های جمعیتی

گزینه 2 سازمان بین‌المللی کار

گزینه 3 سازمان بهداشت جهانی

گزینه 4 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

نمایش پاسخ

ج

سوال 32

جمهوری اسلامی ایران در کدام منطقه‌ی WHO قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 AFRO

گزینه 2 AMRO

گزینه 3 EURO

گزینه 4 EMRO

نمایش پاسخ

د

سوال 33

ایران جزء کدامیک از مناطق سازمان جهانی بهداشت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 آسیای جنوب شرقی

گزینه 2 غرب اقیانوس آرام

گزینه 3 مدیترانه‌ی شرقی

گزینه 4 اروپا

نمایش پاسخ

ج

سوال 34

ایران در کدام منطقه‌ی سازمان جهانی سلامت قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 آسیای جنوب غرب

گزینه 2 غرب اقیانوس آرام

گزینه 3 آسیای جنوب شرق

گزینه 4 مدیترانه شرقی

نمایش پاسخ

د

سوال 35

کدامیک از سازمان‌های فراملی زیر در توسعه‌ی سلامت ایران نقش کم‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 UNESCO

گزینه 2 UNICEF

گزینه 3 UNFPA

گزینه 4 WHO

نمایش پاسخ

الف

سوال 37

«احترام به حقوق اساسی آوارگان از جمله حفظ حق پناهندگی و عدم بازگشت اجباری آن‌ها به کشوری که امکان شکنجه و آزار در آن وجود دارد» از وظایف کدامیک از سازمان‌های فراملی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)

گزینه 2 کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR)

گزینه 3 برنامه‌ی عمران ملل متحد (UNHCR)

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار (ILO)

نمایش پاسخ

ب

سوال 38

وظیفه‌ی هدایت و هماهنگی اقدامات بین‌المللی برای محافظت از آوارگان جهان و حل مشکلات آن‌ها برعهده‌ی کدامیک از سازمان‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶-
قطب اهواز/پزشکی شهریور ۹۷_ قطب مشهد)

گزینه 1 UNEP

گزینه 2 UNHCR

گزینه 3 WHO

گزینه 4 UNDP

نمایش پاسخ

ب

سوال 39

کدام سازمان بین‌المللی زیر عهده‌دار مسئولیت برنامه‌های سلامت کودکان است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 UNFPA

گزینه 2 FAO

گزینه 3 UNESCO

گزینه 4 UNICEF

نمایش پاسخ

د

سوال 40

کدامیک از سازمان‌ها و صندوق‌های فراملی زیر به صورت غیر مستقیم با سلامت در ارتباط هستند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان/پزشکی اسفند ۹۷ _ قطب
شمال)

گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد UNICEF

گزینه 2 سازمان علمی آموزشی فرهنگی ملل متحد UNESCO

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار ILO

نمایش پاسخ

د

سوال 41

ارتقای آگاهی، توانمندسازی، کمک جهت حل معضلات جمعیتی از وظایف کدام سازمان بین‌المللی است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 صندوق کودکان ملل متحد UNICEF

گزینه 2 صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA

گزینه 3 سازمان جهانی بهداشت WHO

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار ILO

نمایش پاسخ

الف

سوال 42

کدامیک از سازمان‌ها و برنامه‌های زیر به طور مستقیم در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز/پزشکی اسفند ۹۷_ قطب اصفهان و تهران)

گزینه 1 برنامه‌ی محیط‌زیست ملل متحد

گزینه 2 گروه بانک جهانی

گزینه 3 صندوق کودکان ملل متحد

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار

نمایش پاسخ

ج

سوال 43

کشور ایران در کدام منطقه از مناطق ۶ گانه معرفی شده WHO قرار می‌گیرد و وضعیت مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در آن چگونه است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 EMRO- بسیار پایین

گزینه 2 EMRO- پایین

گزینه 3 AMRO- بسیار پایین

گزینه 4 AMRO- پایین

نمایش پاسخ

ب

سوال 44

در مورد نقش و اهداف سازمان‌های بین‌المللی، کدام جمله صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 ارتقای عدالت اجتماعی و حفظ حقوق انسانی کارگر، از اهداف سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد UNESCO است

گزینه 2 مبارزه با فقر و گرسنگی از طریق ترویج کشاورزی و بهبود تغذیه و پیگیری امنیت غذا از اهداف سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد FAO است.

گزینه 3 رعایت عدالت اجتماعی در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به کودکان از اهداف سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد UNESCO است.

گزینه 4 آگاه‌سازی و ظرفیت‌سازی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت و تنظیم خانواده از مسئولیت‌های صندوق کودکان ملل متحد UNESCO است

نمایش پاسخ

ب

سوال 45

تعیین استانداردهای بین‌المللی برای غذا، مواد بیولوژیک و فرآورده‌های دامی، از وظایف کدام سازمان زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 غذا و کشاورزی ملل متحد FAO

گزینه 2 برنامه‌ی غذایی جهانی WFP

گزینه 3 بهداشت جهانی WHO

گزینه 4 بین‌المللی تجارت WTO

نمایش پاسخ

ج

تعیین استاندارد WHO

سوال 46

کدامیک از سازمان‌های زیر مستقیماً در توسعه‌ی سلامت نقش دارند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد

گزینه 2 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

گزینه 3 سازمان بین‌المللی کار

گزینه 4 سازمان بین‌المللی تجارت

نمایش پاسخ

ب

سوال 47

رسیدگی به امور فنی و بررسی بودجه سازمان بهداشت جهانی توسط کدام مورد زیر انجام می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 شورای بهداشت جهانی

گزینه 2 کمیته‌ی فنی

گزینه 3 هیأت اجرایی

گزینه 4 دبیرخانه

نمایش پاسخ

ج. هیأت اجرایی سازمان بهداشت جهانی رسیدگی به امور فنی و بررسی بودجه را برعهده دارد.

سوال 48

یک سازمان‌ها و صندوق‌های بین‌المللی، با هدف کاهش فقر در سراسر جهان از طریق تقویت اقتصاد ملت‌های فقیر پایه‌ریزی شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 سازمان عمران ملل متحد

گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت

گزینه 3 بانک جهانی

گزینه 4 سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد

نمایش پاسخ

ج. بانک جهانی بر روی مسائل اقتصادی و فقر جهانی کار می‌کند.

سوال 49

وظیفه‌ی کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی مشارکت در برقراری صلح و امنیت جهانی از طریق آموزش علم و فرهنگ و ارتباطات است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 یونیسف

گزینه 2 سازمان جهانی بهداشت

گزینه 3 یونسکو

گزینه 4 سازمان بین‌المللی کار

نمایش پاسخ

ج / یونیسف مسئول حمایت از حقوق کودکان و یونسکو در صلح و امنیت جهانی نقش دارد.

سوال 50

کدامیک از سازمان‌های بین‌المللی زیر، کشورهای در حال توسعه را در برنامه‌های مربوط به بهداشت باروری و جمعیتی، یاری می‌نماید؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 UNDP

گزینه 2 UNESCO

گزینه 3 UNFPA

گزینه 4 UNICEF

نمایش پاسخ

ج / صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد.

سوال 51

بهبود وضعیت بهداشت باروری و تأمین حقوق باروری برای کلیه‌ی افراد از اهداف کدام سازمان بین‌المللی زیر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 سازمان جهانی بهداشت (WHO)

گزینه 2 صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF)

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد (UNEP)

گزینه 4 سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

نمایش پاسخ

ج / صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد.

سوال 52

ارتقاء سطح آگاهی کشورها در مورد مشکلات مربوط به جمعیت و راهکارهای مقابله با آن‌ها وظیفه‌ی کدام سازمان است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 سازمان بهداشت جهانی

گزینه 2 صندوق کودکان ملل متحد

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد

گزینه 4 سازمان آموزشی- علمی- فرهنگی ملل متحد

نمایش پاسخ

ج / صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد.

سوال 53

کدامیک از سازمان‌های فراملی زیر در توسعه‌ی سلامت در ایران نقش نداشته است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 سازمان بین‌المللی کار ILO

گزینه 2 صندوق کودکان ملل متحد UNICEF

گزینه 3 صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA

گزینه 4 سازمان بهداشت جهانی WHO

نمایش پاسخ

ج / صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) وظیفه‌ی تنظیم خانواده و بهداشت باروری را برعهده دارد. این سازمان در توسعه‌ی سلامت در ایران نقش نداشته است.

سوال 54

کدامیک از موارد زیر از وظایف دبیرخانه‌ی سازمان جهانی بهداشت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های بین‌المللی بهداشت

گزینه 2 تصویب بودجه مورد نیاز برای سال آینده

گزینه 3 تصویب و جهت دادن به تصمیمات و سیاست‌های مجمع

گزینه 4 حمایت از دولت‌های عضو از نظر فنی و مدیریتی در زمینه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی بهداشتی

نمایش پاسخ

د. وظیفه‌ی دبیرخانه‌ی سازمان who حمایت از دولت‌های عضو از نظر فنی و مدیریتی در زمینه‌ی برنامه‌های توسعه‌ی بهداشتی است.

برای برآورده شدن نیازهای بهداشتی ویژه در مناطق مختلف جهان، سازمان جهانی بهداشت (WHO) چند سازمان منطقه‌ای تأسیس کرده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 ۵

گزینه 2 ۶

گزینه 3 ۷

گزینه 4 ۸

نمایش پاسخ

ب. ازون سوالا! WHO شیش تا دفتر منطقه‌ای داره. آفریقا، آمریکا، مدیترانه‌ی شرقی، اروپا، جنوب شرق آسیا، و غرب اقیانوسیه

نظام ارائه خدمات بهداشتی در ایران به چه صورت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 خصوصی

گزینه 2 دولتی

گزینه 3 بیمه‌ای

گزینه 4 مکمل

نمایش پاسخ

د؟ اینم سوال قرنی یبار بود

کدام یک از سازمان‌ها یا برنامه‌های ملل متحد مستقیماً در توسعه سلامت نقش دارند؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

گزینه 2 سازمان منع سلاح‌های شیمیایی

گزینه 3 برنامه غذای جهانی

گزینه 4 برنامه محیط زیست

نمایش پاسخ

الف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در توسعه سلامت نقش دارند.

کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد اجزای عینی و ذهنی بهزیستی صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 سطح زندگی به معنی درک فرد از وضعیت و معیارهای رفاه روانی و جسمی و اجتماعی است.

گزینه 2 استانداردهای زندگی به عنوان یکی از اجزای ذهنی بهزیستی و در برگیرنده وضعیت اشتغال و آموزش است.

گزینه 3 از مقایسه درآمد ناخالص سرانه (GNP) در تعیین گستردگی نابرابری‌های استانداردهای زندگی بین جوامع استفاده می‌شود.

گزینه 4 سطح زندگی فرد را می توان با سنجش و ارزشیابی احساسات ذهنی فرد از رضایت درباره سلامت، آموزش و تامین اجتماعی ارزیابی کرد.

نمایش پاسخ

ج / از مقایسه درآمد ناخالص سرانه در تعیین گستردگی نابرابری‌های استانداردهای زندگی بین جوامع استفاده می‌شود.

بر اساس استراتژی کشوری همکاری بین سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران کدام یک از موارد زیر از مهم‌ترین جهات راهبردی همکاری این سازمان با کشور است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 ریشه‌کنی فلج اطفال

گزینه 2 مقابله با پیامدهای گذر دموگرافیک و گذر اپیدمیولوژیک

گزینه 3 اصلاحات در نظام اطلاع‌رسانی سلامت

گزینه 4 کمک به انجام پژوهش‌های کاربردی

نمایش پاسخ

ب / مقابله با پیامدهای گذر دموگرافیک و گذر اپیدمیولوژیک، از مهم‌ترین جهات راهبردی همکاری سازمان بهداشت جهانی با ایران است.

کلیات بهداشت محیط

تعداد: ۴۵

درجه سختی: آسان

نکات: ۱- در صورت نبود اب لازم جهت شستوشو بیماری تراخم محتمل است ۲- شییستوزوما قسمتی از زندگی‌ش در اب است و باعث بیماری میشد.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدامیک از بیماری‌های زیر تهدیدی برای شناگران شیرجه‌رو محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 آنسفالیت حاد آمیبی

گزینه 2 آمیبیازیس

گزینه 3 الفانتیازیس

گزینه 4 ووشریازیس

نمایش پاسخ

الف

سوال 2

دینوفلاژله‌ها (Dinoflagellates) در ایجاد کدامیک از بیماری‌های منتقله از طریق غذا نقش دارند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 مسمومیت صدف

گزینه 2 مسمومیت ماهی اسکومبروئید

گزینه 3 مسمومیت قارچ

گزینه 4 فاویسم

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

بیماری شیستوزومیازیس در کدام دسته از بیماری‌های منتقله از آب دسته‌بندی می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 Water Borne

گزینه 2 Water Washed

گزینه 3 Water Base

گزینه 4 Water Related Insect

نمایش پاسخ

ج

سوال 4

بیماری تراخم جزء کدام دسته از بیماری‌های منتقله از آب طبقه‌بندی می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 Water Borne

گزینه 2 Water Washed

گزینه 3 Water Base

گزینه 4 Water Related Insect

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

کدامیک از بیماری‌های زیر جزء بیماری‌های منتقله توسط مصرف آب است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 مالاریا

گزینه 2 تراخم

گزینه 3 حصبه

گزینه 4 شیستوزومیازیس

نمایش پاسخ

ج

سوال 6

در کدامیک از بیماری‌های زیر عامل بیماری، دوره‌ای از زندگی خود را در درون بدن ناقل آبزی سپری می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 تراخم

گزینه 2 مالاریا

گزینه 3 شیستوزومیازیس

گزینه 4 وبا

نمایش پاسخ

ج

water base

سوال 7

بروز کدامیک از بیماری‌های زیر به دلیل عدم دسترسی به آب کافی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 تراخم

گزینه 2 سل

گزینه 3 هیپاتیت A

گزینه 4 بوتولیسم

نمایش پاسخ

الف

سوال 8

بهبود کیفیت آب و عدم استفاده از دیگر منابع غیر بهداشتی آب حتی به طور موقت، در از بین رفتن کدام گروه از بیماری‌های منتقله توسط آب نقش بسزایی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 بیماری‌های منتقله توسط آب

گزینه 2 بیماری‌های ناشی از عدم شستشو کافی

گزینه 3 بیماری‌های که آب در چرخه‌ی انتقال آن‌ها نقش دارد.

گزینه 4 بیماری‌های منتقله به وسیله‌ی حشرات ناقل مرتبط با آب

نمایش پاسخ

الف

سوال 9

مسمومیت غذایی سالمونلا جزء کدامیک از مسمومیت‌هاست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد/پزشکی ریفرم و شهریور ۹۸ _ قطب تهران)

گزینه 1 حساسیت غذایی

گزینه 2 میکروبی

گزینه 3 شیمیایی

گزینه 4 انگلی

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

بهترین نشانگرهای وضع آلودگی هوا کدام گزینه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 دی‌اکسیدگوگرد- دود- ذرات معلق

گزینه 2 منواکسیدکربن- ذرات معلق- سرب

گزینه 3 دی‌اکسیدگوگرد- اکسیدهای ازت- ذرات معلق

گزینه 4 منواکسیدکربن- دود- اکسیدهای ازت

نمایش پاسخ

ج

سوال 11

به منظور پیشگیری از کدامیک از بیماری‌های زیر کمیت آب بیش از کیفیت آب تأثیر دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 حصبه

گزینه 2 وبا

گزینه 3 شبه حصبه

گزینه 4 تراخم

نمایش پاسخ

د

سوال 12

کدامیک از عناصر زیر عامل ایجاد سختی در آب آشامیدنی نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 منیزیم

گزینه 2 کلسیم

گزینه 3 سدیم

گزینه 4 آلومینیوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 13

کدام گزینه در زمره‌ی مهم‌ترین استراتژی‌های مدیریت جامع مواد زائد است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 حمل و نقل

گزینه 2 جمع‌آوری

گزینه 3 ذخیره

گزینه 4 کاهش در منابع تولید

نمایش پاسخ

د

سوال 14

کدامیک از بیماری‌های زیر توسط آب منتقل می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 سل

گزینه 2 دیفتری

گزینه 3 وبا

گزینه 4 لیشمانیوزیس

نمایش پاسخ

ج

سوال 15

افزایش کمی مقادیر آب مصرفی و بهبود شرایط دسترسی به آب، باعث پیشگیری از کدام بیماری می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 شیستوزومیازیس

گزینه 2 تراخم

گزینه 3 مالاریا

گزینه 4 وبا

نمایش پاسخ

ب

سوال 16

راه انتقال کدامیک از بیماری‌های زیر از طریق آشامیدن آب آلوده است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 تب مالت

گزینه 2 حصبه

گزینه 3 مالاریا

گزینه 4 تراخم

نمایش پاسخ

ب

سوال 17

تمام موارد زیر جزء برنامه‌های بهداشت محیط طبقه‌بندی می‌شوند بجز: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 کنترل مواد زائد خطرناک

گزینه 2 بهداشت و ایمنی فرآورده‌های غذایی

گزینه 3 پیشگیری از حوادث ناشی از کار

گزینه 4 تصفیه و دفع فاضلاب‌ها

نمایش پاسخ

ج

سوال 18

کدامیک از چالش‌های تخصصی بهداشت محیط است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 برنامه‌ریزی و آموزش

گزینه 2 علوم عمومی

گزینه 3 ارتباطات و آموزش

گزینه 4 آب و فاضلاب

نمایش پاسخ

د

سوال 19

شاخص آلودگی آب آشامیدنی، کدامیک از عوامل میکروبی زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 سالمونلا

گزینه 2 گروه کلیفرم

گزینه 3 استافیلوکوکوس

گزینه 4 شیگلا

نمایش پاسخ

ب

سوال 20

برای گندزدایی آب با کلر کدامیک از موارد زیر را مدنظر قرار نمی‌دهید؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 آب مورد گندزدایی نیازی نیست که صاف و بدون کدورت باشد.

گزینه 2 زمان تماس حداقل ۳۰ دقیقه برای از بین بردن زیستوراک‌های حساس

گزینه 3 مقدار کلر باقی‌مانده پس از یک ساعت از کلرزی باید ۱ میلی‌گرم در لیتر باشد.

گزینه 4 مقدار کلر باقی‌مانده در همه‌گیری‌ها ۲ میلی‌گرم توصیه می‌شود.

نمایش پاسخ

ب

سوال 21

بهترین مزیت کلر جهت ضد عفونی کردن آب کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 خاصیت ابقایی کلر آزاد باقی‌مانده

گزینه 2 ارزان بودن

گزینه 3 در دسترس بودن

گزینه 4 اثر بر هاگ (اسپور) باکتری‌ها

نمایش پاسخ

الف

سوال 22

مهم‌ترین خاصیت کلر جهت گندزدایی در آب کدام گزینه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 در دسترس بودن

گزینه 2 فاز ابقایی آن

گزینه 3 اثر بر تخم انگل‌ها

گزینه 4 اثر بر کیست زیاردیا

نمایش پاسخ

ب

سوال 23

کدامیک از عوامل بیماریزای زیر پایداری طولانی‌تری در آب آشامینی دارند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 سالمونلا تیفی

گزینه 2 ویبریو کلرا

گزینه 3 لپتوسپیرا

گزینه 4 اشرشیاکولی پاتوژنیک

نمایش پاسخ

ج

سوال 24

اگر مقدار املاح در آب آشامیدنی یک منطقه‌ی ۲۵۰ میلی‌گرم در لیتر باشد سختی این آب در چه حدی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 سبک

گزینه 2 سخت

گزینه 3 سختی متوسط

گزینه 4 خیلی سخت

نمایش پاسخ

ب

سوال 25

در مورد سختی آب تمام گزینه‌ها زیر صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 عمده‌ترین عامل سختی آب بی‌کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم است.

گزینه 2 یکی از راه‌های حذف سختی موقت آب جوشاندن است.

گزینه 3 ضرر پزشکی سختی آب بیش‌تر از ضرر اقتصادی آن است.

گزینه 4 اگر مقدار زیادی آب برای کف کردن صابون لازم باشد، آن آب را سخت گویند.

نمایش پاسخ

ج

سوال 26

کارایی کدامیک از مراحل تصفیه آب در حذف میکروب‌ها بیش‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 گندزدایی

گزینه 2 انعقاد و لخته‌سازی

گزینه 3 صافی شنی تند

گزینه 4 صافی شنی کند

نمایش پاسخ

د

سوال 27

کدامیک از موارد زیر جزء آلاینده‌های ثانویه محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 CO

گزینه 2 SO2

گزینه 3 NO

گزینه 4 اسماگ

نمایش پاسخ

د

سوال 28

کدامیک از بیماری‌های زیر جزء بیماری‌های شغلی است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 دیفتری

گزینه 2 مالاریا

گزینه 3 وبا

گزینه 4 بروسلوز

نمایش پاسخ

د

سوال 29

کدامیک بیماری مشترک انسان و دام نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 هاری

گزینه 2 کیست هیداتید

گزینه 3 مالاریا

گزینه 4 سل

نمایش پاسخ

ج

سوال 30

تأمین آب حاوی مقادیر مواد معدنی در حد بهینه (مانند فلورزنی به آب و کنترل سختی) در جهت کنترل بیماری‌های ناشی از محیط، با کدامیک از موارد زیر مرتبط است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 کنترل عامل و منبع

گزینه 2 کنترل نحوه‌ی انتقال

گزینه 3 کنترل حساسیت افراد

گزینه 4 کنترل فرآیند

نمایش پاسخ

الف. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 31

راه معمول ابتلا به مسمومیت غذایی باسیلیوس سرئوس (نوع تهوع‌آور) کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 برنج پخته و سرخ شده

گزینه 2 آب آلوده

گزینه 3 فرآورده‌های لبنی آلوده

گزینه 4 گوشت نپخته

نمایش پاسخ

سوال 32

کدامیک از گزینه‌های زیر در فرآیند ابتلای انسان به بیماری‌های که محیط در آن‌ها نقش دارد جزء ۳ رکن اساسی نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 ژنتیک

گزینه 2 حساسیت فردی

گزینه 3 منبع

گزینه 4 نحوه‌ی انتقال

نمایش پاسخ

سوال 33

انتقال کدامیک از بیماری‌های زیر به ترتیب از طریق هوا، آب آشامیدنی و جوندگان صورت می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 آبله‌مرغان، بروسلوز، هپاتیت E

گزینه 2 سرخک، هپاتیت E، لیشمانیوزیس

گزینه 3 تیفوس، شیگلوز، طاعون

گزینه 4 منژیت، شاگاس، بروسلوز

نمایش پاسخ

سوال 34

بیماری حصبه جزء کدام گروه از بیماری‌های مرتبط با اب است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 بیماری‌های که آب در چرخه‌ی انتقال آن‌ها نقش دارد

گزینه 2 بیماری‌های منتقله به وسیله‌ی حشرات ناقل مرتبط با آب

گزینه 3 بیماری‌های ناشی از عدم شستشوی کافی

گزینه 4 بیماری‌هایی که عامل اصلی آن در آب بوده و از طریق بلع به انسان منتقل می‌شوند

نمایش پاسخ

سوال 35

عامل این بیماری، دوره‌ای از زندگی خود را در بدن ناقل آبی سپری می‌کند و در گذشته در استان خوزستان شایع بوده است. نام بیماری چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 مالاریا

گزینه 2 شیستوزومیازیس

گزینه 3 تراخم

گزینه 4 حصبه

نمایش پاسخ

ب. شیستوزوما نوعی انگل است که دوره‌ای از زندگی خود را در بدن ناقل آبی سپری می‌کند.

سوال 36

در کدامیک از عوامل بیماریزای منتقله از راه موادغذایی، انتقال از طریق شیر و فرآورده‌های لبنی غیر بهداشتی، شایع‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 Clostridium botulinum

گزینه 2 Listeria monocytogenes

گزینه 3 Vibrio cholera

گزینه 4 Trichinella spiralis

نمایش پاسخ

ب. از بین این موارد لیستریا بیش‌تر با شیر آلوده همراهی دارد. تریشینلا با گوشت نپخته ارتباط دارد.

سوال 37

کدامیک از موارد زیر، از دسته بیماری‌هایی است که آب در چرخه‌ی انتقال آن‌ها (Water based diseases) نقش دارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 حصبه و شبه حصبه

گزینه 2 مالاریا

گزینه 3 شیستوزومیازیس

گزینه 4 تراخم

نمایش پاسخ

ج / شیستوزوما نوعی انگل است که دوره‌ای از زندگی خود را در بدن ناقل آبی سپری می‌کند.

راه معمول ابتلا به مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس (نوع تهوع‌آور) کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 فرآوری ناکافی موادغذایی کنسروی و عرضه شده در بطری

گزینه 2 فرآورده‌های گوشتی و لبنی آلوده

گزینه 3 آب آلوده، شیر و فرآورده‌های آن

گزینه 4 سرمایش ناکافی موادغذایی پخته شده و حرارت ناکافی متعاقب آن

نمایش پاسخ

د / راه معمول ابتلا به مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس سرمایش ناکافی موادغذایی پخته شده و حرارت ناکافی متعاقب آن است. ناشی از برنج و گوشت خوب پخته نشده است.

مهم‌ترین هدف بهداشت محیط عبارت است از: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 حفظ سلامتی اکوسیستم‌ها

گزینه 2 مطالعه‌ی کیفیت محیط

گزینه 3 مطالعه‌ی عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان

گزینه 4 مطالعه و پژوهش بر روی اکوسیستم‌ها

نمایش پاسخ

ج / مهم‌ترین هدف بهداشت محیط مطالعه‌ی عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان است.

در طبقه‌بندی بیماری‌های منتقله از راه آب، کدامیک از بیماری‌های زیر Water Born Disease محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 شیستوزو میازیس

گزینه 2 تراخم

گزینه 3 وبا

گزینه 4 مالاریا

نمایش پاسخ

ج / وبا و حصبه و تیفوئید Water Born Disease می‌باشند.

کدامیک از بیماری‌های زیر از طریق جوندگان به انسان منتقل می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 بروسلوز (بروسلامای تنسیس)

گزینه 2 سل (لایکوباتدیوم توبرکولوزیس)

گزینه 3 طاعون (برسینیاسپتیس)

گزینه 4 تریپشینوز (تریشینلا اسپرالیس)

نمایش پاسخ

ج / طاعون از طریق موش به انسان منتقل می‌شود.

مهم‌ترین راهبرد بهداشت محیط در کنترل بیماری‌ها، بر کنترل و حذف در کدام بخش از ساختار زنجیره‌ای اشاعه‌ی بیماری‌ها تأکید دارد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 منبع

گزینه 2 نحوه‌ی انتقال

گزینه 3 حساسیت فرد

گزینه 4 موانع چندگان‌ه

نمایش پاسخ

د / مهم‌ترین راهبرد بهداشت محیط در کنترل بیماری‌ها کنترل و حذف موانع چندگان‌ه است.

«تعطیل کردن رستوران‌ها و اماکن عمومی غیرضروري» براي جلوگیری از گسترش بیماری کووید ۱۹، تأثیر کدامیک از اجزای مدل مثلث در سبب‌شناسی بیماری‌ها را نشان می‌دهد؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹– میان‌دوره)

گزینه 1 عامل

گزینه 2 ناقل

گزینه 3 محیط

گزینه 4 میزبان

نمایش پاسخ

ج «تعطیل کردن رستوران‌ها و اماکن عمومی غیرضروري» براي جلوگیری از گسترش بیماری کووید ۱۹، تاثیر محیط را نشان می‌دهد.

سوال 44

کدام‌یک از موارد زیر، از چالش‌های عمومی بهداشت محیط محسوب می‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 مواد غذایی

گزینه 2 جمعیت و مسکن

گزینه 3 آسیب‌های زیست محیطی

گزینه 4 نگرش حرفه‌ای

نمایش پاسخ

د / نگرش حرفه‌ای از چالش‌های عمومی بهداشت محیط محسوب می‌شود.

سوال 45

کدام‌یک از موارد زیر از چالش‌های تخصصی بهداشت محیط است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 آگاهی از روش‌های ستادی مورد استفاده در برنامه‌های مدیریت بهداشت محیط

گزینه 2 درک مشکلات کلی بهداشت محیط و تقدم‌های بهداشتی

گزینه 3 توانایی تعیین قابلیت پذیرش و انجام اقدامات قانونی

گزینه 4 آگاهی از بیماری‌های منتقله توسط مواد غذایی و راه‌های کنترل آن‌ها

نمایش پاسخ

د آگاهی از بیماری‌های منتقله توسط مواد غذایی و راه‌های کنترل آن‌ها از چالش‌های تخصصی بهداشت محیط است.

مروری بر واژه‌های رایج در بهداشت عمومی

تعدادسوال: ۶۷

درجه سختی:متوسط

نکات:۱-مخزن عفونت :هر شخص حیوان بندپا گیاه و...که عامل عفونی به شکل عادی در ان زندگی و تکثیر کند به طوری که ادامه حیات عامل عفونی به ان بستگی داشته باشد ۲-ایمنی گروهی: مصونیت یک گروه یا جامعه.سه شرط دارد ۱-عفونت فقط بین یک گونه باشد۲-ایمنی قوی باشه و۳- به صورت مستقیم و غیر منتقل شود

۳-بیماری زایی: قدرت ایجاد بیماری یک عامل عفونی و میشه تعداد موارد بیمار شده تقسیم برتعداد موارد عفونت پیدا کرده.

۴- دوره ی کمون :فاصله زمانی بین ورود عامل پاتوژن و شروع پاسخ ایمنی بدن.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

دوره‌ی کمون خارجی (Extrinsic incubation period) مربوط به کدام روش انتقال عفونت است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 انتقال توسط وسیله

گزینه 2 انتقال مکانیکی با ناقل

گزینه 3 انتقال بیولوژیکی

گزینه 4 انتقال مستقیم

نمایش پاسخ

ج

سوال 2

کدام گزینه به مقاومت یک گروه از مردم در مقابل هجوم و انتشار یک عامل عفونی اطلاق می‌شود که مبنای آن مقاومت نسبت زیادی از افراد جامعه است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 مصونیت فعال (Active immunity)

گزینه 2 مصونیت انفعالی (Passive immunity)

گزینه 3 ایمنی یا مصونیت گروهی (Herd immunity)

گزینه 4 ایمن‌سازی نهفته (Latent immunization)

نمایش پاسخ

ج

سوال 3

کدامیک از شرایط مهم برقراری ایمنی گروهی نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 انتقال عامل بیماری (عفونت) تنها بین یک گونه‌ی میزبانی

گزینه 2 ایجاد ایمنی قوی توسط عفونت

گزینه 3 انتقال عفونت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در افراد

گزینه 4 وجود مخزن انسانی عفونت

نمایش پاسخ

د

سوال 4

مصونیت انفعالی (passive Immunity) در تمام حالات زیر بوجود می‌آید. بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال و اهواز)

گزینه 1 ابتلا به عفونت‌های بدون علامت

گزینه 2 مصرف سرم در دوران نقاهت بیماری

گزینه 3 تزریق سرم حیوان ایمن

گزینه 4 انتقال آنتی‌بادی از مادر به جنین

نمایش پاسخ

الف

سوال 5

مصونیت در اثر عفونت طبیعی یا به طور مصنوعی در اثر تزریق عامل عفونی بیماری کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 مصونیت انفعالی Passive Immunity

گزینه 2 مصونیت فعال Active Immunity

گزینه 3 مصونیت نهفته Latent Immunity

گزینه 4 مصونیت گروهی Herd Immunity

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

ایمنی‌سازی نهفته چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 مقاومتی است که در اثر عبور پادتن‌های مادری یا به شکل مصنوعی به وجود می‌آید.

گزینه 2 به مقاومتی گفته می‌شود که در اثر حضور پادتن در مقابل عفونت‌ها به وجود می‌آید.

گزینه 3 مقاومتی است که در اثر عفونت طبیعی یا در اثر تزریق عامل عفونی ایجاد می‌شود.

گزینه 4 فرآیند به وجود آمدن ایمنی در نتیجه یک یا چند عفونت ناآشکار را گویند.

نمایش پاسخ

د

سوال 7

مصونیت و مقاومت گروهی در جامعه در مقابل هجوم و انتشار یک بیماری عفونی چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 Herd immunity

گزینه 2 Passive immunity

گزینه 3 Latant immunity

گزینه 4 Transient immunity

نمایش پاسخ

الف

سوال 8

توان یک عامل بیماریزا در ایجاد بیماری آشکار بالینی عبارتست از: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 Infectivity

گزینه 2 Pathogenicity

گزینه 3 Virulence

گزینه 4 Colonization

نمایش پاسخ

ب

سوال 9

واژه‌ای که برای بیان قدرت ایجاد بیماری یک عامل (زنده) بیمار کننده، بکار می‌رود. کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 Infectiousness

گزینه 2 Infectivity

گزینه 3 Virulence

گزینه 4 Pathogenicity

نمایش پاسخ

د

سوال 10

«تعداد موارد بیمار شده تقسیم بر تعداد موارد عفونت پیدا کرده» با کدام گزینه همخوانی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 Pathogenecity

گزینه 2 Pathogenesis

گزینه 3 Virulence

گزینه 4 Infectivity

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

تعریف «حدت» (Virulence) یک بیماری عفونی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز/ پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 شدت ایجاد بیماری در افراد عفونی شده

گزینه 2 قدرت انتقال بیماری به سایر افراد

گزینه 3 قدرت ایجاد بیماری در خود فرد

گزینه 4 قدرت تکثیر عامل بیماریزا در بدن

نمایش پاسخ

الف

سوال 12

کدام گزینه از راههای انتقال مستقیم بیماری‌ها است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 گازگرفتن توسط حیوان

گزینه 2 انتقال از طریق اشیاء

گزینه 3 انتقال از طریق خون

گزینه 4 آشامیدن آب آلوده

نمایش پاسخ

الف

سوال 13

کدامیک از گزینه‌های زیر به قدرت ایجاد بیماری یک عامل عفونی، مانند میکروب سل، اطلاق می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 عفونت infection

گزینه 2 حدت virulence

گزینه 3 عفونت‌زایی infectivity

گزینه 4 بیماری‌زایی Pathogenicity

نمایش پاسخ

د

سوال 14

خاصیت یک میکرو ارگانیسم در ایجاد یک بیماری آشکار (موارد بالینی) در افراد مواجهه یافته با عفونت، تعریف کدامیک از واژه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 پاتوژنیسیته یا قدرت بیماری‌زایی

گزینه 2 ویرولانسی یا درجه‌ی قابلیت بیماری‌زایی

گزینه 3 عفونت‌زایی (Infectivity)

گزینه 4 میزان سمیت عامل بیماریزا

نمایش پاسخ

الف

سوال 15

قدرت ایجاد بیماری یک عامل (زنده) چه نام دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 بیماری‌زایی (Pathogenicity)

گزینه 2 عفونت‌زایی (Infectivity)

گزینه 3 حدت بیماری (Virulence)

گزینه 4 قدرت سرایت (Contagiousness)

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

مواجهه با کدامیک از موارد زیر مصونیت غیر فعال (انفعالی) ایجاد می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 سرم گلوبولین انسانی

گزینه 2 باکتری سل

گزینه 3 سرم انسانی حاوی آنتی‌بیوتیک

گزینه 4 ویروس هپاتیت

نمایش پاسخ

الف

سوال 17

فاصله‌ی زمانی بین جهش‌های سلولی ناشی از پرتوها تا ظهور سرطان خون بیانگر کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 دوره‌ی استقرار (induction period)

گزینه 2 دوره‌ی کمون (incubation period)

گزینه 3 دوره‌ی سرایت‌پذیری (communicable period)

گزینه 4 دوره‌ای بودن دیرپا (secular trend)

نمایش پاسخ

الف

سوال 18

کدامیک از موارد زیر فاصله‌ی زمانی بین شروع تأثیر علیتی یک عامل تا ایجاد اولین نشانه‌های بیماری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 دوره‌ی استقرار Induction period

گزینه 2 دوره‌ی کمون Incubation period

گزینه 3 دوره‌ی قابلیت سرایت Communicable period

گزینه 4 دوره‌ای بودن – فصلی Seasonal cyclicity

نمایش پاسخ

الف

سوال 19

ریشه‌کنی بیماری Eradication of Disease یعنی از بین بردن؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 ناقل بیماری

گزینه 2 مخزن بیماری

گزینه 3 منبع بیماری

گزینه 4 عامل بیماری

نمایش پاسخ

د

سوال 20

مشخصه‌ای از عامل بیماریزا مبنی بر قابلیتش در ورود، بقاء و تکثیر در میزبان چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 infectiousness

گزینه 2 infectivity

گزینه 3 pathogenesis

گزینه 4 pathogenicity

نمایش پاسخ

ب

سوال 21

«مشخصه‌ای از بیماری در زمینه‌ی سهولت نسبی انتقال به میزبان‌های دیگر» با کدام گزینه همخوانی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 عفونی بودن Infectiousness

گزینه 2 عفونت‌زایی Infectivity

گزینه 3 حدت Virulence

گزینه 4 بیماری‌زایی Pathogenicity

نمایش پاسخ

سوال 22

قدرت ورود، ادامهی حیات و تکثیر عامل بیماریزا در میزبان را چه می‌نامند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 بیماری‌زایی Pathogenecity

گزینه 2 میزان کشندگی Case Fatality Rate

گزینه 3 شدت بیماری‌زایی Severity

گزینه 4 عفونت‌زایی Infectivity

نمایش پاسخ

د

سوال 23

کدام گزینه در رابطه با تعریف واژه‌ی عفونت‌زایی (Infectivity) صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 ورود و تکامل با تولید یک عامل عفونت در بدن انسان

گزینه 2 مشخصه‌ای از بیماری در زمینه‌ی سهولت نسبی انتقال به میزبان‌های دیگر

گزینه 3 مشخصه‌ای از عامل بیماریزا مبنی بر قابلیتش در ورود، بقاء و تکثیر در میزبان

گزینه 4 بیماری‌زایی یک عامل که در حالت عادی به صورت هم‌زیست با میزبان زندگی می‌کند.

نمایش پاسخ

ج

سوال 24

محدودیت فعالیت افراد و حیوانات سالمی که در دوره‌ی نهفتگی یک بیماری مسری در معرض آن قرار گرفته‌اند. چه نام دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 جداسازی

گزینه 2 قرنطینه

گزینه 3 گندزدایی

گزینه 4 کنترل

نمایش پاسخ

ب

سوال 25

شخص جانور، شیء یا ماده‌ای که عامل عفونت از آن بلافاصله به یک میزبان حساس منتقل می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز/پزشکی کلاسیک و ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 میزبان Host

گزینه 2 منبع Source

گزینه 3 مخزن Reservoir

گزینه 4 حامل Carrier

نمایش پاسخ

ب

سوال 26

«دور نگهداشتن فرد مشکوک به بیماری به اندازه‌ی حداکثر دوره‌ی کمون بیماری از سایر افراد» به مفهوم کدام عبارت نزدیک‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 جداسازی

گزینه 2 قرنطینه

گزینه 3 مراقبت فعال

گزینه 4 مراقبت غیر فعال

نمایش پاسخ

ب

سوال 27

در چه مواردی از جداسازی Isolation جهت کنترل بیماری استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 جدا ساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران پرودرومال بیماری

گزینه 2 جدا ساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران واگیری بیمار

گزینه 3 جداساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران نقاحت بیماری

گزینه 4 جدا ساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران علامت‌دار بیماری

نمایش پاسخ

ب

شخص، حیوان و یا شیء که یک عامل عفونی در آن زندگی و تکثیر نموده و به میزبان حساس دیگر منتقل می‌شود، چه نام دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز/ پزشکی شهریور ۹۶ قطب اهواز)

گزینه 1 منبع بیماری

گزینه 2 مخزن بیماری

گزینه 3 میزبان واسط

گزینه 4 مورد شاخص

نمایش پاسخ

ب

اثر تجمعی دو یا چند عامل بیماریزا در ایجاد بیماری با کدامیک از واژه‌های زیر متناسب است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 پاتوژنیسیته

گزینه 2 ویرولانسی

گزینه 3 آنتاگونیسم

گزینه 4 سینرژیسم

نمایش پاسخ

د

هر شخص، حیوان، بندپا، گیاه و غیره که یکی از عوامل عفونی به شکل عادی در آن زندگی و تکثیر می‌کند. به طوری که ادامهی حیات عامل عفونی به آن بستگی داشته باشد چه نام دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۶_ قطب شمال)

گزینه 1 مخزن

گزینه 2 منبع

گزینه 3 مظنون

گزینه 4 محیط

نمایش پاسخ

الف

به فرد آلوده‌ای که بدون نشان دادن علائم بالینی قدرت انتقال عامل بیماریزا را به سایرین دارد کدام اصطلاح زیر اطلاق می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 مخزن

گزینه 2 منبع

گزینه 3 حامل

گزینه 4 ناقل

نمایش پاسخ

ج و د

فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین علائم و نشانه‌های بیماری مورد بحث را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶. قطب تبریز)

گزینه 1 دوره‌ی کمون

گزینه 2 دوره‌ی قابلیت سرایت

گزینه 3 دوره‌ی استقرار

گزینه 4 دوره‌ی بیماریزایی

نمایش پاسخ

الف

تمام موارد زیر درباره‌ی مصونیت گروهی (Herd immunity) صحیح است بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 هرچه ابتلا به بیماری افزایش یابد، مصونیت گروهی بیش‌تر می‌شود

گزینه 2 در پیشگیری از بیماری کزاز، مصونیت گروهی اثری ندارد.

گزینه 3 مصونیتی است که فراتر از مصونیت افراد دارای ایمنی با واکسیناسیون عمل می‌کند.

گزینه 4 مصونیتی است که با ابتلا به بیماری‌های تحت بالینی (Subclinical) ارتباطی ندارد.

نمایش پاسخ

د

تمام موارد زیر در مورد مصونیت گروهی (Herd Immunity) صحیح است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 با انجام واکسیناسیون بیماری موردنظر ارتباطی ندارد.

گزینه 2 نوعی ایمنی فعال به شمار می‌رود.

گزینه 3 بعد از اپیدمی بیماری مورد نظر افزایش می‌یابد.

گزینه 4 با عبور پادتن‌های مادری ارتباط تعیین کننده ندارد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 35

فاصله‌ی زمانی بین حمله یک ارگانیزم و ظهور علائم بیماری چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 دوره‌ی کمون

گزینه 2 دوره‌ی سرایت

گزینه 3 دوره‌ی پنهان

گزینه 4 زمان تجدید نسل

نمایش پاسخ

الف

سوال 36

ورود و تکامل یا تکثیر یک عامل عفونی به بدن انسان یا حیوان چه نامیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 Infection

گزینه 2 Infectivity

گزینه 3 Infectiousness

گزینه 4 Disease

نمایش پاسخ

الف

سوال 37

فاصله‌ی زمانی بین ورود عامل بیماری‌زای عفونی و پاسخ ایمنی قابل اندازه‌گیری را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 دوره‌ی کمون بیماری

گزینه 2 دوره‌ی کمون عفونت

گزینه 3 دوره‌ی کمون خارجی

گزینه 4 دوره‌ی نهفتگی

نمایش پاسخ

ب

سوال 38

کاهش انتقال بیماری در جامعه به سطح بسیار پایینی که از قبل تعیین شده باشد را چه می‌گویند؟ (دندان‌پزشکی شهریور و اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 مهار

گزینه 2 ریشه‌کنی

گزینه 3 حذف

گزینه 4 مبارزه

نمایش پاسخ

ج. حذف یا eradication به معنی کاهش بسیار زیاد انتقال یه بیماری در جامعه‌ست. یه مرحله قبل از ریشه‌کنی

سوال 39

تمام گزینه‌های زیر در مورد موارد تحت بالینی (subclinical) ابتلا به بیماری‌ها صحیح است، بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 ابتلا به موارد تحت بالینی بیماری نقش مهمی در تداوم زنجیره‌ی چرخش عفونت در جامعه ایفاء می‌نماید.

گزینه 2 این موارد از بیماری تنها با تست‌های آزمایشگاهی قابل تشخیص‌اند.

گزینه 3 در بسیاری از بیماری‌های عفونی موارد بدون علائم بالینی بیماری، به مصونیت منجر می‌شود.

گزینه 4 میزبان این نوع ابتلا، بیماری را به دیگران منتقل نمی‌کند.

نمایش پاسخ

د

سوال 40

رشد و تکثیر شپش تن در سطح بدن با کدام واژه معرفی می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 Infection

گزینه 2 Disease

گزینه 3 Infestation

گزینه 4 Induction

نمایش پاسخ

ج

سوال 41

عفونتی که در بیمار مراجعه کننده به بیمارستان هنگام مراجعه به آن مبتلا نبوده و در دوره‌ی کمون آن نیز قرار ندارد، تعریف کدامیک از عبارت‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 Notifiable Disease

گزینه 2 Infectious Disease

گزینه 3 Nosocom ial Infection

گزینه 4 Infectious Agent

نمایش پاسخ

ج. Nosocom ial Infection به عفونتی گفته می‌شود که فرد در بیمارستان و به دلیل بستری شدن خود به آن مبتلا می‌شود.

سوال 42

میزبانی که انگل در بدن آن به بلوغ می‌رسد و یا مراحل جنسی خود را می‌گذراند، چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 قطعی

گزینه 2 ترابر (ناقل)

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 واسطه‌ای

نمایش پاسخ

الف. مرحله‌ی جنسی در بدن میزبان اصلی و مرحله‌ی غیر جنسی در بدن میزبان واسط انجام می‌شود.

سوال 43

کدام عبارت در مورد دوره‌ی کمون (نهفتگی) درست است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا زمان بهبودی بیماری موردنظر

گزینه 2 فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین علائم و نشانه‌های بیماری مورد بحث

گزینه 3 فاصله‌ی زمانی بین ورود عامل عفونی و انتقال عامل عفونی به فردی دیگر

گزینه 4 فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل عفونی و همه‌گیر شدن بیماری ناشی از آن عامل عفونی

نمایش پاسخ

ب / فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین علائم و نشانه‌های بیماری را دوره‌ی کمون یا نهفتگی گویند.

سوال 44

ایمنی فعال (Active Immunity) از چه راه‌هایی در انسان ایجاد نمی‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 عفونت طبیعی با نشانه‌های بالینی

گزینه 2 عفونت طبیعی بدون نشانه‌های بالینی

گزینه 3 عفونت مصنوعی از طریق واکسن

گزینه 4 عفونت مصنوعی با تزریق پادتن

نمایش پاسخ

د / ایمنی فعال یا از طریق واکسن یا از طریق بیمار شدن ایجاد می‌شود.

سوال 45

در اپیدمیولوژی بیماری‌های عفونی، نسبت موارد مبتلا شده به یک بیماری به موارد عفونت یافته با آن بیماری، مبین کدامیک از واژه‌های زیر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 بیماری‌زایی

گزینه 2 عفونت‌زایی

گزینه 3 عفونی بودن

گزینه 4 حدت

نمایش پاسخ

الف / بیماری‌زایی برای بیان قدرت ایجاد بیماری یک عامل بیمار کننده به کار می‌رود و به معنای نسبت موارد مبتلا شده به یک بیماری به موارد عفونت یافته با آن بیماری است.

سوال 46

کدام بیماری غیر بالینی زیر را تحت بالینی Subclinical در نظر می‌گیرید؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 در حال پیشرفت به سمت بیماری بالینی است.

گزینه 2 در جهت آشکار شدن بالینی پیش نمی‌رود.

گزینه 3 هیچ‌گونه تکثیر فعال عامل بیماریزا رخ نمی‌دهد.

گزینه 4 شواهد ناخوشی بالینی عفونت وجود ندارد.

نمایش پاسخ

ب / بیماری‌ای که در جهت آشکار شدن بالینی پیش نمی‌رود را تحت بالینی می‌گویند.

سوال 47

تأمین مسکن مناسب و کنترل آلودگی هوا به ترتیب از راست به چپ جزء کدام نوع کنترل بیماری در برنامه‌ی راهبردی بهداشت محیط است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 منبع- نحوه‌ی انتقال

گزینه 2 منبع- حساسیت فرد

گزینه 3 نحوه‌ی انتقال- حساسیت فرد

گزینه 4 نحوه‌ی انتقال- منبع

نمایش پاسخ

الف / تأمین مسکن مناسب و کنترل آلودگی هوا به ترتیب جزء منبع- نحوه‌ی انتقال در کنترل بیماری می‌باشند.

سوال 48

کدامیک از موارد زیر جزء شرایط برقراری ایمنی گروهی (Herd immunity) محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

گزینه 1 عامل عفونت باید تنها در بین یک گونه از میزبان قابل انتقال باشد.

گزینه 2 انتقال عامل عفونت در بین افراد باید به طور غیر مستقیم باشد.

گزینه 3 عامل عفونت باید مخزن غیر انسانی نداشته باشد.

گزینه 4 عامل عفونت باید قادر به ایجاد ایمنی قوی در میزبان باشد.

نمایش پاسخ

ب / انتقال عامل عفونت در بین افراد باید به طور مستقیم و غیر مستقیم باشد.

سوال 49

در خصوص فاکتورهای علیت بیماری‌ها، مواجهه یافتگی با عوامل خطرزا، جزء کدام دسته از عوامل زیر محسوب می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 عوامل تشدید کننده‌ی Enabling Factors

گزینه 2 عوامل تسریع کننده‌ی Precipitating Factors

گزینه 3 عوامل تقویت کننده‌ی Reinforcing Factors

گزینه 4 عوامل زمینه‌ساز Predisposing Factors

نمایش پاسخ

ب / عوامل تسریع کننده‌ی یک بیماری عواملی هستند که سرعت و احتمال بیمار شدن فرد را افزایش می‌دهند مانند مواجهه یافتگی با عوامل خطرزا.

سوال 50

تعریف «مقداری که اکثر افراد معمولی می‌توانند به مدت ۸ ساعت در روز و ۴۰ ساعت در هفته برای سال‌ها بدون نگرانی در معرض آن قرار بگیرند»، به کدام گزینه اشاره دارد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 اصول بهداشت حرفه‌ای

گزینه 2 حد تعیین شده‌ی استاندارد

گزینه 3 قابلیت‌های جسمی افراد

گزینه 4 ماتریس ارزیابی ریسک

نمایش پاسخ

ب / حد تعیین شده‌ی استاندارد برای یک عامل زیان‌آور، مقداری است که اکثر افراد معمولی به مدت ۸ ساعت در روز و ۴۰ ساعت در هفته می‌توانند برای سال‌ها بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند.

سوال 51

حد تعیین شده‌ی استاندارد (Threshold limit volume) برای یک عامل زیان‌آور، مقداری است که اکثر افراد معمولی به مدت چند ساعت در هفته می‌توانند برای سال‌ها بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 ۵۰

گزینه 2 ۴۰

گزینه 3 ۳۰

گزینه 4 ۲۰

نمایش پاسخ

ب / حد تعیین شده‌ی استاندارد برای یک عامل زیان‌آور، مقداری است که اکثر افراد معمولی به مدت ۸ ساعت در روز و ۴۰ ساعت در هفته می‌توانند برای سال‌ها بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند.

سوال 52

سیر طبیعی بیماری از چه زمانی شروع می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

گزینه 1 مواجهه با عامل

گزینه 2 ورود عامل به بدن

گزینه 3 قابل تشخیص بودن بیماری

گزینه 4 بروز علائم بیماری

نمایش پاسخ

الف / سیر طبیعی بیماری از مواجهه با عامل شروع می‌شود و فاصله‌ی زمانی بین هجوم یک عامل بیماریزای عفونی تا ظهور اولین علائم و نشانه‌های بیماری را دوره‌ی کمون یا نهفتگی گویند.

سوال 53

نسبت تعداد موارد شدید به تعداد کل افراد مبتلا به بیماری با کدام خصوصیت بیماریزایی عوامل بیماری زا مطابقت دارد؟ (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 ویرولانس

گزینه 2 پاتوژنیسیته

گزینه 3 سینرژیسم

گزینه 4 قدرت سمی

نمایش پاسخ

الف. شدت و قدرت تهاجمی یک عامل عفونی بیماری‌زا را میزان ویرولانس آن گویند

سوال 54

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های «حامل عفونت» (carrier) نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 نبود نشانه‌های تشخیص‌پذیر بیماری

گزینه 2 حضور عامل بیماری در بدن

گزینه 3 عدم امکان انتقال بیماری

گزینه 4 ایجاد شدن به علت درمان ناکافی

نمایش پاسخ

ج. حامل بیماری خودش علامت نداره ولی می‌تونه بقیه رو آلوده کنه. مثل همین ناقلای ناقلاًی کرونا

سوال 55

مقاومت یک گروه از مردم را در مقابل هجوم و انتشار یک عامل عفونی، به دلیل وجود مقاومت نسبت زیادی از تک تک افراد آن جامعه تحت تأثیر ابتلاء یا واکسیناسیون را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 Active Immunity

گزینه 2 Herd Immunity

گزینه 3 Passive Immunity

گزینه 4 Latent Immunity

نمایش پاسخ

ب

سوال 56

کدام گزینه‌ی زیر ایمنی اکتسابی فعال محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 ایمنی متعاقب ابتلا به بیماری تحت بالینی

گزینه 2 انتقال ایمنی از طریق شیر مادر

گزینه 3 انتقال ایمنی از طریق جفت

گزینه 4 تزریق ایمونوگلوبولین

سوال 57

محدودیت یک فرد خاص که منجر به محدودیت یا جلوگیری از ایفای نقش طبیعی فرد در جامعه (بسته به جنس، سن، عوامل اجتماعی و فرهنگی) می‌شود. با کدام گزینه‌ی زیر مطابقت دارد؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 Disease

گزینه 2 Disability

گزینه 3 Handicap

گزینه 4 Impairment

نمایش پاسخ

ج. اگه فرهنگ جامعه باعث بشه که فرد معلول از یه سری چیزا محروم بشه بهش میگیم هندی‌کپ

سوال 58

برای نسبت دادن وضعیت حامل به یک بیمار عفونی کدام شرایط زیر الزامی نیست؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۹_کشوری)

گزینه 1 نداشتن علایم بیماری

گزینه 2 مزمن بودن بیماری

گزینه 3 وجود عامل عفونت زا در بدن

گزینه 4 سرایت پذیری عفونت

نمایش پاسخ

ب/ بقیه موارد در فرد حامل بیماری الزاما وجود دارد.

سوال 59

قطع انتقال عفونت از طریق از بین بردن عامل بیماری زا با کدامیک از گزینه های زیر مطابقت دارد؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۹_ کشوری)

گزینه 1 حذف بیماری

گزینه 2 ریشه کنی بیماری

گزینه 3 مبارزه با بیماری

گزینه 4 مراقبت از بیماری

نمایش پاسخ

ب/ طبق تعریف متوقف کردن کامل عفونت در نتیجه از بین بردن عامل عفونی ریشه کنی نام دارد.

سوال 60

توانایی عامل بیماریزا در ورود بقا و تکثیر در میزبان را چه می نامند؟ (پزشکی شهریور ۹۹_کشوری)

گزینه 1 عفونی بودن infectiousness

گزینه 2 Infectivity عفونت زایی

گزینه 3 عفونتinfection

گزینه 4 الودگیcontamination

نمایش پاسخ

ب/ طبق تعریف

سوال 61

تمامي گزینه‌هاي زیر در موارد ابتلاي تحت باليني صحیح است، به جز: (علوم پایه پزشکی دی ۹۹- میان دوره)

گزینه 1 باعث ایجاد مصونیت در بزرگسالان، در برابر برخی عفونت‌هاست.

گزینه 2 صرفاً توسط انجام تست‌های آزمایشگاهی قابل شناسایی است.

گزینه 3 میزبان عامل عفونت‌زا را منتشر نمی‌کند.

گزینه 4 نقش بسیار مهمی در حفظ ایمنی جمعی ایفا می‌کند.

نمایش پاسخ

ج / در موارد ابتلاي تحت باليني میزبان عامل عفونت‌زا را منتشر می‌کند.

سوال 62

در صورتی که پوشش واکسیناسیون جمعیت بر علیه بیماری سرخک به بالای ۹۰ درصد برسد، می‌تواند باعث قطع زنجیره انتقال شود و حتی افراد غیر واکسینه این جمعیت

هم به بیماری مبتلا نشوند. این پدیده چه نامیده می‌شود؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹- میان دوره)

گزینه 1 ایمنی ذاتی

گزینه 2 ایمنی اکتسابی

گزینه 3 ایمنی جمعی

گزینه 4 ایمنی غیرفعال

نمایش پاسخ

ج / این پدیده ایمنی جمعی نوعی محافظت غیرمستقیم از بیماری‌های عفونی است که زمانی اتفاق می‌افتد که درصد زیادی از جمعیت در اثر عفونت، از طریق عفونت‌های

قبلی یا واکسیناسیون مصون شوند.

سوال 63

برای محاسبه حساسیت (Sensitivity) یک آزمون غربالی، برای صورت کسر، به کدامیک از اطلاعات زیر نیاز دارید؟ (علوم پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 افراد سالمی که به وسیله آزمون، منفی تشخیص داده شده‌اند.

گزینه 2 افراد بیماری که به وسیله آزمون، منفی تشخیص داده شده‌اند.

گزینه 3 افراد سالمی که به وسیله آزمون، مثبت تشخیص داده شده‌اند.

گزینه 4 افراد بیماری که به وسیله آزمون، مثبت تشخیص داده شده‌اند.

نمایش پاسخ

د / برای صورت کسر به افراد بیماری که به وسیله آزمون، مثبت تشخیص داده شده‌اند نیاز است.

سوال 64

بسیاری از افرادی که به بیماری کووید ۱۹ مبتلا می‌شوند، نشانه بالینی ندارند و در سیر پیشرفت بیماری هم نشانه‌های بالینی پیدا نمی‌کنند. کدام گزینه به این شکل از بیماری اشاره دارد؟ (علوم پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 Clinical

گزینه 2 Preclinical

گزینه 3 Subclinical

گزینه 4 Persistent

نمایش پاسخ

ج / در مرحله ساب کلینیک بیمار نشانه بالینی ندارد.

سوال 65

کدام گزینه در مورد ایمنی گروهی صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 حتی در صورتی که عامل عفونت، مخزن غیرانسانی داشته باشد، ایمنی گروهی در انسان‌ها امکان پذیر است.

گزینه 2 نسبتی از افراد که باید ایمن باشند تا ایمنی گروهی عمل کند، در مورد همه بیماری‌ها ثابت است.

گزینه 3 ایمنی گروهی فقط در صورت واکسیناسیون گسترده به وجود می‌آید.

گزینه 4 در صورت ایجاد ایمنی گروهی، احتمال ابتلا به بیماری در افراد حساس هم بسیار کاهش می‌یابد.

نمایش پاسخ

د احتمال ابتلا به بیماری در افراد حساس، در صورت ایجاد ایمنی گروهی، بسیار کاهش می‌یابد.

سوال 66

کدام یک از موارد زیر از شاخص‌های عفونت‌زایی (Infectivity) یک بیماری به شمار می‌رود؟ (علوم پایه دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره)

گزینه 1 میزان حمله‌ی ثانویه (Secondary attack rate)

گزینه 2 دوره کمون (Incubation period)

گزینه 3 شدت بیماری‌زایی (Pathogenicity)

گزینه 4 کشندگی بیماری (Case fatality rate)

نمایش پاسخ

الف / قدرت ورود، ادامه حیات و تکثیر عامل بیماری را در میزبان را عفونت‌زایی (Infectivity) می‌گویند که از شاخص‌های آن، میزان حمله ثانویه عامل پاتوژن است.

سوال 67

در قرنطینه کدام یک از گروه‌های زیر، تحت پوشش برنامه سلامتی هستند؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹- میان دوره کشوری)

گزینه 1 مبتلایان اخیر

گزینه 2 افراد در فاز نقاهت

گزینه 3 تماس یافتگان

گزینه 4 حاملین مزمن

نمایش پاسخ

ج/ دور نگه داشتن فرد مشکوک به بیماری، به اندازه حداکثر دوره کمون بیماری از سایر افراد؛ قرنطینه نامیده می‌شود که طی آن، تماس یافتگان، تحت پوشش برنامه سلامتی قرار می‌گیرند.

وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری‌های واگیردار کشور

تعداد: ۱۶

درجه سختی: آسان

نکات: ۱- گزارش تلفنی و فوری بیماری ها در سبب سبز کامل حفظ شود واز این دسته حیوانگزیدگی و فلج شل حاد بیشتر سوال آماده است.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدامیک از هپاتیت‌ها شایع‌ترین هپاتیت بعد از انتقال خون است؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۶- مشترک کشوری)

گزینه 1 هپاتیت B

گزینه 2 هپاتیت C

گزینه 3 هپاتیت D

گزینه 4 هپاتیت E

نمایش پاسخ

ب

سوال 2

کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش فوری (تلفنی) است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران/پزشکی اسفند ۹۳_ قطب مشهد))

گزینه 1 عفونت HIV

گزینه 2 سل

گزینه 3 فلج شل حاد

گزینه 4 شیگلوزیس

نمایش پاسخ

ج

سوال 3

در نظام گزارش‌دهی بیماری‌ها در ایران، کدام بیماری مشمول گزارش فوری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 سل

گزینه 2 ایدز

گزینه 3 هپاتیت‌های ویروسی

گزینه 4 مننژیت

نمایش پاسخ

د

سوال 4

براساس بازنگری سال ۱۳۸۳، گزارش‌دهی بیماری‌ها در ایران، کدام بیماری مشمول گزارش فوری (تلفنی) است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ایدز و عفونت HIV

گزینه 2 حیوان گزیدگی

گزینه 3 تب‌مالت

گزینه 4 سل

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش فوری (تلفنی) است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 تب تیفوئید

گزینه 2 سرخک

گزینه 3 ایدز

گزینه 4 تب‌مالت

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش فوری (تلفنی) است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 جذام

گزینه 2 سل

گزینه 3 مالاریا

گزینه 4 هپاتیت‌های ویروسی

نمایش پاسخ

ج

سوال 7

کدام بیماری در سیستم مراقبت بیماری‌ها گزارش تلفنی ندارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 حیوان گزیدگی

گزینه 2 سل

گزینه 3 کزاز نوزادی

گزینه 4 سرخک

نمایش پاسخ

ب

سوال 8

در سیستم مراقبت بیماری‌ها در کشور ایران، براساس بازنگری سال ۱۳۸۳ کدام بیماری مشمول گزارش فوری (تلفنی) است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 ایدز

گزینه 2 مالاریا

گزینه 3 تب مالت

گزینه 4 هپاتیت ویروسی

نمایش پاسخ

ب

سوال 9

کدامیک از موارد زیر از مشخصات یک نظام مراقبت مطلوب نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 داشتن قابلیت اجراء

گزینه 2 تداوم مراقبت

گزینه 3 ساده بودن

گزینه 4 جمع‌آوری داده‌های گسترده و فراوان

نمایش پاسخ

د

سوال 10

کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش‌دهی کتبی در کشورمان است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 سرخک

گزینه 2 فلج اطفال

گزینه 3 وبا

گزینه 4 مالاریا

نمایش پاسخ

ب

سوال 11

همه‌ی گزینه‌های زیر مواردی از نظام مراقبت سندرومیک است، به استثنای: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 گزارش موارد دچار علائم شبه آنفولانزا

گزینه 2 گزارش موارد فلج شل حاد

گزینه 3 گزارش موارد مرگ مادر

گزینه 4 گزارش عوارض دارویی به سازمان غذا و دارو

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش‌دهی فوری (تلفنی) است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 حیوان گزیدگی

گزینه 2 کزار بالغین

گزینه 3 هپاتیت ویروسی

گزینه 4 تب مالت

نمایش پاسخ

الف

سوال 13

براساس نظام مراقبت بیماری‌های واگیر در کشور، کدامیک از بیماری‌های زیر مشمول گزارش‌دهی فوری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 عوارض متعاقب ایمن‌سازی

گزینه 2 ایدز و عفونت HIV

گزینه 3 هپاتیت ویروسی

گزینه 4 سل

نمایش پاسخ

الف

سوال 14

در بحث «پدافند غیر عامل» کدامیک از بیماری‌های زیر نقطه‌ی هدف است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 ایدز

گزینه 2 بروسلوز

گزینه 3 بیماری قلبی

گزینه 4 بیماری ریوی

نمایش پاسخ

ب

سوال 15

تمام بیماری‌های زیر مشمول گزارش‌دهی فوری (تلفنی) هستند، بجز: (دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 وبا

گزینه 2 سرخک

گزینه 3 تب‌های خون‌ریزی دهنده ویروسی CHF

گزینه 4 ایدز و عفونت HIV

نمایش پاسخ

د.

سوال 16

کدام یک از شاخص‌های زیر به منظور سنجش سیاست بهداشتی یک کشور بکار می‌رود؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

گزینه 2 درآمد سرانه

گزینه 3 تخصیص منابع کافی به بهداشت

گزینه 4 میزان در دسترس بودن خدمات بهداشتی

نمایش پاسخ

ج / تخصیص منابع کافی به بهداشت، به منظور سنجش سیاست بهداشتی یک کشور بکار می‌رود.

بررسی و کنترل همه‌گیری‌ها

تعدادسوال: ۸۲

درجه سختی: متوسط

نکات:۱-اپیدمی:بروز غیر معمول یک بیماری رویداد رفتار ویژه مرتبط با سلامت و بهداشت که بیش از پیش بینی ما باشد۲-اندمیک:حضور حداقل سه سال متوالی یک بیماری یا عامل عفونی در یک محدوده ی جغرافیایی ۳-اولین قدم در برسی اپیدمی تایید تشخیص بیماریست۴-در همه گیری پیشرونده که انفلاتزا نمونه ای از آن است موج ثانویه داریم۵-همه گیری تک منبعی لحظه ای:ناگهان بروز میابد و موج ثانویه ندارد و به اندازه یک دوره کمون طول میکشد۶- اگر اپیدمی تک منبع باشد ولی مداوم باشد ودارای موج ثانویه باشد به ان تک منبعی مداوم گویند .

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی متفاوت است.

خودآزمایی

سوال 1

تمام جملات زیر در مورد اپیدمی صحیح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 شامل تمام بیماری‌های کوتاه‌گذر و بلندمدت است.

گزینه 2 وقوع بیش از حد انتظار یک بیماری

گزینه 3 فقدان یک عدد جهانی برای تعیین اپیدمی

گزینه 4 بروز همیشگی و دائمی یک بیماری

نمایش پاسخ

د

سوال 2

کدامیک از خصوصیات همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای (Point Source) است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 منحنی همه‌گیری دارای امواج ثانویه نیز هست.

گزینه 2 محدود به یک محل و منبع نیست.

گزینه 3 شروع تدریجی دارد و موارد به طور غیر همزمان بروز می‌کند.

گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری است.

نمایش پاسخ

سوال 3

همه‌گیری در اثر واکسن آلوده‌ای که در سطح یک کشور توزیع شده است. کدامیک از انواع همه‌گیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان/پزشکی شهریور ۹۷_ قطب تهران)

گزینه 1 تک منبعی با منبع مداوم

گزینه 2 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 3 آرام

گزینه 4 پیشرونده

نمایش پاسخ

الف

سوال 4

پس از صرف غذا در یک مهمانی بعد از گذشت ۳۶ ساعت ۳۰ درصد افراد دچار یک مسمومیت غذایی حاد شده‌اند. نوع همه‌گیری چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 2 تک منبعی مداوم

گزینه 3 پیشرونده

گزینه 4 آرام

نمایش پاسخ

الف

سوال 5

کدامیک از ویژگی‌های زیر مربوط به اپیدمی‌های تک منبعی مداوم نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 شروع تدریجی

گزینه 2 بروز موارد به صورت غیر همزمان

گزینه 3 محدود بودن به یک محل

گزینه 4 تداوم بیش از یک دوره‌ی کمون

نمایش پاسخ

ج

سوال 6

کدام مورد از ویژگی‌های همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 بروز ناگهانی دارد.

گزینه 2 موارد بیماری به طور همزمان بروز می‌کنند.

گزینه 3 منحنی همه‌گیری امواج ثانوی دارد.

گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری مربوطه است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 7

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های یک همه‌گیری با منبع و وسیله‌ی انتقال مشترک است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 همه‌گیری به صورت انفجاری شروع می‌شود.

گزینه 2 منحنی همه‌گیری دارای چند نقطه‌ی اوج (Peak) است

گزینه 3 موارد ثانویه‌ی زیادی انجام می‌شود.

گزینه 4 روند همه‌گیری آرام و کند است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 8

همه‌گیری کدامیک از بیماری‌های زیر از نوع تک منبعی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 مسمومیت غذایی

گزینه 2 سرخک

گزینه 3 آنفولانزا

گزینه 4 آبله‌مرغان

نمایش پاسخ

سوال 9

همه‌گیری کلیه بیماری‌های زیر از نوع پیشرونده است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 هیاتیت A

گزینه 2 مسمومیت غذایی

گزینه 3 سرخک

گزینه 4 آنفولانزا

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

به دنبال آلودگی منبع آب یک انبار در یکی از مناطق روستایی خراسان جنوبی، همه‌گیری از اسهال خونی شیگلایی به مدت دو ماه ایجاد می‌گردد. پس از بررسی این همه‌گیری توسط مسوولین بهداشتی این همه‌گیری کنترل می‌شود. کدامیک از گزینه‌های زیر الگوی وقوع این همه‌گیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 2 تک منبعی مداوم

گزینه 3 پیشرونده

گزینه 4 آرام

نمایش پاسخ

ب

سوال 11

کدامیک از موارد زیر، الگوی همه‌گیری آنفولانزا را مشخص می‌نماید؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان/پزشکی اسفند ۹۵_ قطب اهواز/ پزشکی اسفند۹۷_ قطب زنجان)

گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 2 تک منبعی مداوم

گزینه 3 آرام (نوبین)

گزینه 4 پیشرونده

نمایش پاسخ

د

سوال 12

در یک سربازخانه همه‌گیری عفونت کمپیلوباکتر با منشأ شیر آلوده ایجاد شده است. به نظر شما همه‌گیری از چه نوعی می‌تواند باشد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 تک منبعی

گزینه 2 چند منبعی

گزینه 3 پیشرونده

گزینه 4 آرام یا نوبین

نمایش پاسخ

الف

سوال 13

همه‌گیری ناشی از آنفولانزای پرندگان در یک منطقه‌ی جغرافیایی خاص از کدامیک از الگوهای اپیدمیولوژیک زیر تبعیت می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 تک منبعی

گزینه 2 پیشرونده

گزینه 3 آرام

گزینه 4 نوبین

نمایش پاسخ

ب

سوال 14

براساس گزارش مرکز بهداشت یک همه‌گیری بیماری سرخک رخ داده است. اولین اقدام شما چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 تعیین تعداد بیماران

گزینه 2 تعیین جمعیت در معرض خطر

گزینه 3 تأیید تشخیص بیماری

گزینه 4 تأیید وجود همه‌گیری

در بررسی یک همه‌گیری، اولین اقدام کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 تعیین توزیع موارد بیماری برحسب زمان و مکان

گزینه 2 مشخص نمودن وجود یا عدم وجود همه‌گیری

گزینه 3 تعیین وسیله‌ی انتشار عامل عفونت

گزینه 4 توصیه به اقدامات کنترلی

در بررسی یک همه‌گیری چهار اقدام اساسی زیر باید به ترتیب انجام شود، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 تأیید تشخیص- تنظیم فرضیه- تأیید همه‌گیری- یافتن موارد گزارش نشده

گزینه 2 تأیید تشخیص- یافتن موارد گزارش نشده- تأیید همه‌گیری- تنظیم فرضیه

گزینه 3 تأیید تشخیص- تأیید همه‌گیری- تنظیم فرضیه- یافتن موارد گزارش نشده

گزینه 4 تأیید تشخیص- یافتن موارد گزارش نشده- تنظیم فرضیه- تأیید همه‌گیری

کدام نوع ویروس هپاتیت معمولاً به تنهایی ایجاد حالت فولمینانت (سیر برق‌آسا) نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 B

گزینه 2 E

گزینه 3 C

گزینه 4 D

ج. برو به سبب سبز میکروب‌شناسی

کارشناس بیماری‌های یک منطقه گزارشی از یک پزشک علاقه‌مند به امور بهداشتی دریافت نموده که در آن بر مشاهده‌ی ۱۱ مورد بیماری سرخک در طول یک هفته تأکید شده بود، اگر در طول ۵ سال قبل در آن منطقه سرخک گزارش نشده باشد نخستین اقدام لازم کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 تنظیم فرضیه براساس زنجیره‌ی عفونت

گزینه 2 اقدام جهت تأیید تشخیص بیماری

گزینه 3 توصیف همه‌گیری در رابطه با زمان، مکان و شخص

گزینه 4 اقدام فوری برای واکسیناسیون علیه سرخک

چه موقع همه‌گیری را خاتمه یافته تلقی می‌کنیم؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۵ _ مشترک کشوری)

گزینه 1 وقتی شیوع بیماری صفر شود.

گزینه 2 وقتی تمامی ناقلین بیماری درمان شوند.

گزینه 3 وقتی دو دوره‌ی کمون از بیماری بگذرد و مورد دیگری اتفاق نیفتد.

گزینه 4 وقتی شیوع بیماری به حالت آندمیک اولیه برگردد.

کدامیک از خصوصیات یک همه‌گیری پیشرونده (propagated)، نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۶ _ هشت قطب مشترک)

گزینه 1 انتقال از شخص به شخص صورت می‌گیرد.

گزینه 2 انتقال از یک ناقل بندپا به شخص صورت می‌گیرد.

گزینه 3 منحنی این اپیدمی یک موج داشته و امواج ثانویه ندارد.

گزینه 4 دوره‌ی این اپیدمی، طولانی‌تر از دیگر اپیدمی‌هاست.

سوال 21

در اپیدمیولوژی پیشرونده معمولاً دوره‌ی اپیدمی؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 چند برابر دوره‌ی کمون است

گزینه 2 مساوی با دوره‌ی کمون است

گزینه 3 کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون است

گزینه 4 ممکن است طولانی‌تر یا کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون باشد

نمایش پاسخ

الف

سوال 22

کدامیک، بیماری بازپدید محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶_ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 سل

گزینه 2 سارس

گزینه 3 ایدز

گزینه 4 سرخک

نمایش پاسخ

الف

سوال 23

کدام عبارت در مورد کنترل و خاتمه‌ی یک همه‌گیری درست است؟ (پزشکی شهریور ۹۶– قطب آزاد)

گزینه 1 وقتی که دو دوره‌ی کمون از بیماری بگذرد و مورد دیگری اتفاق نیافتد.

گزینه 2 وقتی که زنجیره‌ی انتقال قطع شود.

گزینه 3 زمانی که همه‌ی موارد بیماری درمان شوند.

گزینه 4 زمانی که حفاظت فردی، جداسازی واکسیناسیون انجام شود.

نمایش پاسخ

الف

سوال 24

در اپیدمی تک منبعی مداوم، معمولاً دوره‌ی اپیدمی..... (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 چند برابر دوره‌ی کمون است

گزینه 2 کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون است

گزینه 3 مساوی با دوره‌ی کمون است

گزینه 4 ممکن است طولانی‌تر و یا کوتاه‌تر از دوره‌ی کمون باشد

نمایش پاسخ

الف

سوال 25

اولین اقدام در بررسی یک اپیدمی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 تأیید وجود یک اپیدمی

گزینه 2 تأیید تشخیص بیماری

گزینه 3 تعیین جمعیت در معرض اپیدمی

گزینه 4 جستجوی سریع تمام موارد ابتلا

نمایش پاسخ

ب

سوال 26

کدامیک از خصوصیات زیر در بیماری‌های تمام بومی (holoendemic disease) دیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز، همدان و زنجان)

گزینه 1 در بالغین شیوع بالایی دارد

گزینه 2 شیوع آن در بالغین بیش‌تر از کودکان است

گزینه 3 شیوع آن در تمام سنین مساوی است

گزینه 4 در کودکان شیوع بالایی دارد

نمایش پاسخ

د

سوال 27

وقوع بیش از حد قابل انتظار بیماری اگر در حدی باشد که این تجاوز از توزیع معمولی، از نظر آماری معنادار نیاشد چه نامیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 همه‌گیری (Epidemic)

گزینه 2 طغیان (Outbreak)

گزینه 3 انحراف (Aberration)

گزینه 4 Cluster

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

در منطقه‌ی صفی آباد میزان بزرگی طحال در کودکان ۲ تا ۹ ساله بیش‌تر از ۵۰ درصد و در بالغین بیش‌تر از ۲۵ درصد است. بیماری مالاریا در این منطقه چه وضعیتی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 فرابومی

گزینه 2 فروبومی

گزینه 3 نیمه‌بومی

گزینه 4 تمام‌بومی

نمایش پاسخ

د

سوال 29

طغیان یا Outbreak با کدامیک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 توضیح دهنده‌ی Sporadic بودن یک بیماری است.

گزینه 2 توضیح دهنده‌ی آندمیک بودن بیماری است

گزینه 3 توضیح دهنده‌ی پاندمیک بودن یک بیماری است.

گزینه 4 مترادف با اپیدمی یا همه‌گیری بیماری است.

نمایش پاسخ

د

سوال 30

اگر در کشور سوئیس یک مورد بیماری وبا که در حالت عادی وجود ندارد، رؤیت شود وقوع این بیماری در این کشور از نظر اپیدمیولوژیکی را اصطلاحاً چه می‌گویند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 اسپورادیک

گزینه 2 پاندمیک

گزینه 3 اپیدمیک

گزینه 4 آندمیک

نمایش پاسخ

ج

سوال 31

با توجه به این که در سال‌های اخیر هیچ موردی از بیماری آبله در ایران گزارش نشده است، در صورت وقوع یک مورد آبله کدام گزینه از نظر اپیدمیولوژیک صدق می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 بیماری تک‌گیر (اسپورادیک)

گزینه 2 بیماری همه‌گیر (اپیدمیک)

گزینه 3 بیماری بومی (اندمیک)

گزینه 4 بیماری جهانی (پاندمیک)

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

کدامیک از تعاریف زیر مربوط به حالت بومی (آندمیک) یک بیماری است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۵ _ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 وجود موارد تک‌گیر بیماری در یک جامعه

گزینه 2 وجود بیش از حد انتظار بیماری در یک جامعه

گزینه 3 گسترش بیماری بین تعداد زیادی از کشورها

گزینه 4 وجود دائمی بیماری در یک منطقه‌ی مشخص جغرافیایی

نمایش پاسخ

سوال 33

با توجه به اینکه تاکنون هیچ مورد از بیماری تب زرد در ایران مشاهده نشده است، در صورت مشاهده‌ی اولین مورد بیماری چه واژه‌ای را باید به آن اطلاق کرد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 اسپورادیک

گزینه 2 اندمیک

گزینه 3 پاندمیک

گزینه 4 اپیدمیک

نمایش پاسخ

سوال 34

پاندمیک عبارت است از این که بیماری: (پزشکی اسفند ۹۳- مشترک کشوری)

گزینه 1 به شکل مشهود بیش از حد انتظار شایع باشد.

گزینه 2 به طور همزمان تعداد زیادی از کشورها را باید در برگیرد.

گزینه 3 در حد مورد انتظار و عادی در بین مردم شایع باشد.

گزینه 4 انتشار فصلی در بین انسان‌ها و حیوانات داشته باشد.

نمایش پاسخ

سوال 35

زمانی که بیماری سابقه‌ی حضور در یک جامعه نداشته، اگر بیماری در جامعه بروز کند چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 آندمیک

گزینه 2 اپیزوتیک

گزینه 3 اسپورادیک

گزینه 4 اگزوتیک

نمایش پاسخ

سوال 36

وقوع غیر منظم، تصادفی و نادر در زمان‌هایی مختلف نظیر موارد بعضی از بیماری‌های عفونی، تعریف کدامیک از اصطلاحات زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸_ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 تک‌گیر

گزینه 2 همه‌گیر

گزینه 3 طغیان

گزینه 4 بومی

نمایش پاسخ

سوال 37

کدامیک از تعاریف زیر در ارتباط با شیوع بیماری در یک جامعه صحیح نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 حضور دائمی (حداقل برای مدت ۳ سال متوالی) یک بیماری یا عامل عفونی در یک محدوده‌ی جغرافیایی، جمعیت معین بیماری بومی است.

گزینه 2 بیماری تمام بومی بیماری است که در بالغین بیش از کودکان مشاهده می‌شود.

گزینه 3 بیماری فرابومی تمام سنین را به نحو مساوی مبتلا می‌نماید.

گزینه 4 بیماری بومی برای بیان شیوع عادی یک بیماری خاص در جمعیت بکار می‌رود.

نمایش پاسخ

سوال 38

آندمیک یعنی: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۴ _ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 شیوع بیماری بیش از حد انتظار

گزینه 2 شیوع همزمان بیماری در تمام استان‌ها

گزینه 3 شیوع بیماری در حد انتظار

گزینه 4 انتشار بیماری در تمام فصول

نمایش پاسخ

سوال 39

حضور دائمی یک بیماری با عامل عفونی در یک محدوده‌ی جغرافیایی یا گروه جمعیتی را می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران/پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸ _قطب تهران/ پزشکی اسفند ۹۵ _قطب اهواز/ دندان پزشکی اسفند ۹۵ _قطب شمال/ پزشکی اسفند ۹۳ _قطب تهران/ پزشکی ۹۴ _قطب تهران/ پزشکی اسفند ۹۶ _قطب تبریز/ پزشکی شهریور ۹۷ _قطب مشهد)

گزینه 1 بیماری بومی

گزینه 2 بیماری همه‌گیر

گزینه 3 بیماری عفونی

گزینه 4 بیماری تک‌گیر

نمایش پاسخ

الف

سوال 40

هرگاه بیماری به طور دائم و با بروز و شیوع بالا در یک منطقه رخ داده و تمام سنین را به صورت یکسان مبتلا نماید واژه‌ی مناسب آن کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز/پزشکی شهریور ۹۷ _قطب شیراز / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ _قطب زنجان)

گزینه 1 هولوآندمیک

گزینه 2 هیپرآندمیک

گزینه 3 آندمیک

گزینه 4 اپیدمیک

نمایش پاسخ

ب

سوال 41

طبق گزارش وزارت بهداشت، در بخشی از شهرستان قم، (شامل ده هزار نفر جمعیت) پنج مورد جدید و با در سال ۱۳۹۱ به طور غیر منتظره اتفاق افتاده که از آن‌ها یک نفر نیز به علت عوارض ناشی از بیماری فوت کرده است. وضعیت این بیماری در شهرستان قم در سال ۱۳۹۱ کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 پاندمیک

گزینه 2 اسپورادیک

گزینه 3 اپیدمیک

گزینه 4 اندمیک

نمایش پاسخ

ج

سوال 42

در ارتباط با اپیدمی تک منبعی مداوم (Common source-continuous) کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 شروع تدریجی دارد و موارد به طور غیر همزمان بروز می‌کند.

گزینه 2 محدود به یک محل است.

گزینه 3 منحنی همه‌گیری یک موج داشته و امواج ثانوی ندارد.

گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 43

کدام گزینه مترادف با واژه‌ی طغیان (out break) است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 تک‌گیری‌های گسترده

گزینه 2 تک‌گیری‌های محدود

گزینه 3 همه‌گیری‌های گسترده

گزینه 4 همه‌گیری‌های محدود

نمایش پاسخ

د

سوال 44

«وقوع موارد یک بیماری، یک رفتار خاص بهداشتی یا وقایع دیگر بهداشتی در یک منطقه یا جامعه به نحوی که به صورت واضح از انتظار عادی بیش‌تر باشد» چه نام دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 عالم‌گیر

گزینه 2 همه‌گیر

گزینه 3 تک‌گیر

گزینه 4 فرابومی

نمایش پاسخ

ب

سوال 45

در مقایسه‌ی دو بیماری هپاتیت A و هپاتیت B کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 معمولاً انسان تنها مخزن عفونت هر دو بیماری است.

گزینه 2 نسبتی از موارد ابتلا هر دو بیماری بدون نشانه‌ی بالینی است.

گزینه 3 هر دو بیماری در سطح جهان قابل پیشگیری با واکسن هستند.

گزینه 4 هر دو بیماری دارای حاملین مزمن هستند.

نمایش پاسخ

د. برو به سیب سبز میکروب‌شناسی

سوال 46

تمام گزینه‌های زیر درباره‌ی موارد بدون علائم بالینی بیماری‌ها (Sub-clinical disease) صحیح است، بجز: (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 این موارد در افزایش ایمنی گروهی (Herd immunity) در جامعه نقش دارد.

گزینه 2 به ایجاد ایمنی اکتسابی در گروهی از افراد منجر می‌شود.

گزینه 3 تشخیص موارد، تنها با آزمایش‌های پاراکلینیکی امکان‌پذیر است.

گزینه 4 عامل بیماری از این موارد به دیگران منتقل نمی‌شود.

نمایش پاسخ

د

سوال 47

بیماری ۶ ساعت پس از خوردن همبرگر در یکی از رستوران‌های خارج از شهر دچار دل درد، استفراغ و متعاقب آن اسهال شده است. موارد مشابه دیگری از همان محل و مصرف همان غذا گزارش شده است. کدامیک از عوامل زیر می‌تواند در ایجاد بیماری نقش داشته باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 وبا

گزینه 2 شیگلوزیس

گزینه 3 کلستریدیوم بوتولینیوم

گزینه 4 استافیلوکوک اورئوس

نمایش پاسخ

د. برو به سیب سبز میکروب‌شناسی

سوال 48

در کدام حالت زیر بیماری اسپورادیک است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 بیماری به صورت پراکنده در منطقه وجود داشته باشد.

گزینه 2 در یک دوره‌ی زمانی مشخص، بیش‌تر افراد یک منطقه مبتلا باشند.

گزینه 3 در یک دوره‌ی زمانی مشخص، تعداد مبتلایان افزایش یابد.

گزینه 4 بیماری در منطقه همیشه حضور داشته باشد

نمایش پاسخ

الف

سوال 49

تمام موارد زیر درباره‌ی همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای صحیح است، بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری مربوطه است.

گزینه 2 منحنی موارد بیماری سریعاً افزایش و به تدریج و کندی کاهش می‌یابد.

گزینه 3 بروز ناگهانی و همزمان تمام موارد.

گزینه 4 منحنی این نوع از همه‌گیری امواج ثانویه ندارد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 50

در سال گذشته، چند مورد محدود از بیماری آنفولانزای پرندگان در زمان‌های مختلف در سطح کشور گزارش شده است.

کدام اصطلاح در وقوع این بیماری مصداق دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 Epidemic

گزینه 2 Pandemic

گزینه 3 Endemic

گزینه 4 Sporadic

نمایش پاسخ

د

سوال 51

همه‌ی موارد زیر در بررسی یک طغیان یا اپیدمی در زمره‌ی متغیرهای مهم (critical) منظور می‌شوند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 زمان مواجهه

گزینه 2 شروع بیماری

گزینه 3 دوره‌ی کمون

گزینه 4 تعداد جمعیت در معرض خطر

نمایش پاسخ

د

سوال 52

«توزیع یک واکسن آلوده در سطح کشور» منجر به رخداد یک همه‌گیری شده است. نوع همه‌گیری کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان/ پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 پیشرونده

گزینه 2 منبع مشترک لحظه‌ای

گزینه 3 منبع مشترک مداوم

گزینه 4 آرام

نمایش پاسخ

ج

سوال 53

همه‌گیری ناشی از توزیع واکسن آلوده در سطح کشور جزء کدامیک از انواع همه‌گیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 پیشرونده

گزینه 2 تک منبع مداوم

گزینه 3 تک منبع لحظه‌ای

گزینه 4 آرام (نوین)

نمایش پاسخ

ب

سوال 54

به دنبال توزیع شیر آلوده در یک مدرسه‌ی شبانه‌روزی، تعداد زیادی از دانش‌آموزان دچار اسهال شدند. الگوی این همه‌گیری چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 آرام

گزینه 2 پیشرونده

گزینه 3 تک منبعی مداوم

گزینه 4 تک منبعی لحظه‌ای

نمایش پاسخ

د

سوال 55

چنانچه میانگین بروز سالانه‌ی سرطان مری در جهان ۴ در ۱۰۰۰۰۰ و میانگین بروز سالانه سرطان مری در ایران طی ۱۰ سال اخیر ۸ در ۱۰۰۰۰۰ (دو برابر میانگین جهانی) باشد، چنانچه در سال ۱۳۹۶ بروز این سرطان در کشور ۷/۹ در ۱۰۰۰۰۰ باشد، به آن..... گفته می‌شود. (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 طغیان

گزینه 2 پاندمی

گزینه 3 آندمی

گزینه 4 اپیدمی

نمایش پاسخ

ج

سوال 56

در بررسی یک اپیدمی متوجه می‌شوید که بیماری در محل‌های مختلف و به صورت غیر همزمان بروز یافته، منحنی اپیدمی دارای امواج ثانویه است و طول مدت همه‌گیری بیش‌تر از یک دوره‌ی کمون بیماری است. این ویژگی با کدام الگوی همه‌گیری مطابقت دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 تک منبعی مداوم

گزینه 2 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 3 پیشرونده

گزینه 4 آرام و نوین

نمایش پاسخ

الف

سوال 57

در منطقه‌ی جغرافیایی شرق استان زنجان سال‌هاست که بیماری فلج اطفال صفر گزارش شده است. امسال یک مورد از این بیماری در این منطقه گزارش شده است. تعریف شما از وضعیت فعلی بیماری کدام گزینه است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 آندمی

گزینه 2 پاندمی

گزینه 3 اپیدمی

گزینه 4 اسپورادیک (تک‌گیر)

نمایش پاسخ

ج

سوال 58

در یک منطقه بیماری A اپیدمی شده است، چنانچه دوره‌ی کمون بیماری ۶ روز باشد، پس از گذشت چند روز از عدم گزارش مورد جدید اپیدمی پایان یافته تلقی می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 ۳

گزینه 2 ۶

گزینه 3 ۹

گزینه 4 ۱۲

نمایش پاسخ

د

سوال 59

تعداد موارد اسهال خونی در یک روستای دو هزار نفری در خرداد ماه سال گذشته، ۵۱ نفر و در خرداد ماه امسال ۲۱۱ نفر است. در صورت ثابت بودن جمعیت و عدم تغییر در روش‌های تشخیصی و سیستم ثبت بیماری، وضعیت بیماری در این روستا چگونه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 آندمیک

گزینه 2 پاندمیک

گزینه 3 اپیدمیک

گزینه 4 اسپورادیک

نمایش پاسخ

ج. اپیدمی به معنای بروز غیر معمول یک بیماری یا یک رویداد است که بیش‌تر از میزان پیش‌بینی ما باشد.

سوال 60

همه‌گیری ناشی از آلودگی چاه آب یک روستا که ساکنین آب شرب خود را از آن تأمین می‌کنند، کدامیک از الگوهای مختلف همه‌گیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 2 پیشرونده

گزینه 3 آرام

گزینه 4 تک منبعی مداوم

نمایش پاسخ

د. اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم پیک بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد. مثل توزیع یک واکسن آلوده در کشور.

سوال 61

پس از یک جشن عروسی موارد ابتلا به هپاتیت A در بین شرکت کنندگان در جشن دیده می‌شود که پس از بررسی اپیدمی مشخص گردید که منبع آلودگی یک نوع نوشابه بوده است. نوع همه‌گیری مورد نظر چه بوده است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 2 تک منبعی مداوم

گزینه 3 پیشرونده

گزینه 4 آرام یا نوین

نمایش پاسخ

الف. اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم پیک بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد. اما اگر به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون باشد لحظه‌ای است. مثل اسهال ناشی از یک ساندویچ آلوده.

سوال 62

چه موقع همه‌گیری را خاتمه یافته تلقی می‌کنیم؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز/پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 بعد از یک دوره‌ی کمون

گزینه 2 بعد از دو دوره‌ی کمون

گزینه 3 بعد از سه دوره‌ی کمون

گزینه 4 بعد از درمان آخرین بیمار

نمایش پاسخ

ب. بعد از گذشتن دو دوره‌ی کمون از بیماری و نبودن یافته‌ای از آن همه‌گیری را خاتمه یافته تلقی می‌کنیم.

سوال 63

در صورت طغیان بیماری وبا در یکی از شهرهای جنوب کشور، اگر دوره‌ی کمون بیماری را به طور متوسط ۳ روز در نظر بگیریم، در چه صورت اعلام اتمام اپیدمی بیماری، مجاز خواهد بود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 ۶ روز از بروز مورد ثانویه بیماری بگذرد و مورد جدیدی مشاهده نشود.

گزینه 2 ۶ روز از بروز مورد اولیه بیماری بگذرد و مورد جدیدی مشاهده نشود.

گزینه 3 ۶ روز از بروز آخرین مورد بیماری بگذرد و مورد جدیدی مشاهده نشود.

گزینه 4 ۹ روز از بروز آخرین مورد بیماری بگذرد و مورد جدیدی مشاهده نشود.

نمایش پاسخ

ج. بعد از گذشتن دو دوره‌ی کمون از بیماری و نبودن یافته‌ای از آن همه‌گیری را خاتمه یافته تلقی می‌کنیم.

سوال 64

کدامیک از موارد زیر درباره‌ی نمودار منحنی همه‌گیری با منبع مشترك که تنها یک بار با عامل عفونت برخورد شده است صحیح نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- مشترك کشوری)

گزینه 1 محور افقی مدت زمان بعد از مواجهه را نشان می‌دهد.

گزینه 2 منحنی نشان دهنده‌ی توزیع دوره‌ی کمون است.

گزینه 3 محور عمودی نشان دهنده‌ی تعداد موارد بیماری است.

گزینه 4 منحنی نشان دهنده‌ی انتشار شخص به شخص است.

نمایش پاسخ

د / اگر اپیدمی به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون باشد لحظه‌ای است و منحنی نشان دهنده‌ی توزیع دوره‌ی کمون است.

سوال 65

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های همه‌گیری تک منبعی لحظه‌ای (Point source) نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 از یک منبع و محل شروع می‌شود.

گزینه 2 بروز ناگهانی دارد و موارد بیماری به طور همزمان بروز می‌کند.

گزینه 3 منحنی همه‌گیری یک موج داشته و امواج ثانوی ندارد.

گزینه 4 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون بیماری نیست.

نمایش پاسخ

د / اگر اپیدمی به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون باشد لحظه‌ای است و منحنی نشان دهنده‌ی توزیع دوره‌ی کمون است.

سوال 66

در بررسی گام به گام یک همه‌گیری، در مرحله‌ی تأیید تشخیص بیماری، در صورت وجود علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک غیر اختصاصی فرد مورد ارزیابی به عنوان کدام مورد زیر طبقه‌بندی می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 مورد شاخص

گزینه 2 مورد محتمل

گزینه 3 مورد مظنون

گزینه 4 مورد قطعی

نمایش پاسخ

ب / مورد محتمل علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک غیر اختصاصی دارد اما مورد قطعی علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک اختصاصی دارد.

سوال 67

در مورد ویژگی‌های همه‌گیری‌های تک منبعی مداوم کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 همه‌ی موارد به صورت همزمان بروز می‌کنند.

گزینه 2 منحنی اپیدمی امواج ثانویه ندارد.

گزینه 3 محدود به یک محل نیست.

گزینه 4 مدت آن معادل یک دوره‌ی کمون است.

نمایش پاسخ

ج / اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم پیک بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد و محدود به یک محل نیست. مثل توزیع یک واکسن آلوده در کشور.

سوال 68

همه‌گیری بیماری سرخک در یک منطقه رخ داده است. الگوی آن کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 Propagated

گزینه 2 Persistent common source

گزینه 3 common source

گزینه 4 Slow or modem

نمایش پاسخ

الف / اپیدمی پیشرونده بیش از همه طول می‌کشد و افراد مریض به صورت شاخه‌ای دیگران را مبتلا می‌کنند مثل بیماری‌های عفونی.

سوال 69

چشمه‌ی تأمین کننده‌ی آب شرب یک منطقه‌ی روستایی با لاشه‌ی یک حیوان آلوده شده است. الگوی همه‌گیری بیماری گاستروآنتریت خونی متعاقب آن در منطقه‌ی مذکور کدامیک از انواع الگوهای ذیل است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 2 تک منبعی مداوم

گزینه 3 پیشرونده

گزینه 4 آرام

نمایش پاسخ

ب / اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم پیک بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد و محدود به یک محل نیست. مثل توزیع یک واکسن آلوده در کشور.

سوال 70

کدامیک از موارد زیر در مورد همه‌گیری‌های تک منبعی مداوم (common source- continuous) درست است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 محدود به یک محل خاص است

گزینه 2 موارد بیماری به طور همزمان بروز می‌کند.

گزینه 3 طول مدت همه‌گیری به اندازه‌ی یک دوره‌ی کمون است.

گزینه 4 منحنی اپیدمی امواج ثانوی دارد.

نمایش پاسخ

د / اگر اپیدمی از یک منبع باشد ولی مداوم پیک بزند و فروکش کند و بیش از یک دوره‌ی کمون طول بکشد تک منبعی مداوم نام دارد و محدود به یک محل نیست. مثل توزیع یک واکسن آلوده در کشور.

سوال 71

در خصوص اپیدمی بیماری‌ها، همه‌ی گزینه‌های زیر صحیح است بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

گزینه 1 اپیدمی یعنی وقوع پیش از حد انتظار یک بیماری یا گروهی از بیماری‌های دارای طبیعت مشابه در یک ناحیه‌ی معین

گزینه 2 اپیدمی فقط به بیماری‌های عفونی اطلاق می‌شود.

گزینه 3 برای اتلاق اپیدمی یک عدد کلی و جهانی که بتوان آن را مبنا و پایه‌ی همه‌گیری قرار داد وجود ندارد.

گزینه 4 اپیدمی می‌تواند در هر فاصله‌ی زمانی رخ دهد.

نمایش پاسخ

ب / اپیدمی به همه‌ی بیماری‌ها می‌تواند اطلاق شود.

سوال 72

با استفاده از منحنی اپیدمی می‌توان درباره‌ی موارد زیر قضاوت کرد بی‌جز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 ارتباط زمانی بین مواجهه و منابع احتمالی

گزینه 2 الگوی فصلی یا دوره‌ای یک عفونت خاص

گزینه 3 وجود منبع مشترک و یا انتشار پیشرونده‌ی بیماری

گزینه 4 ارتباط مکانی بین مواجهه و منابع احتمالی

نمایش پاسخ

د / با استفاده از منحنی اپیدمی می‌توان درباره‌ی ارتباط زمانی بین مواجهه و منابع احتمالی و الگوی فصلی یا دوره‌ای یک عفونت خاص و وجود منبع مشترک و یا انتشار پیشرونده‌ی بیماری قضاوت کرد.

سوال 73



در منطقه‌ی A همه‌گیری آنفولانزا در فصل زمستان رخ داده و ۸ هفته طول کشیده است. طی آن ۶۰٪ افراد جامعه مبتلا شده‌اند. این همه‌گیری از کدام نوع است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 تک منبعی لحظه‌ای

گزینه 2 تک منبعی مداوم

گزینه 3 پیشرونده

گزینه 4 نوین

نمایش پاسخ

ج / اپیدمی پیشرونده بیش از همه طول می‌کشد و افراد مریض به صورت شاخه‌ای دیگران را مبتلا می‌کنند مثل بیماری‌های عفونی.

سوال 74

در سیستم مراقبت، عبارت زیر تعریف چه نوع موردی محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد)
«براساس تشخیص بالینی و آزمون‌های آزمایشگاهی غیر اختصاصی، انجام ولی تأیید نمی‌شود.»

گزینه 1 تعریف عامیانه (فرضی) Lay case

گزینه 2 تعریف مورد مشکوک (بالینی) Suspected case

گزینه 3 تعریف مورد محتمل Probable case

گزینه 4 تعریف قطعی Confirmed case

نمایش پاسخ

ج. مورد محتمل علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک غیر اختصاصی دارد اما مورد قطعی علائم بالینی و مثبت بودن یافته‌های پاراکلینیک اختصاصی دارد.

سوال 75

واژه معادل این تعریف کدام است؟ «هرگونه عارضه‌ی بد یا ناخواسته که به دنبال مداخله‌های درمانی، تشخیصی یا پیشگیری و در نتیجه عملکرد پزشک یا گروه پزشکی روی دهد» (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 sporadic disease

گزینه 2 opportunistic disease

گزینه 3 pandemic disease

گزینه 4 iatrogenic disease

نمایش پاسخ

د. یاتروژنیک یعنی پزشک‌زاد. عارضه‌ای که به دلیل مداخله‌های پزشکی ایجاد می‌شود.

سوال 76

در مورد وقوع بیماری‌ها در جمعیت‌ها، تعاریف زیر صحیح است، بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان)

گزینه 1 وقوع موارد یک بیماری در یک منطقه به نحوی که به صورت واضحی بیش‌تر از انتظار عادی باشد همه‌گیری (Epidemic) است

گزینه 2 وقوع بیماری‌های عفونی به صورت غیرمنظم، تصادفی و نادر در زمان‌های مختلف از مصادیق تک‌گیری (Sporadic) است.

گزینه 3 چنانچه یک بیماری حداقل برای سه سال متوالی در یک منطقه شیوع داشته باشد بیماری بومی (Endemic) منطقه محسوب می‌شود

گزینه 4 چنانچه یک بیماری عفونی در برخی از فصول سال شیوع بالایی در یک منطقه پیدا کند پاندمی (Pandemic) منطقه به حساب می‌آید.

نمایش پاسخ

د. همون‌طور که میدونی پاندمی یعنی جهان‌گیری. نه یه منطقه‌ی خاص

سوال 77

در صورتی که یک بیماری به طور دایم با میزان شیوع بالا وجود داشته باشد و تمام سنین را بنحو مساوی مبتلا نماید ان را چه می‌نامند؟ (پزشکی شهریور ۹۹- کشوری)

گزینه 1 بومی

گزینه 2 فرا بومی

گزینه 3 تمام بومی

گزینه 4 نیمه بومی

نمایش پاسخ

ب/ بیماری که در تمام سنین شیوع بالا دارد فرابومی گویند.

سوال 78

تمام موارد زیر در مورد همه‌گیری پیش‌رونده صحیح است، به‌جز: (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره)

گزینه 1 پیش‌روی آهسته موارد بیماری در دوره‌ای بیش از یک دوره کمون اتفاق می‌افتد.

گزینه 2 موج ثانویه رخ نمی‌دهد.

گزینه 3 انتقال فرد به فرد صورت می‌گیرد.

گزینه 4 انتشار وابسته به ایمنی جمعی است.

نمایش پاسخ

ب / در همه‌گیری پیش‌رونده موج ثانویه رخ می‌دهد.

تمام موارد زیر درباره‌ی همه‌گیری تک منبعی یا لحظه‌ای صحیح است، به‌جز: (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹ – میان‌دوره)

گزینه 1 منحنی موارد بیماری سریعاً افزایش و به کندي کاهش می‌یابد.

گزینه 2 منحنی این نوع از همه‌گیری، امواج ثانوی ندارد.

گزینه 3 بروز ناگهانی و هم‌زمان تمام موارد روی می‌دهد.

گزینه 4 طول مدت همه‌گیری، به اندازه‌ی یک دورهی کمون بیماری است.

نمایش پاسخ

الف / گزینه الف نادرست است. در همه‌گیری تک منبعی بروز ناگهانی و هم‌زمان تمام موارد روی می‌دهد و منحنی آن امواج ثانویه ندارد.

کدامیک از موارد زیر از مزایای استفاده از داده‌های پرونده‌ای بیمارستانی در بررسی‌های اپیدمیولوژیک است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 سهولت دسترسی به داده‌ها در پرونده‌های بیمارستانی

گزینه 2 مشخص بودن مخرج کسر برای محاسبه شاخص‌های اپیدمیولوژیک

گزینه 3 غیرانتخابی بودن بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها

گزینه 4 ثابت بودن روش‌های تشخیص آزمایشگاهی در بیمارستان‌های مختلف

نمایش پاسخ

الف / سهولت دسترسی به داده‌ها در پرونده‌های بیمارستانی از مزایای استفاده از داده‌های پرونده‌ای بیمارستانی در بررسی‌های اپیدمیولوژیک است.

در منطقه‌ای میزان بزرگی طحال در کودکان ۲ تا ۹ ساله بیشتر از ۵۰ درصد و در بالغین بیشتر از ۲۵ درصد است، بر اساس طبقه‌بندی مالاریای بومی (Endemic Malaria) توسط سازمان جهانی بهداشت، این منطقه در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 فرو بومی

گزینه 2 تمام بومی

گزینه 3 فرا بومی

گزینه 4 نیمه بومی

نمایش پاسخ

ج/ براساس طبقه بندی مالاریای بومی توسط سازمان جهانی بهداشت، درگیری بیش از ۵۰ درصد کودکان ۲تا ۹ سال و درگیری بیش از ۲۵درصد بالغین در محدوده طبقه "فرا بومی" قرار می‌گیرد.

کدامیک از گزینه‌های زیر، در مورد هدف برنامه کنترل سرخک در دنیا صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 کاهش موارد ابتلا به میزان ۱۰۰ درصد تا سال ۱۹۹۵

گزینه 2 کاهش موارد ابتلا به میزان ۱۰۰ درصد تا سال ۱۹۹۵

گزینه 3 افزایش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از ۵۰ درصد

گزینه 4 افزایش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از ۹۰ درصد

نمایش پاسخ

ب / کاهش مرگ ناشی از سرخک به میزان ۹۵ درصد تا سال ۱۹۹۵، هدف برنامه کنترل سرخک در دنیا بود.

تعاریف و اهداف اپیدمیولوژی

تعدادسوال: ۱۲

درجه سختی: آسان

نکات-۱-اپیدمیولوژی چگونگی توزیع و تعیین کننده های توزیع حالتها و رویداد های مربوط به سلامت در جمعیتی مشخص است.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

کدامیک از موارد زیر کم‌ترین ارتباط را با کاربرد و تعریف اپیدمیولوژی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 فهم علل ایجاد و ماندگاری بیماری‌ها در جامعه

گزینه 2 حل معضلات اجتماعی و فقر در جامعه و رفع عوامل ارتقاء خطر مرتبط

گزینه 3 تعیین گسترش و بار بیماری در جامعه

گزینه 4 کمک در تدوین سیاست‌های بهداشتی و مراقبت‌های فردی

نمایش پاسخ

سوال 2

از تعریف اپیدمیولوژی تحلیلی کدامیک از موارد زیر را می‌توان استنتاج نمود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

- گزینه 1 ویژگی‌های عامل بیماریزا، گروه‌ها و جمعیت‌های درگیر و عوامل مرتبط محیطی توصیف می‌شوند.
- گزینه 2 با استفاده از مدل‌های انسانی یا حیوانی مداخلات مختلف را می‌آزماید
- گزینه 3 ویژگی‌ها و اندازه‌های بیماری در جمعیت در طول زمان، پیگیری و بررسی می‌شوند
- گزینه 4 به علت رخدادها، علیت و سبب‌شناسی و تأثیر عوامل خطرزا می‌پردازد

نمایش پاسخ

سوال 3

همه‌ی گزینه‌های زیر به طور مستقیم بر اهداف اپیدمیولوژی دلالت دارند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- مشترک کشوری)

- گزینه 1 تعیین علت ایجاد یک بیماری و عوامل خطر آن
- گزینه 2 تهیه‌ی راه کارهایی برای تغییر مشکلات سلامتی جامعه
- گزینه 3 تعیین گسترش و بار بیماری در جامعه
- گزینه 4 ارزشیابی برنامه‌های پیشگیری و درمانی موجود

نمایش پاسخ

سوال 4

کدامیک از عبارات زیر مشمول تعریف اپیدمیولوژی می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد)

- گزینه 1 علم بررسی پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه است.
- گزینه 2 مطالعه در مورد عوامل مؤثر در بهبود اقتصاد جامعه است.
- گزینه 3 علم بررسی عوامل تأثیرگذار بر بروز بعضی از بیماری‌هاست.
- گزینه 4 مطالعه‌ی چگونگی توزیع و تعیین کننده‌های حالت‌ها و رویدادهای مربوط به سلامت در جامعه است.

نمایش پاسخ

سوال 5

کدام عبارت در مورد تعریف اپیدمیولوژی درست است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد/ پزشکی شهریور ۹۷_قطب دانشگاه آزاد/ پزشکی شهریور ۹۵_ قطب دانشگاه آزاد)

- گزینه 1 چگونگی توزیع و تعیین کننده‌های توزیع حالت‌ها و رویدادهای مربوط به سلامت در جمعیتی مشخص
- گزینه 2 تعیین عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر سلامت
- گزینه 3 بررسی همه‌گیری بیماری‌های واگیر در جمعیتی مشخص
- گزینه 4 تعیین علل بیماری‌ها جهت پیشگیری و کنترل آن‌ها

نمایش پاسخ

سوال 6

کدامیک از موارد زیر در مورد تعریف اپیدمیولوژی درست است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

- گزینه 1 علم بررسی توزیع و تعیین کننده‌های حالت‌ها و رویدادهای مربوط به سلامت در جمعیتی مشخص است.
- گزینه 2 علم بررسی شیوع و بروز بیماری‌هاست بدون ملاحظه‌ی عوامل تأثیرگذار.
- گزینه 3 علم بررسی چگونگی انتقال بیماری‌هاست.
- گزینه 4 علم بررسی چگونگی ارائه‌ی خدمات بهداشتی در جامعه است.

نمایش پاسخ

د. اپیدمیولوژی مطالعه‌ی چگونگی توزیع بیماری‌ها در جمعیت‌ها و عوامل مؤثر در این توزیع است.

سوال 7

همه‌ی گزینه‌های زیر جزء کاربردهای اپیدمیولوژی هستند، بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد)

- گزینه 1 مطالعه و تحقیق براساس اصول روش‌شناسی پژوهش و آمار
- گزینه 2 توصیف اندازه‌های سلامتی و بیماری در جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی و توزیع وقایع مربوط به سلامت در ارتباط با زمان، مکان و شخص
- گزینه 3 هدایت و راهنمایی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خدمات و مراقبت‌های بهداشتی
- گزینه 4 مشخص کردن عوامل خطرزایی که می‌تواند به کاهش موارد بیماری‌ها کمک کند.

نمایش پاسخ

د / کاربردهای اپیدمیولوژی: مطالعه و تحقیق براساس اصول روش‌شناسی پژوهش و آمار- هدایت و راهنمایی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خدمات و مراقبت‌های بهداشتی- توصیف اندازه‌های سلامتی و بیماری در جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی و توزیع وقایع مربوط به سلامت در ارتباط با زمان، مکان و شخص

عوامل خطرزا روش‌شناسی در میزان خطر عملکرد می‌کند!

جان استو محقق انگلیسی و عضو انجمن اپیدمیولوژی لندن با مجموعه‌ای از مطالعات کلاسیک وبا مشخص نمود که: (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی رودخانه‌ی تایمز است.

گزینه 2 اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی سبزیجات مورد مصرف در لندن است.

گزینه 3 اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی موادغذایی حیوانی است.

گزینه 4 اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی موادغذایی دریایی است.

نمایش پاسخ

الف / اپیدمی وبا در لندن ناشی از آلودگی رودخانه‌ی تایمز بوده است و این موضوع را جان استو مشخص نمود.

ارزیابی کدامیک از موارد زیر در حیطه‌ی اپیدمیولوژی تحلیلی قرار دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 الگوی زمانی بیماری‌ها

گزینه 2 ویژگی‌های فرد مبتلا

گزینه 3 عوامل خطر بیماری

گزینه 4 توزیع مکانی بیماری

نمایش پاسخ

ج / عوامل خطر بیماری مربوط به اپیدمیولوژی تحلیلی است.

روش دسترسی اساسی برای حل مشکلات در اپیدمیولوژی چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 مقایسه کردن و استنتاج

گزینه 2 توصیف و توزیع حجم مشکلات سلامتی

گزینه 3 شناسایی عوامل سبب‌شناسی بیماری‌ها

گزینه 4 تأمین داده‌های اساسی برای برنامه‌ریزی

نمایش پاسخ

الف / اپیدمیولوژی مطالعه‌ی چگونگی توزیع بیماری‌ها در جمعیت‌ها و عوامل مؤثر در این توزیع است و روش دسترسی اساسی برای حل مشکلات در اپیدمیولوژی مقایسه کردن و استنتاج است.

منظور از عوامل پیش‌آگهی دهنده در اپیدمیولوژی چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 فراوانی رویداد یک بیماری

گزینه 2 شناخت عوامل خطر

گزینه 3 کسب دلیل عینی از وجود یا عدم وجود یک حالت خاص

گزینه 4 ویژگی‌هایی که با احتمال بقاء رابطه دارند.

نمایش پاسخ

د / منظور از عوامل پیش‌آگهی دهنده در اپیدمیولوژی ویژگی‌هایی هستند که با احتمال بقاء رابطه دارند.

اپیدمیولوژی تمام موارد زیر را در بر می‌گیرد، به‌جز: (علوم پایه دندان‌پزشکی دی ۹۹-میان‌دوره)

گزینه 1 چگونگی توزیع فراوانی بیماری و سلامتی

گزینه 2 اقدام برای تغییر رفتار فردی و اجتماعی

گزینه 3 تعیین عوامل مؤثر در ایجاد سلامتی و بیماری

گزینه 4 کنترل بیماری‌ها و سلامتی در جامعه

نمایش پاسخ

ب- اپیدمیولوژی عبارت است از ۱. مشخص کردن علل بیماری ها و عوامل خطرزا ۲. مشخص کردن وضعیت بیماری در جامعه ۳. مطالعه تاریخچه بیماری ها ۴. ارزیابی روش ها و مراقبت های بهداشتی ۵. ایجاد روش ها و تصمیم گیری های مناسب برای کنترل عوامل خطرزا

میزان‌های ابتلا

تعداد: ۹۷ سوال

درجه سختی: متوسط

نکات: ۱-بروز=تعدادموارد جدید یک بیماری در مدت معین تقسیم بر متوسط جمعیت در معرض ان بیماری در همان زمان

۲-شیوع=تعدادموارد جدید و قدیم یک بیماری در یک مقطع زمانی تقسیم بر کل جمعیت در همان مقطع زمان

۳- شیوع دوره ای=تعداد موارد موجود در یک دوره ی مشخص زمان تقسیم بر تعداد افراد در معرض خطر در همان دوره

خودآزمایی

سوال 1

در صورت افزایش طول مدت یک بیماری، میزان شیوع آن بیماری چه تغییری می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 بستگی به میزان بروز دارد.

گزینه 2 افزایش می‌یابد.

گزینه 3 تغییر نمی‌کند.

گزینه 4 کاهش می‌یابد

نمایش پاسخ

ب

سوال 2

اگر در تهران ۱۰ میلیون نفری در طی سال گذشته ۲ هزار مورد جدید بیماری سل تشخیص داده شده باشد، میزان بروز این بیماری چند در ۱۰۰ هزار است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران/پزشکی شهریور ۹۳ _ قطب کرمان)

گزینه 1 ۲۰

گزینه 2 ۵

گزینه 3 ۱۰

گزینه 4 ۲۵

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

موارد جدید بیماری در یک جمعیت معین و در یک دوره‌ی زمانی خاص چه نام دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال / دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 شیوع

گزینه 2 بروز

گزینه 3 اپیدمی

گزینه 4 ابتلا

نمایش پاسخ

ب

سوال 4

در محاسبه‌ی میزان بروز، صورت کسر تعداد کدامیک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال/دندان پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب شمال اصفهان کرمان)

گزینه 1 موارد جدید بیماری

گزینه 2 موارد قدیم بیماری

گزینه 3 کل افراد مبتلا به بیماری

گزینه 4 افراد مواجهه یافته با خطر

نمایش پاسخ

الف

سوال 5

صورت کسر اندازه‌ی شیوع یک بیماری در یک منطقه‌ی معین در یک نقطه‌ی زمانی عبارت است از: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 تعداد کل جمعیت

گزینه 2 مجموع کل نفر سال‌ها

گزینه 3 تعداد موارد جدید بیماری

گزینه 4 تعداد کل بیماران موجود

نمایش پاسخ

د

سوال 6

فرمول محاسبه‌ی زیر مربوط به اندازه‌گیری کدامیک از شاخص‌های سلامتی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

۱۰× تعداد افراد جامعه که در یک فاصله زمانی معین بیمار می‌شوند
تعداد افراد آن جامعه در ابتدای بازه زمانی

گزینه 1 میزان بروز (incidence rate)

گزینه 2 میزان بروز تجمعی (Cumulative incidence)

گزینه 3 میزان شیوع (Prevalance rate)

گزینه 4 میزان مرگ خام (Crude death rate)

نمایش پاسخ

ب

سوال 7

کدامیک از گزینه‌های زیر می‌تواند موجب افزایش شیوع بیماری در یک منطقه گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 میزان کشندگی بالای بیماری

گزینه 2 بهبود امکانات تشخیصی

گزینه 3 کوتاه بودن دوره‌ی بیماری

گزینه 4 کاهش میزان بروز بیماری

نمایش پاسخ

ب

سوال 8

در جمعیت ۴۰۰ هزار نفری یک شهر که ۴۰ % آن‌ها زن هستند ۸ مورد جدید سرطان رحم در مدت یک سال دیده شده است. میزان بروز بیماری در این شهر چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 ۲ در ۱۰۰ هزار

گزینه 2 ۵ در ۱۰۰ هزار

گزینه 3 ۲ در ۱ میلیون

گزینه 4 ۸ در ۱ میلیون

نمایش پاسخ

ب

سوال 9

در یک شهر صد هزار نفری در ابتدای سال، ده هزار نفر مبتلا به فشار خون می‌باشند؛ در پایان سال، نه هزار نفر دیگر مبتلا به فشار خون می‌شوند، میزان بروز چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 ۰/۹ درصد

گزینه 2 ۱ درصد

گزینه 3 ۹ درصد

گزینه 4 ۱۰ درصد

نمایش پاسخ

د

سوال 10

۱۰۰۰۰ فرد ۴۰ تا ۵۰ ساله در طی ۱۰ سال مورد پیگیری قرار گرفتند، ۴۰ مورد سکته‌ی قلبی مشاهده گردید. میزان بروز سکته‌ی قلبی در این جمعیت در هر سال چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۴۰ در ۱۰۰۰۰

گزینه 2 ۲۰ در ۱۰۰۰۰

گزینه 3 ۴۰ در ۱۰۰۰۰۰

گزینه 4 ۴۰ در ۱۰۰۰

نمایش پاسخ

ج

سوال 11

کدام شاخص از گروه نشانگرهای ابتلا است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 میزان کشندگی

گزینه 2 کیفیت زندگی جسمی

گزینه 3 میزان بروز

گزینه 4 امید زندگی

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

مخرج کسر کدامیک از شاخص‌های ابتلای زیر شخص زمان (Person-time) است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 میزان کشندگی

گزینه 2 میزان شیوع

گزینه 3 میزان بروز جمععی

گزینه 4 تراکم بروز

نمایش پاسخ

د

سوال 13

اگر میزان بروز یک بیماری در زنان ۳ برابر مردان و میزان شیوع آن در زنان و مردان با یکدیگر برابر باشد، کدامیک از موارد زیر درباره‌ی این رویداد صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 طول مدت دوره‌ی بیماری در مردان کم‌تر است.

گزینه 2 میزان مرگ ناشی از بیماری در زنان بیش‌تر است.

گزینه 3 میزان مرگ ناشی از بیماری در مردان کم‌تر است.

گزینه 4 میزان و مرگ بیماری در مردان و زنان برابر است.

نمایش پاسخ

ب و ج

سوال 14

میزان بروز عبارت است از: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 یک مورد جدید بیماری که در یک دوره‌ی زمانی تعریف شده رخ داده است.

گزینه 2 موارد موجود بیماری که در یک نقطه‌ی زمانی رخ داده است.

گزینه 3 موارد جدید بیماری و موارد جدید بیماری همراه با موارد مرگ از بیماری

گزینه 4 موارد جدید بیماری همراه با موارد موجود بیماری در یک دوره‌ی زمانی

نمایش پاسخ

الف

سوال 15

کدام عبارت در مورد شیوع و ارتباط آن با زمان و بروز درست است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 شیوع مساوی است با بروز ضربدر مدت بیماری

گزینه 2 شیوع مساوی است با بروز تقسیم بر مدت بیماری

گزینه 3 شیوع مساوی است با مدت بیماری تقسیم بر بروز آن

گزینه 4 شیوع مساوی است با بروز منهای مدت بیماری

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

کدامیک از گزینه‌های زیر بروز سل را در شهرستان الف نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۳۰ هزار نفر از مردم در شهرستان الف مبتلا به سل بوده‌اند.

گزینه 2 در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۲ درصد افراد در شهرستان الف به سل مبتلا شده‌اند.

گزینه 3 در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۳ درصد از مردم در شهرستان الف مبتلا به سل بوده‌اند.

گزینه 4 در سال ۱۳۹۵ تقریباً ۱ درصد بیماران مبتلا به سل در شهرستان الف اضافه شده است.

نمایش پاسخ

ب

سوال 17

کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش شیوع بیماری در یک جمعیت می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان/پزشکی اسفند۹۷_ قطب کرمان)

گزینه 1 افزایش شدت بیماری

گزینه 2 افزایش طول مدت بیماری

گزینه 3 بهبود روش‌های درمانی

گزینه 4 مهاجرت افراد سالم به داخل

نمایش پاسخ

ب

سوال 18

نظام مراقبت در یکی از استان‌های کشور موارد جدید گزارش شده یک بیماری خاص را ارائه نموده است. با این گزارش کدامیک از شاخص‌های زیر را بهتر می‌توان برآورد کرد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 شیوع نقطه‌ای

گزینه 2 شیوع دوره‌ای

گزینه 3 خطر قابل انتساب

گزینه 4 میزان بروز

نمایش پاسخ

د

سوال 19

کدامیک از شاخص‌های زیر برای مقاصد مدیریت و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی- درمانی کاربرد بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۳_قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 میزان کشندگی

گزینه 2 میزان شیوع

گزینه 3 میزان مرگ اختصاصی

گزینه 4 میزان بروز

نمایش پاسخ

ب

سوال 20

تعداد موارد موجود بیماری در یک جمعیت در معرض خطر در یک دوره‌ی زمانی معین با کدام گزینه همخوانی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 بروز تجمعی

گزینه 2 شیوع تجمعی

گزینه 3 بروز دوره‌ای

گزینه 4 شیوع دوره‌ای

نمایش پاسخ

د

سوال 21

چنانچه کلیه موارد از سرطان‌های گوارشی جدید در جمعیت بالای چهل سال در سال ۱۳۹۲ را در جمعیت یک استان به افراد سالم همان جمعیت در همان منطقه در آن سالم تقسیم کنیم، حاصل عبارت است از: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 کشندگی

گزینه 2 وقوع

گزینه 3 بروز

گزینه 4 شیوع

نمایش پاسخ

ج

سوال 22

میزان شیوع سرطان کولون در کشور ما نسبت به ۱۵ سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. کدام توجیه زیر در این مورد صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 کوتاه شدن طول دوره‌ی بیماری

گزینه 2 گزارش‌دهی بیش‌تر

گزینه 3 افزایش میزان بروز

گزینه 4 غربالگری سرطان کولون

نمایش پاسخ

الف

سوال 23

از استان چهارمحال بختیاری در طول یک سال گذشته تعدادی موارد بیماری بروسلوز تشخیص داده شده به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گزارش شده است. این تعداد بیماری معرف کدامیک از شاخص‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 بروز

گزینه 2 شیوع

گزینه 3 فراوانی نسبی

گزینه 4 خطر نسبی

نمایش پاسخ

الف یا ب

سوال 24

چنانچه کلیه موارد سرطان‌های گوارشی در سال ۱۳۹۰ را در جمعیت آذربایجان غربی به متوسط جمعیت آن استان در آن سال تقسیم کنیم، حاصل عبارت خواهد بود از:
(پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 کشندگی بیماری

گزینه 2 بروز

گزینه 3 شیوع

گزینه 4 وقوع

نمایش پاسخ

ج

سوال 25

۱۵۰۰ فرد سیگاری غیر بیمار را به مدت ۱۰ سال پیگیری کردیم، در این مدت یک درصد آن‌ها مبتلا به سرطان ریه شدند. نسبت ۱% چه شاخصی را نشان می‌دهد؟
(پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 بروز تجمعی

گزینه 2 چگالی بروز

گزینه 3 شیوع نقطه‌ای

گزینه 4 شیوع طول عمر

نمایش پاسخ

الف

سوال 26

میزان بروز یک بیماری در زنان ۵ برابر مردان است ولی میزان شیوع آن اختلاف جنسیت را نشان نمی‌دهد. بهترین توضیح برای نشان دادن این اختلاف کدام است؟
(پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 میزان میرایی خام برای تمام دلایل در زنان بیش‌تر است.

گزینه 2 میزان کشندگی این بیماری برای زنان بیش‌تر است.

گزینه 3 طول مدت بیماری در زنان طولانی‌تر است.

گزینه 4 عوامل خطر ابتلا به این بیماری در زنان شیوع بالاتری دارد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 27

همه‌ی موارد زیر از علل افزایش شیوع یک بیماری مزمن در جامعه است،_بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 مهاجرت افراد سالم به منطقه

گزینه 2 افزایش حساسیت روش‌های تشخیصی

گزینه 3 افزایش بروز بیماری

گزینه 4 افزایش طول عمر بیماران

نمایش پاسخ

الف

سوال 28

تمام موارد زیر سبب افزایش میزان شیوع دیابت در یک جامعه می‌شود، بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 انجام غربالگری در افراد به ظاهر سالم

گزینه 2 کاهش نقطه‌ی برش (Cut-off) قند خون ناشتا

گزینه 3 افزایش پوشش درمان بیماران شناسایی شده

گزینه 4 افزایش مرگ و میر بیماران

نمایش پاسخ

د

سوال 29

در یک جمعیت بروز سالانه یک بیماری در خانم‌ها و آقایان برابر بوده ولی شیوع این بیماری در آقایان دو برابر خانم‌ها است. کدامیک از گزینه‌های ذیل می‌تواند شرایط مذکور را توجیه نماید؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 مهاجرت آقایان بیمار از این جامعه بیش‌تر از خانم‌های بیمار است.

گزینه 2 خانم‌ها بهتر از آقایان تشخیص داده شده و درمان می‌شوند.

گزینه 3 مرگ به علت ابتلا به این بیماری در آقایان بیش‌تر از خانم‌ها است.

گزینه 4 پاسخ به درمان آقایان بیمار بهتر از خانم‌های بیمار است.

نمایش پاسخ

سوال 30

اگر چنانچه بروز سالانه بیماری‌های کرونری قلب در افراد سیگاری ۲۰۰ در هر ۱۰۰۰ نفر و در افراد غیر سیگاری ۵۰ در هر ۱۰۰۰ نفر باشد، با ترک سیگار در جمعیت افراد سیگاری انتظار داریم بروز بیماری‌های کرونری قلب در این گروه چند درصد کاهش یابد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ۱۵

گزینه 2 ۲۵

گزینه 3 ۶۵

گزینه 4 ۷۵

نمایش پاسخ

د. البته صورت سؤال گفته بود ۲۰ در هر هزار نفر. یعنی سیگار بخشی ریسک بیماری قلبی کم‌تره!!! من خودم کردمش ۲۰۰ تا جواب درست بشه!

سوال 31

در طی نیم‌سال دوم تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳، ده مورد بیماری «الف» در بین دانشجویان کشف گردید که پنج مورد از آن‌ها مربوط به ابتلای نیم‌سال اول تحصیلی همان سال بوده است. برای گزارش میزان بروز این بیماری در نیم‌سال دوم، دانستن کدامیک از موارد زیر ضروری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 توزیع سنی و جنسی جمعیت تحت مطالعه

گزینه 2 متوسط دوره بیماری در افراد تحت مطالعه

گزینه 3 جمعیت در معرض خطر در آن دوره‌ی زمانی

گزینه 4 چیزی بیش‌تر از داده‌های ارائه شده لازم نیست

نمایش پاسخ

سوال 32

تعداد موارد موجود یک بیماری در یک مقطع زمانی به کل جمعیت در همان مقطع زمانی، معرف چه نوع میزانی است؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 میزان شیوع دوره‌ای

گزینه 2 میزان بروز

گزینه 3 میزان بروز تجمعی

گزینه 4 میزان شیوع لحظه‌ای

نمایش پاسخ

سوال 33

کدامیک از موارد زیر موجب افزایش شیوع یک بیماری در یک منطقه می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 کاهش میزان بروز بیماری

گزینه 2 میزان کشندگی بالای بیماری

گزینه 3 کوتاه بودن دوره‌ی بیماری

گزینه 4 بهبود امکانات تشخیص

نمایش پاسخ

سوال 34

برای درمان یک بیماری خاص دارویی جدید ساخته شده است، این دارو از مرگ جلوگیری کرده ولی موجب بهبودی نمی‌شود. مصرف این دارو در یک جامعه‌ی معین رخداد کدام گزینه را در طول زمان باعث می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 کاهش شیوع

گزینه 2 افزایش شیوع

گزینه 3 افزایش بروز

گزینه 4 کاهش بروز

نمایش پاسخ

سوال 35

در شهری با جمعیت ۳۰۰۰۰ نفر، در بررسی اولیه در ابتدای سال ۹۲، تعداد ۲۰۰مورد از بیماری «الف» موجود بود. در طول سال ۹۲، تعداد ۳۰۰ مورد بیماری مشاهده شد. میزان بروز این بیماری در سال ۹۲ را محاسبه کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۱۰ در هزار نفر

گزینه 2 ۱۶/۶ در هزار نفر

گزینه 3 ۳۰ در هزار نفر

گزینه 4 ۶۶/۶ در هزار نفر

نمایش پاسخ

الف

سوال 36

در منطقه‌ای با ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت، ۱۰۰۰ مورد از بیماری A وجود دارد. در سال ۱۳۹۳ تعداد ۹۰ مورد جدید از ابتلا به این بیماری گزارش شده است. میزان بروز بیماری A در سال ۱۳۹۳ چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 ۱٪

گزینه 2 ۱۰٪

گزینه 3 ۰/۹٪

گزینه 4 ۹٪

نمایش پاسخ

الف

سوال 37

در یک شهر دویست هزار نفری، بیست هزار نفر دیابت دارند و در طول سال ۹۲، ۳۶۰۰ نفر دیگر به دیابت مبتلا می‌شوند، میزان بروز بیماری در سال ۹۲ در این شهر چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 ۱۰۰ در هزار

گزینه 2 ۱۸ در هزار

گزینه 3 ۲۰ در هزار

گزینه 4 ۲۸ در هزار

نمایش پاسخ

ج

سوال 38

در محاسبه‌ی میزان بروز یک بیماری مخرج کسر کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شهیدبهشتی / دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 کل جمعیت بیمار در جامعه

گزینه 2 موارد قدیم بیماری در جامعه

گزینه 3 جمعیت در معرض خطر بیماری

گزینه 4 موارد جدید بیماری در جامعه

نمایش پاسخ

ج

سوال 39

در کدامیک از شاخص‌های زیر در مخرج کسر «افراد سالم در معرض خطر در ابتدای دوره» قرار می‌گیرند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب اهواز)

گزینه 1 بروز تجمعی

گزینه 2 بروز دوره‌ای

گزینه 3 شیوع لحظه‌ای

گزینه 4 شیوع دوره‌ای

نمایش پاسخ

الف

سوال 40

در یک جمعیت ششصد هزار نفری شهری، ۶۰٪ آن‌ها زن هستند. اگر ۱۸ مورد جدید سرطان رحم در مدت یک سال دیده شود، میزان بروز بیماری در این منطقه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ۵ در میلیون

گزینه 2 ۵ در یکصد هزار

گزینه 3 ۳ در میلیون

گزینه 4 ۳ در یکصد هزار

نمایش پاسخ

ب

سوال 41

کدامیک از شاخص‌های زیر منعکس کننده‌ی بار بیماری در یک جامعه است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 بروز تجمعی

گزینه 2 شیوع

گزینه 3 کشندگی

گزینه 4 مرگ و میر

نمایش پاسخ

ب

سوال 42

کدام گزینه در مورد شاخص «شیوع» صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 وسیله‌ای بسیار مهم و مفید برای تعیین بار بیماری در جامعه است.

گزینه 2 در محاسبه‌ی آن صورت کسر شامل موارد جدید یک بیماری در جمعیت در دوره‌ی زمانی مشخص است.

گزینه 3 احتمال خطر ابتلای به بیماری را اندازه‌گیری می‌کند.

گزینه 4 در محاسبه‌ی آن مخرج کسر شامل افراد در خطر ابتلا به بیماری است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 43

تمام کودکان ۶ ساله در بدو ورود به مدرسه از نظر اختلال بینایی مورد بررسی قرار می‌گیرند، با این بررسی کدامیک از معیارهای ابتلا به اختلال بینایی، قابل اندازه‌گیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 شیوع

گزینه 2 بروز تجمعی

گزینه 3 میزان بروز

گزینه 4 خطر مطلق

نمایش پاسخ

الف

سوال 44

پاسخ به سؤال «آیا در طول یک سال گذشته به پرفشاری خون مبتلا بوده‌اید؟» کدام شاخص را اندازه‌گیری می‌نمایید؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/دندان اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 بروز تجمعی

گزینه 2 شیوع لحظه‌ای

گزینه 3 تراکم بروز

گزینه 4 شیوع دوره‌ای

نمایش پاسخ

د

سوال 45

در برنامه‌ریزی جهت ارائه‌ی خدمات بهداشتی درمانی، از کدام میزان زیر بیش‌تر استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 بروز

گزینه 2 شیوع

گزینه 3 مرگ و میر

گزینه 4 کشندگی بیماری

نمایش پاسخ

ب

سوال 46

اگر از یک نمونه‌ی تصادفی ۱۰۰۰ نفری ساکنین یک شهر در مورد ابتلا آن‌ها به درد زانو طی سال گذشته سؤال شود. چه شاخصی از شیوع در مورد درد زانو قابل محاسبه است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 تمامی عمر

گزینه 2 دوره‌ای

گزینه 3 لحظه‌ای

گزینه 4 تجمعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 47

در صورتی که یک داروی جدید ضد سرطان موجب افزایش طول عمر بیماران گردد، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 کاهش میزان شیوع

گزینه 2 افزایش میزان شیوع

گزینه 3 افزایش میزان بروز

گزینه 4 کاهش میزان بروز

نمایش پاسخ

ب

سوال 48

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد شیوع بیماری‌ها نادرست است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 شیوع تعداد موارد موجود بیماری در یک جمعیت در معرض خطر است.

گزینه 2 شیوع به صورت لحظه‌ای، تمامی عمر و دوره‌ای محاسبه می‌شود.

گزینه 3 کاربرد شیوع در تعیین نیازهای مربوط به مراقبت بهداشتی در جامعه است.

گزینه 4 برای اندازه‌گیری شیوع، جمعیتی را مشخص نموده و آن‌ها را در یک دوره‌ی زمانی مشخص پیگیری می‌نماییم تا موارد جدید آشکار شوند.

نمایش پاسخ

د

سوال 49

فرض کنید در فروردین سال ۱۳۹۳، هزار نفر از ساکنان بزرگسال شهر X دعوت برای انجام آزمایش HIV/AIDS را در مرکز ویژه‌ی که برای این کار در نظر گرفته شده بود پذیرفتند. در این آزمایشات نشان داده شده که ۸ نفر به این ویروس آلوده‌اند که ۵ نفر از آن‌ها در جریان آلودگی خود بوده و تحت درمان قرار داشتند و ۳ نفرشان در آزمایش انجام شده، به آلودگی خود به این ویروس پی بردند. شیوع HIV/AIDS درمان شده و درمان نشده در گروه تحت بررسی در فروردین ۱۳۹۳ چند در هزار بود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 ۳

گزینه 2 ۵

گزینه 3 ۸

گزینه 4 با این داده‌ها قابل محاسبه نیست.

نمایش پاسخ

ج

سوال 50

در یک مطالعه‌ی همگروهی ۱۰۰۰ نفر داوطلب ورود به مطالعه شدند. از این گروه ۱۰۰ نفر در همان بررسی اولیه مبتلا به بیماری دیابت بودند، بقیه‌ی افراد به مدت ۵ سال پیگیری شدند و در این مدت ۴۵ مورد جدید دیابت شناسایی گردید. خطر ابتلا به دیابت در طی ۵ سال چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 ۴۵/۹۰۰

گزینه 2 ۴۵/۱۰۰۰

گزینه 3 ۱۴۵/۹۰۰

گزینه 4 ۱۴۵/۱۰۰۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 51

در طول یک سال ۲۰۰ نفر به یک بیماری خاص دچار می‌شوند. تعداد افراد عادی از همان بیماری در ابتدای مطالعه ۱۰۰۰۰۰ نفر و در پایان دوره ۱۰۶۰۰۰ نفر هستند. بروز تجمعی بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۲۰۰ به ۱۰۰ هزار

گزینه 2 ۲۰۰ به ۱۰۳ هزار

گزینه 3 ۲۰۰ به ۱۰۶ هزار

گزینه 4 ۲۰۰ به ۶ هزار

نمایش پاسخ

الف

سوال 52

میزان مرگ و میر خام چه نوع اندازه‌گیری اپیدمیولوژیکی به شمار می‌رود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 کشندگی

گزینه 2 شیوع

گزینه 3 بروز

گزینه 4 شانس

سوال 53

بهبود روش‌های درمانی بیماری دیابت که منجر به افزایش متوسط تعداد افراد مبتلا شده است. این پدیده منجر به رخداد کدامیک از موارد زیر می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

- گزینه 1 افزایش شیوع
- گزینه 2 افزایش بروز
- گزینه 3 کاهش شیوع
- گزینه 4 کاهش بروز

سوال 54

در یک جامعه با جمعیت ۴۹۰۰ نفر در ابتدای سال ۵۰ بیمار مبتلا به پرفشاری خون وجود داشته و در طول سال ۴۰ بیمار پرفشاری خون جدید تشخیص داده شده است. میزان بروز تجمعی پرفشاری خون در این جامعه چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

- گزینه 1 $1000 \times 90 / 4900$
- گزینه 2 $1000 \times 40 / 4900$
- گزینه 3 $1000 \times 90 / 4850$
- گزینه 4 $1000 \times 40 / 4850$

سوال 55

در یک شهر دویست هزار نفری ۲۰ هزار نفر مبتلا به فشار خون بالا هستند، اگر در طول یک سال ۱۸۰۰ فر دیگر به فشار خون بالا مبتلا شوند میزان بروز در این شهر چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

- گزینه 1 ۱ در هزار
- گزینه 2 ۲ در هزار
- گزینه 3 ۱۰ در هزار
- گزینه 4 ۲۰ در هزار

سوال 56

در یک جمعیت ۱۰۰ نفری، ۲۰ نفر به بیماری B مبتلا می‌باشند، در صورتی که طی یک هفته پیگیری ۲۰ نفر به این بیماری مبتلا شوند، «میزان بروز» بیماری در این مدت عبارت است از؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

- گزینه 1 ۴۰%
- گزینه 2 ۲۰%
- گزینه 3 ۲۵%
- گزینه 4 ۱%

سوال 57

اگر میزان بروز یک بیماری برابر ۲۰ مورد در ۲۰۰ نفر جمعیت در سال و مدت زمان متوسط بیماری، ۵ سال باشد، میزان شیوع بیماری تقریباً چند در هزار نفر جمعیت است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

- گزینه 1 ۵۰
- گزینه 2 ۱۲/۵
- گزینه 3 ۲/۴
- گزینه 4 ۲/۱

سوال 58

کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش «شیوع» می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

- گزینه 1 افزایش طول مدت بیماری

گزینه 2 کاهش طول مدت بیماری

گزینه 3 افزایش میزان بهبودی کامل بیماری

گزینه 4 افزایش مرگ ناشی از بیماری

نمایش پاسخ

الف

سوال 59

تعداد موارد جدید یک بیماری در مدت معین تقسیم بر متوسط جمعیت در معرض آن بیماری در همان زمان محاسبه‌ی کدامیک از شاخص‌ها است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 شاخص بروز

گزینه 2 شاخص شیوع

گزینه 3 میزان شیوع دوره‌ای

گزینه 4 میزان بروز تجمعی

نمایش پاسخ

الف

سوال 60

«تعداد موارد جدید بیماری در یک دوره‌ی زمانی» به کدامیک از مفاهیم زیر ارتباط دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶. قطب تبریز)

گزینه 1 شخص- زمان

گزینه 2 شیوع

گزینه 3 ارزش اخباری

گزینه 4 بروز

نمایش پاسخ

د

سوال 61

میزان «شیوع» به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز، همدان و زنجان)

گزینه 1 مدت بیماری

گزینه 2 میزان بروز

گزینه 3 تعداد موارد موجود بیماری در یک مقطع زمانی

گزینه 4 زمان شروع بیماری

نمایش پاسخ

د

سوال 62

فرمول زیر مربوط به کدامیک از شاخص‌های اندازه‌گیری سلامت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)
تعداد افراد جامعه که در یک فاصله‌ی زمانی معین بیمار می‌شوند تقسیم بر تعداد افراد آن جامعه در ابتدای همان فاصله‌ی زمانی $\times 10^4$

گزینه 1 میزان بروز تجمعی

گزینه 2 میزان شیوع

گزینه 3 میزان بروز

گزینه 4 میزان شیوع نقطه‌ای

نمایش پاسخ

الف

سوال 63

میزان ابتلا Morbidity Rates کدامیک از موارد ذیل است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 میزان بروز Incidence Rate

گزینه 2 میزان شیوع Prevalence Rate

گزینه 3 میزان مرگ خام Crude death Rate

گزینه 4 گزینه‌ی الف و ب

نمایش پاسخ

د

سوال 64

در چه صورت شیوع بیماری در جامعه افزایش می‌یابد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 افزایش بروز بیماری و یا افزایش متوسط مدت بیماری

گزینه 2 افزایش بروز بیماری و یا کاهش متوسط مدت بیماری

گزینه 3 افزایش بروز بیماری و یا افزایش میزان کشندگی بیماری

گزینه 4 کاهش بروز بیماری و یا افزایش متوسط مدت بیماری

نمایش پاسخ

الف

سوال 65

تعداد موارد جدید از یک حالت یا بیماری که در یک جمعیت مشخص در یک دوره‌ی زمانی معین رخ می‌دهد را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 نسبت

گزینه 2 تناسب

گزینه 3 بروز

گزینه 4 شیوع

نمایش پاسخ

ج

سوال 66

«تعدادی از جمعیت که در زمان انجام مطالعه دچار آن بیماری هستند تقسیم بر جمعیت در خطر ابتلا به بیماری، تعریف کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 شیوع

گزینه 2 بروز

گزینه 3 نرخ ابتلا

گزینه 4 بیماریزایی

نمایش پاسخ

الف

سوال 67

کدام تعریف به میزان بروز (Incidence) اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 همه‌ی موارد بیماری قدیم و جدید در زمان معینی با یک دوره‌ی زمانی در یک جمعیت مشخص

گزینه 2 تعداد نمونه‌های قدیم در زمان معینی با یک دوره‌ی زمانی در یک جمعیت مشخص

گزینه 3 تعداد نمونه‌های جدید در یک جمعیت مشخص که در طی یک دوره‌ی زمانی تعیین شده اتفاق می‌افتد.

گزینه 4 تعداد افراد در معرض، که طی دوره‌ی زمانی برابر یک دوره‌ی زمان تعیین شده اتفاق می‌افتد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 68

کدامیک از شاخص‌های زیر منعکس کننده‌ی بار بیماری در یک جامعه است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 شیوع

گزینه 2 بروز تجمعی

گزینه 3 کشندگی

گزینه 4 مرگ و میر

نمایش پاسخ

الف

سوال 69

در بخشی از شهرستان مشکین شهر (شامل یکصد هزار جمعیت) ۵۰ مورد جدید بیماری بروسلوز در سال ۱۳۹۵ به طور غیر منتظره اتفاق افتاده است که یک نفر از آن‌ها نیز به علت عوارض ناشی از بیماری فوت کرده است. میزان بروز بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 پنج در ده هزار

گزینه 2 یک در هزار

گزینه 3 یک درصد

گزینه 4 ده درصد

نمایش پاسخ

الف

سوال 70

پاسخ به سؤال «آیا در سال گذشته هرگز کمر درد داشته‌اند» کدامیک از میزان ابتلا را اندازه‌گیری می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 شیوع لحظه‌ای

گزینه 2 شیوع تمام عمر

گزینه 3 شیوع دوره‌ای

گزینه 4 بروز تجمعی

نمایش پاسخ

ج

سوال 71

در یک مطالعه‌ی ۲۰ ساله، از بین ۱۰۰۰ نفر مصرف کننده‌ی سیگار، ۵۰ نفر مبتلا به برونشیت مزمن شدند. در طی همین مدت، ۶ نفر از جمعیت ۱۵۰۰ نفری غیر سیگاری مبتلا به برونشیت مزمن شدند، در این حالت نسبت خطر ابتلا به برونشیت مزمن در افراد سیگاری چند برابر افراد غیر سیگاری است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 ۵

گزینه 2 ۱۵

گزینه 3 ۲۵

گزینه 4 ۵۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 72

کدامیک از اندازه‌های زیر برای نشان دادن میزان رخداد آنفولانزا در بین دانشجویان جدیدالورود طی نیم‌سال تحصیلی مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 شیوع دوره‌ای

گزینه 2 میزان کشندگی

گزینه 3 بروز

گزینه 4 موارد رخداد

نمایش پاسخ

ج. بروز به معنای موارد جدید یک بیماری است اما شیوع هم موارد جدید و هم قبلی را در بر می‌گیرد.

سوال 73

تمام عوامل زیر، سبب کاهش شیوع بیماری در جامعه می‌شود، بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 کاهش بروز بیماری

گزینه 2 کاهش دوره‌ی بیماری

گزینه 3 افزایش مرگ و میر

گزینه 4 افزایش میزان بقای بیمار

نمایش پاسخ

د. شیوع برابر حاصلضرب بروز در متوسط طول مدت بیماری است. با افزایش هر کدام شیوع هم زیاد می‌شود.

سوال 74

کدامیک از موارد زیر صورت کسر میزان بروز است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

(Ineidence Rate)

گزینه 1 تعداد کل موارد بیماری در یک مقطع زمانی

گزینه 2 تعداد موارد جدید بیماری در مدت معین

گزینه 3 تعداد موارد مرگ‌آور بیماری در یک مقطع زمانی

گزینه 4 تعداد موارد وخیم بیماری در یک مقطع زمانی

نمایش پاسخ

ب / صورت کسر میزان بروز تعداد موارد جدید بیماری در مدت معین و مخرج آن متوسط جمعیت در معرض آن بیماری در همان زمان است.

سوال 75

در سال ۹۷، تعداد ۴۵ بیمار مبتلا به سل در مرکز بیماری‌های ریوی شهر A (که دارای جمعیت ۳۸۸۰۰۰) مورد مراقبت و درمان بودند. ۳۳ مورد از آن‌ها از سال ۹۶ درمان خود را شروع کرده بودند. با توجه به این داده‌ها، کدام گزینه میزان بروز بیماری سل در شهر A در سال ۹۷ را نشان می‌دهد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 ۱/۰۵ در یکصد هزار نفر جمعیت

گزینه 2 ۳/۰۹ در یکصد هزار نفر جمعیت

گزینه 3 ۲/۰۸ در یکصد هزار نفر جمعیت

گزینه 4 ۴/۰۱ در یکصد هزار نفر جمعیت

نمایش پاسخ

ب / تعداد موارد جدید ۱۲ نفر بوده است که باید آن را بر ۳۸۸۰۰۰ تقسیم و ضربدر ۱۰۰ کنیم. حاصل گزینه‌ی ب می‌شود.

سوال 76

کدام مورد زیر از شاخص‌های ابتلا نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 میزان بروز

گزینه 2 میزان حمله

گزینه 3 شیوع

گزینه 4 کشندگی

نمایش پاسخ

د / کشندگی جزء شاخص‌های ابتلا نیست و mortality rate است شاخص‌های ابتلا میزان بروز و شیوع و میزان حمله و میزان بروز تجمعی می‌باشند.

سوال 77

میزان بروز، میزان شیوع و میزان بروز تجمعی، از جمله شاخص‌های..... هستند. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 Morbidity Rates

گزینه 2 Mortality Rates

گزینه 3 Fertility Rates

گزینه 4 Natality Rates

نمایش پاسخ

الف / شاخص‌های ابتلا میزان بروز و شیوع و میزان حمله و میزان بروز تجمعی می‌باشند.

سوال 78

بروز یک بیماری در زنان و مردان برابر است ولی شیوع بیماری مذکور در مردان ۲ برابر زنان است. کدامیک از عوامل ذیل می‌تواند، شرایط فوق را توجیه نماید؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 مرگ بیش‌تر بیماران در زنان

گزینه 2 بهبودی بیش‌تر بیماران در مردان

گزینه 3 مهاجرت بیش‌تر بیماران مرد

گزینه 4 مقاومت بیش‌تر زنان در برابر بیماری

نمایش پاسخ

الف / شیوع برابر حاصلضرب بروز در متوسط طول مدت بیماری است. با افزایش هر کدام شیوع هم زیاد می‌شود پس زنان بیش‌تر از مردان می‌میرند.

سوال 79

اگر در یک مطالعه از شرکت کنندگان سؤال شود «آیا در حال حاضر مبتلا به آسم هستید؟» کدامیک از شاخص‌های وقوع بیماری سنجیده می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 شیوع لحظه‌ای (Point prevalence)

گزینه 2 شیوع دوره‌ای (Period prevalence)

گزینه 3 تراکم بروز (Cumulative incidence)

گزینه 4 میزان حمله (Attack rate)

نمایش پاسخ

الف / شیوع میزان کل مبتلایان را اندازه‌گیری می‌کند اما شیوع لحظه‌ای تعداد کل مبتلایان را در حال حاضر اندازه می‌گیرد.

سوال 80

وجه اشتراک بروز بر مبنای شخص (بروز تجمعی) و بروز بر مبنای شخص- زمان (تراکم بروز) چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 اندازه‌ی به دست آمده در هر دو بین صفر تا یک است.

گزینه 2 مقدار خطر مطلق را ارائه می‌دهند.

گزینه 3 خطر نسبی را مستقیماً محاسبه می‌کنند.

گزینه 4 براساس برآورد جمعیت قابل محاسبه نیستند.

نمایش پاسخ

ج / در بروز تجمعی در مخرج کسر تعداد افراد سالم در معرض خطر وجود دارد و با خود میزان بروز تفاوت دارد ولی وجه اشتراک آن‌ها این است که خطر نسبی را مستقیماً محاسبه می‌کنند.

سوال 81

در یک جمعیت ۱۰۰ نفری، ۲۰ نفر به بیماری B مبتلا می‌باشند در صورتی که یک هفته پیگیری ۲۰ نفر دیگر به این بیماری مبتلا شوند میزان بروز بیماری در این مدت عبارت است از؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 ۱۰%

گزینه 2 ۲۰%

گزینه 3 ۲۵%

گزینه 4 %۴۰

نمایش پاسخ

د / تعداد کل موارد جدید بیماری ۴۰ نفر است که تقسیم بر ۱۰۰ می‌شود (۴۰٪) **شیوع** بروز = $\frac{۴۰}{۱۰۰}$

سوال 82

میزان بروز و میزان شیوع جزء کدام نشانگرها است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 ابتلا

گزینه 2 جسمی

گزینه 3 میرایی

گزینه 4 انتقالی

نمایش پاسخ

الف

سوال 83

اگر صورت کسر تعداد همه‌ی بیماران موجود (جدید و قدیم) یک بیماری معین در یک مقطع زمانی معین باشد، نشان دهنده‌ی کدام میزان است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 بروز

گزینه 2 وفور

گزینه 3 کشندگی

گزینه 4 بقا

نمایش پاسخ

ب. وفور همون شیوعه :|

سوال 84

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد شاخص‌های اندازه‌گیری بیماری‌ها صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان)

گزینه 1 شیوع بیماری، با اندازه‌گیری تعداد موارد جدید در یک جمعیت همواره در حال تغییر سنجیده می‌شود.

گزینه 2 مطالعات همگروهی در جمعیت می‌تواند برای اندازه‌گیری میزان بروز بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

گزینه 3 مطالعات بروز به بررسی‌هایی که در یک مقطع زمانی و در یک جمعیت بخصوص انجام می‌گردد، اطلاق می‌شود.

گزینه 4 شیوع ابتدا با شناسایی یک جمعیت فاقد بیماری و سپس با پیگیری آن‌ها جهت تعیین وقوع ان بیماری اندازه‌گیری می‌شود.

نمایش پاسخ

ب

سوال 85

در محاسبه‌ی میزان شیوع، صورت کسرکدامیک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 قدیم بیماری

گزینه 2 جدید بیماری

گزینه 3 جمعیت در معرض خطر ابتلاء

گزینه 4 قدیم و جدید بیماری

نمایش پاسخ

د. شیوع یعنی همه‌ی موارد جدید و قدیم بیماری

سوال 86

کدام یک از شاخص های زیر برای مقاصد مدیریت و برنامه ریزی خدمات بهداشتی کاربرد بیشتری دارد؟(دندان پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 میزان بروز

گزینه 2 اندازه شیوع

گزینه 3 میزان کشندگی

گزینه 4 میزان مرگ اختصاصی

نمایش پاسخ

ب /شیوع میزان بار بیماری روی جامعه را نشان میدهدو برای برنامه ریزی ارایه خدمات بهداشتی درمانی استفاده میشود.

سوال 87

در یک مهمانی نسبت بروز مسمومیت در افرادی که غذای خاصی را مصرف کرده اند ده برابر افرادی است که از ان غذا نخورده اند عدد ده نشسانگر چیست؟(پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 خطر نسبی

گزینه 2 میزان بروز

گزینه 3 خطر منتسب

گزینه 4 میزان ابتلا

نمایش پاسخ

الف / طبق فرمول خطر نسبی

سوال 88

در یک جمعیت ۱۰۰ هزار نفری، ۱۵۰۰۰ سالمند حضور دارند. در جریان اپیدمی کووید۱۹، ۱۸۰۰ سالمند در این جمعیت به بیماری مبتلا شدند که ۱۳۵ نفر از آن‌ها در اثر این بیماری فوت کردند. میزان حمله و میزان کشندگی بیماری در بین سالمندان این جمعیت به ترتیب چند در صد است؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹ - میان دوره)

- گزینه 1 ۱۲ و ۷.۵
- گزینه 2 ۱.۸ و ۷.۵
- گزینه 3 ۱۲ و ۰.۹
- گزینه 4 ۱.۸ و ۰.۹

نمایش پاسخ

الف / میزان حمله ۱۲ و میزان کشندگی ۷.۵ است.

سوال 89

در یک مطالعه مورد - شاهدهی از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان کبد ۱۰۰ نفر و از ۱۰۰۰ فرد گروه شاهد ۸۰۰ نفر سابقه حداقل یک بار تزریق واکسن هیپاتیت ب را ذکر کردند. نسبت شانس رابطه تزریق واکسن و سرطان کبد کدام است؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹ - میان دوره)

- گزینه 1 ۳۶/۱
- گزینه 2 ۱۸/۱
- گزینه 3 ۱۲/۱
- گزینه 4 ۸/۱

نمایش پاسخ

الف / در این نوع از مطالعات افراد به ترتیب برحسب داشتن یا نداشتن یک پیامد معین (همانند یک بیماری یا یک وضعیت خاص) در گروه مورد (Case) و گروه شاهد (Control) قرار می گیرند.

سوال 90

در یک مطالعه از دانشجویان پرسیده شده است: " آیا در ۱۲ ماه گذشته بر اساس تشخیص پزشک یا مشاور به افسردگی مبتلا بوده اید؟". با این سوال کدام شاخص اپیدمیولوژیک را می توان تعیین نمود؟ (علوم پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰ - میان دوره کشوری)

- گزینه 1 بروز جمععی
- گزینه 2 میزان بروز
- گزینه 3 شیوع نقطه ای
- گزینه 4 شیوع دوره ای

نمایش پاسخ

د / شیوع دوره ای: تعداد موارد موجود در یک دوره ی مشخص زمان تقسیم بر تعداد افراد در معرض خطر همان دوره

سوال 91

اگر در مصاحبه ای به منظور بررسی وضعیت سلامت دانشجویان از آن ها سؤال شود که آیا تاکنون به بیماری (x) مبتلا شده اید؟ پاسخ سؤال، کدام يك از موارد زیر را براي ما می تواند تعیین کند؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری)

- گزینه 1 شیوع نقطه ای
- گزینه 2 بروز جمععی
- گزینه 3 شیوع دوره ای
- گزینه 4 میزان حمله

نمایش پاسخ

ب / اگر در مصاحبه ای به منظور بررسی وضعیت سلامت دانشجویان از آن ها سؤال شود که آیا تاکنون به بیماری (x) مبتلا شده اید؟ پاسخ سؤال، بروز جمععی را تعیین می کند.

سوال 92

شیوع بیماری اسکیزوفرنی در جمعیت عمومی حدود يك درصد است. با فرض اینکه متوسط طول دوره بیماری اسکیزوفرنی ۲۰ سال باشد، خطر سالانه ابتلا به اسکیزوفرنی در افراد سالم چند درصد است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری)

- گزینه 1 ۰.۰۵
- گزینه 2 ۰.۱
- گزینه 3 ۱
- گزینه 4 ۵

نمایش پاسخ

الف خطر سالانه ابتلا به اسکیزوفرنی در افراد سالم ۰.۰۵ درصد است

سوال 93

حساسیت و ویژگی يك تست سنجش آنتی‌بادی کووید ۱۹ در تشخیص سابقه عفونت به ترتیب ۸۵ و ۹۵ درصد است. در جامعه‌ای که ۲۰ درصد افراد به عفونت کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند، چند درصد افراد با این تست، مثبت شناخته می‌شوند؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

- گزینه 1 ۴
- گزینه 2 ۱۵
- گزینه 3 ۱۷
- گزینه 4 ۲۱

نمایش پاسخ

د / ۲۱ درصد افراد مبتلا شناخته می‌شوند.

سوال 94

در یک مطالعه مورد شاهدی، از ۲۰۰۰ بیمار مبتلا به بیماری کووید ۱۹- تعداد ۲۰۰ نفر و از ۱۲۸۰ نفر شاهد غیر مبتلا به بیماری تعداد ۲۰ نفر از کارکنان درمانی بودند. نسبت شانس رابطه شغل کارکنان درمانی با ابتلا به بیماری کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری)

- گزینه 1 ۷
- گزینه 2 ۶
- گزینه 3 ۴
- گزینه 4 ۳

نمایش پاسخ

الف / ۷ = ۲۰ × ۱۲۶۰ / ۱۸۰۰ × ۲۰۰ پس نسبت شانس ۷ است.

سوال 95

اگر تعداد دانشجویان دندان‌پزشکی که به تازگی به آنفلوانزا مبتلا شده‌اند را به کل جمعیت دانشجویان دندان‌پزشکی در یک بازه زمانی یک ساله تقسیم کنیم کدام شاخص در مورد آنفلوانزا بدست می‌آید؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

- گزینه 1 Prevalence
- گزینه 2 Morbidity
- گزینه 3 Incidence
- گزینه 4 Causation

نمایش پاسخ

ج / Incidence یا بروز عبارت است از (تعداد موارد جدید یک بیماری در مدت معین) به روی (متوسط جمعیت در معرض آن بیماری در همان زمان)

سوال 96

در بیماری‌های غیر واگیر مانند دیابت و پرفشاری خون، کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی‌۹۹ -میان‌دوره)

- گزینه 1 میزان شیوع و بروز با هم برابرند.
- گزینه 2 میزان شیوع بیش از بروز است.
- گزینه 3 میزان بروز بیش از شیوع است.
- گزینه 4 شیوع و بروز در این بیماری‌ها مفهومی ندارد.

نمایش پاسخ

ب / شیوع یعنی محاسبه همه بیماران قدیم و جدید. اما بروز به معنای محاسبه آمار، بیماران جدید است.

سوال 97

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد تعریف شیوع دوره‌ای بیماری صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

- گزینه 1 تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص، به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.
- گزینه 2 تعداد کل افرادی که در یک لحظه زمانی مشخص، به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.
- گزینه 3 تعداد کل افرادی که در هر زمانی طی یک‌سال مبتلا به بیماری یا خاصه موردنظر بوده‌اند.
- گزینه 4 تعداد افرادی که حداقل در دوره ای از حیات خود به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.

نمایش پاسخ

الف / شیوع دوره‌ای یعنی: تعداد کل افرادی که در هر زمانی از یک دوره مشخص، به بیماری یا خاصه موردنظر مبتلا بوده‌اند.

میزان‌های باروری و مرگ و میر

تعدادسوال: ۱۱۸

درجه سختی: متوسط

نکات:۱-فرمول حمله ثانویه و میزان کشندگی را حتما بلد باشید۲- متوسط تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوره ی باروری خود به دنیا می آورد (باروری کلی) نام دارد ۳- مخرج کسر شاخص مرگ و میر مادران باردار موالید زنده در همان مدت است.

خودآزمایی

سوال 1

در محاسبه‌ی میزان مرگ و میر خام، مخرج کسر (برحسب جمعیت) براساس کدام مقطع زمانی تعریف می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان/پزشکی اسفند ۹۵ _قطب دانشگاه شهید بهشتی)

گزینه 1 انتهای سال جاری

گزینه 2 میانه سال جاری

گزینه 3 ابتدای سال جاری

گزینه 4 انتهای سال قبل

نمایش پاسخ

ب

سوال 2

در جامعه‌ای با جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفر، ۱۰۰۰ تولد زنده رخ داده که از این تعداد، ۱۰ کودک زیر ۲۸ روز و ۵۰ کودک زیر ۳۶۵ روز فوت شدند. میزان مرگ نوزادان در این جامعه چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۰/۹ در هزار

گزینه 2 ۱۰ در هزار

گزینه 3 ۰/۵ در هزار

گزینه 4 ۵۰ در هزار

نمایش پاسخ

ب

سوال 3

در کدامیک از میزان‌های زیر مخرج کسر تعداد موالید زنده است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال/پزشکی اسفند ۹۵ _قطب اصفهان/ دندان پزشکی اسفند ۹۶ _قطب مشهد)

گزینه 1 تولد خام

گزینه 2 مرگ خام

گزینه 3 مرگ مادران

گزینه 4 مرگ علیتی

نمایش پاسخ

ج

سوال 4

میزان مرگ مادران (MMR) براساس کدامیک از گزینه‌های زیر محاسبه می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 کل جمعیت هر منطقه

گزینه 2 کودکان زیر یک سال

گزینه 3 تولد زنده

گزینه 4 زنان گروه سنی ۱۵-۴۴ سال

نمایش پاسخ

ج

سوال 5

در محاسبه‌ی «میزان مرگ و میر مادران» به کدامیک از اطلاعات زیر نیاز است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 تعداد زنان باردار سال

گزینه 2 تعداد موالید زنده سال

گزینه 3 تعداد زنان ۱۵-۴۴ سال

گزینه 4 تعداد زایمان‌های سال

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

در شهرستانی با جمعیت یک میلیون نفر در سال ۱۳۹۱، تعداد کل حاملگی‌ها ۲۰۰ هزار مورد بود که منجر به ۱۵۰ هزار تولد زنده شد. در همان سال ۳۰ مورد مرگ مادر رخ داد. میزان مرگ و میر مادران یا MMR چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 ۲۰ در هزار

گزینه 2 ۱۵ در صد هزار

گزینه 3 ۲۰ در صد هزار

گزینه 4 ۱۵ در هزار

نمایش پاسخ

ج

سوال 7

در منطقه‌ای با جمعیت ۶۰۰۰۰۰ نفر در وسط سال ۳ مادر به علت عوارض بارداری فوت شده‌اند. اگر موالید زنده در همان سال در آن منطقه ۱۵۰۰ نفر باشد MMR در آنجا چقدر است؟ (در ۱۰۰۰۰۰) (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۵/۰

گزینه 2 ۱

گزینه 3 ۵/۱

گزینه 4 با این اطلاعات قابل محاسبه نیست.

نمایش پاسخ

د / هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ عدد ۲۰۰ است.

سوال 8

برای محاسبه‌ی میزان مرگ و میر شیرخواران، مخرج کسر کدام مورد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 متوسط جمعیت

گزینه 2 تعداد موالید زنده

گزینه 3 تعداد کودکان شیرخوار

گزینه 4 تعداد مادران شیرده

نمایش پاسخ

ب

سوال 9

اگر در یک کشور ۷۰ میلیونی، در طول یک سال ۵/۱ میلیون نوزاد به دنیا بیایند و ۴۵ هزار کودک زیر یک سال در همین مدت فوت نمایند، میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال (IMR) چند در هزار خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 ۳۰

گزینه 2 ۹۰

گزینه 3 ۱۸۰

گزینه 4 ۳۰۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 10

در شاخص مرگ و میر مادران (MMR) مخرج کسر کدام مورد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال/پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال/ پزشکی اسفند ۹۵- مشترک کشوری / پزشکی شهریور ۹۳- قطب دانشگاه شهید بهشتی / پزشکی اسفند ۹۳ - قطب تهران/ دندان پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 تعداد موالید زنده

گزینه 2 تعداد کل تولدها

گزینه 3 متوسط جمعیت یک سال

گزینه 4 تعداد زنان در سنین باروری

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

کدامیک میزان باروری کلی (Total fertility Rate) را نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 تعداد کودکانی که زنان ۴۴-۱۵ ساله به دنیا آورده‌اند.

گزینه 2 تعداد کودکانی که زنان یک گروه سنی خاص به دنیا آورده‌اند.

گزینه 3 (مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی $\times 5$) تقسیم بر ۱۰۰۰

گزینه 4 میزان باروری عمومی $\times 1000$

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

میزان مرگ و میر شیرخواران (IMR) چه تعریفی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

الف)
$$\frac{\text{تعداد مرگ کودکان زیر ۲۸ روز در مدت معین}}{n_{۱۰۰} \times \text{تعداد موالید زنده در همان مدت}}$$

ب)
$$\frac{\text{تعداد مرگ کودکان زیر ۱ سال در مدت معین}}{n_{۱۰۰} \times \text{تعداد موالید زنده در همان مدت}}$$

ج)
$$\frac{\text{تعداد مرگ کودکان زیر ۲۸ روز در مدت معین}}{n_{۱۰۰} \times \text{تعداد مرگ جمعیت در همان مدت}}$$

د)
$$\frac{\text{تعداد مرگ کودکان زیر ۱ سال در مدت معین}}{n_{۱۰۰} \times \text{تعداد مرگ جمعیت در همان مدت}}$$

نمایش پاسخ

ب

سوال 13

در مورد مخرج کسر میزان باروری عمومی (general fertility rate) کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 متوسط جمعیت همان سال

گزینه 2 متوسط جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۴ سال در همان سال

گزینه 3 متوسط جمعیت زنان همان سال

گزینه 4 متوسط جمعیت زنان شوهردار همان سال

نمایش پاسخ

ب

سوال 14

در شهرستانی با جمعیت ۶۰ هزار نفر سالانه ۱۲۰۰ تولد زنده رخ می‌دهد. تعداد زنان در سنین باروری ۱۰ هزار نفر است که ۶۰% آن‌ها شوهردار هستند. با توجه به اطلاعات فوق میزان باروری عمومی (GFR) چند در هزار است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ۱۲

گزینه 2 ۱۲۰

گزینه 3 ۲۰

گزینه 4 ۲۰۰

نمایش پاسخ

ب

سوال 15

کدامیک از گزینه‌های زیر میزان باروری عمومی (General fertility) را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

الف) میزان مرگ خام — میزان تولد خام

ب)
$$\frac{\text{تعداد موالید طی مدت معین (معمولا همان سال)}}{n_{۱۰۰} \times \text{متوسط جمعیت همان سال}}$$

ج)
$$\frac{\text{مجموع میزان های باروری اختصاصی سنی ۵X}}{۱۰۰۰}$$

د)
$$\frac{\text{تعداد موالید طی مدت معین}}{n_{۱۰۰} \times \text{متوسط جمعیت زنان ۱۵—۴۴ سال در همان مدت معین}}$$

نمایش پاسخ

د

سوال 16

به دنبال سرشماری در سال ۹۰ در یک شهر، اعداد زیر به دست آمد:

(تعداد کل جمعیت ۲۵۰ هزار نفر)، (۲۰% جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ سال)، (۳۰% زنان متأهل در سنین باروری)، (تعداد تولد زنده ۲۵۰۰ مورد)

کدامیک از اعداد زیر میزان باروری عمومی را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ۵%

گزینه 2 ۵۰%

گزینه 3 ۱۶%

گزینه 4 ۱/۶%

نمایش پاسخ

الف

سوال 17

در منطقه‌ای طی یک سال از ۱۰۰۰بارداری، ۹۰۰ نوزاد متولد شده و ۱۰۰ مورد مرگ جنینی بعد از ۲۸ هفته بارداری رخ داده است. اگر ۱۷۰ مورد مرگ نوزاد در هفته‌ی اول تولد داشته باشیم، میزان مرگ حول ولادت (Perinatal Mortality Rate) طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی چند در هزار است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 ۳۰

گزینه 2 ۲۷۰

گزینه 3 ۳۰۰

نمایش پاسخ

ج

سوال 18

در کشوری ۷۰ میلیونی، اگر در سال ۱۳۸۶ حدود ۱/۵ میلیون نوزاد به دنیا آمده و بالغ بر ۴۵ هزار کودک زیر یک سال در همان سال فوت نمایند، میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال (IMR) چقدر بوده است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ۳۰۰ در هزار تولد زنده

گزینه 2 ۱۸۰ در هزار تولد زنده

گزینه 3 ۹۰ در هزار تولد زنده

گزینه 4 ۳۰ در هزار تولد زنده

نمایش پاسخ

د

سوال 19

در کدام گزینه‌ی زیر، مخرج کسر شاخص با دیگر شاخص‌ها متفاوت است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 میزان مرگ شیرخواران

گزینه 2 میزان مرگ مادران

گزینه 3 میزان مرگ نوزادان

گزینه 4 میزان مرگ خام کودکان

نمایش پاسخ

د

سوال 20

میزان باروری کلی (TFR) ایران حدود ۱/۹ است. مفهوم این عبارت چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 هر زن ایرانی در طول دوران باروری خود ۱/۹ نوزاد زنده به دنیا می‌آورد.

گزینه 2 هر زن همسردار ایرانی در طول دوران باروری خود ۱/۹ نوزاد زنده به دنیا می‌آورد.

گزینه 3 به طور متوسط هر خانواده‌ی ایرانی در حال حاضر ۱/۹ فرزند دارند.

گزینه 4 هر زوج ایرانی در طول دوران زندگی خود ۱/۹ نوزاد زنده به دنیا می‌آورند.

نمایش پاسخ

الف

سوال 21

در جمعیت یک شهرستان ۴۲۰۰۰ نفری مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی ۴۲۰ (ASFR) به دست آمده است. میزان باروری کلی (TFR) در این شهرستان چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 ۴/۲

گزینه 2 ۲/۲

گزینه 3 ۱

گزینه 4 ۲/۱

نمایش پاسخ

د

سوال 22

کدامیک از مقادیر زیر می‌تواند نشان دهنده‌ی شاخص TFR (Total Fertility Rate) باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 ۵۰

گزینه 2 ۵۰۰۰

گزینه 3 ۵۰۰

گزینه 4 ۵

نمایش پاسخ

د

سوال 23

میزان باروری کلی (Total Fertility Rate) چه مفهومی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 همان نرخ رشد جمعیت است.

گزینه 2 متوسط تعداد کودکان به ازای هر هزار زن در سنین باروری است.

گزینه 3 تعداد زنانی که مادران آینده را تشکیل می‌دهند.

گزینه 4 تعداد کودکان یک زن در طول دوره‌ی بارداری است.

نمایش پاسخ

د

سوال 24

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد میزان باروری عمومی صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 متوسط تعداد نوزادان به دنیا آمده در کل جمعیت

گزینه 2 تعداد سالانه‌ی تولد زنده در یک جمعیت معین به ازای کل جمعیت وسط سال در هر هزار نفر

گزینه 3 متوسط تعداد نوزادان زنده‌ی به دنیا آمده از زنان یک جامعه در دوران باروری

گزینه 4 تعداد سالانه تولدهای زنده در یک جمعیت معین به ازای جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در هر هزار نفر

نمایش پاسخ

د

سوال 25

کدامیک از شاخص‌های زیر بیانگر مناسب‌تری از وضعیت مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران/پزشکی شهریور ۹۳ قطب دانشگاه آزاد/ پزشکی اسفند۹۶ _ مشترک کشوری)

گزینه 1 میزان مرده‌زایی

گزینه 2 میزان مرگ نوزادان

گزینه 3 میزان مرگ حول ولادت

گزینه 4 میزان مرگ مادران

نمایش پاسخ

ج

سوال 26

در یک خانواده‌ی ۶ نفری که پدر و مادر در برابر بیماری آبله‌مرغان ایمن هستند، یکی از فرزندان مبتلا به آبله‌مرغان شده و ظرف مدت دو هفته‌ی بعد دو کودک دیگر خانواده نیز مبتلا می‌شوند. میزان حمله‌ی ثانویه چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان/پزشکی اسفند ۹۴ _ قطب اصفهان)

گزینه 1 ۳۳

گزینه 2 ۵۰

گزینه 3 ۶۶

گزینه 4 ۷۵

نمایش پاسخ

ج

سوال 27

در منطقه‌ای در سال ۱۳۸۴، ۱۰۰۰ نوزاد زنده به دنیا آمده است، اگر در همین سال تعداد نوزادان مرده به دنیا آمده ۱۰ و تعداد مرگ در هفته‌ی اول ۱۵ و تعداد مرگ نوزادان ۲۰ باشد، میزان مرگ حول تولد (Perinatal Mortality Rate) چند در هزار است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 ۳۰

گزینه 2 ۲۵

گزینه 3 ۳۵

گزینه 4 ۴۵

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

در یک جامعه‌ی ۱۰۰ هزار نفری، ۵۰ نفر در طول یک سال فوت نمودند، ۲۰ نفر در یک سال مبتلا به بیماری «الف» شدند و ۱۸ نفر از مبتلایان به بیماری «الف» در این مدت فوت شده‌اند، میزان کشندگی بیماری «الف» چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 ۲۰/۱۰۰۰۰۰

گزینه 2 ۱۸۰/۱۰۰۰۰۰۰

گزینه 3 ۱۸/۲۰

گزینه 4 ۱۸/۵۰

نمایش پاسخ

ج

سوال 29

در بیش‌تر کشورهای دنیا، نسبت جنسی در هنگام تولد چگونه است؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 نسبت پسرزایی و نسبت دخترزایی اغلب کاملاً برابر است.

گزینه 2 نسبت دخترزایی اغلب اندکی بیش‌تر از نسبت پسرزایی است.

گزینه 3 نسبت پسرزایی اغلب اندکی بیش‌تر از نسبت دخترزایی است.

گزینه 4 هیچ الگوی غالبی در مورد نسبت جنسی مشاهده نشده است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 30

میزان کشندگی بیماری A در جامعه‌ای ۱۰ درصد است، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 ۱۰ نفر از ۱۰۰ نفر افراد جامعه فوت شده‌اند.

گزینه 2 ۱۰نفر از ۱۰۰ نفر افراد عفونت یافته فوت شده‌اند.

گزینه 3 ۱۰ نفر از ۱۰۰ نفر در معرض خطر فوت شده‌اند.

گزینه 4 ۱۰ نفر از ۱۰۰ نفر بیمار فوت شده‌اند.

نمایش پاسخ

د

سوال 31

کدام شاخص در تعیین پیش‌آگهی یک بیماری کاربرد دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 میزان مرگ و میر اختصاصی علتی

گزینه 2 میرایی تناسبی

گزینه 3 نسبت میرایی استاندارد شده

گزینه 4 میزان کشندگی

نمایش پاسخ

د

سوال 32

نسبت بیماران فوت شده به کل مراجعین به یک علت خاص در بیمارستان کدام شاخص است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 بروز مرگ

گزینه 2 میزان مرگ

گزینه 3 نسبت مرگ

گزینه 4 میزان کشندگی

نمایش پاسخ

د

سوال 33

در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت تا آخر سال ۱۳۹۲، بیست هزار مرگ رخ داده است. از این تعداد دویست مورد مربوط به دو هزار نفر مبتلا به سرطان دهانه‌ی رحم در آن سال بوده است. میزان مرگ اختصاصی علتی ناشی از سرطان دهانه‌ی رحم و میزان کشندگی این بیماری به ترتیب عبارتند از: (پزشکی شهریور و اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 ده درصد و ده درصد

گزینه 2 ده در هزار و ده در هزار

گزینه 3 دو درصد و صد در هزار

گزینه 4 یک درصد و ده درصد

نمایش پاسخ

د

سوال 34

در یک جمعیت ۲۰۰۰۰۰ نفری، در اپیدمی وبا ۳۰۰۰ نفر مبتلا شدند. از میان مبتلایان ۶۰ نفر در بیمارستان بستری و ۳۰ نفر فوت کرده‌اند. میزان کشندگی این بیماری چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 ۵۰

گزینه 2 ۲۰

گزینه 3 ۱۰

گزینه 4 ۷۵

نمایش پاسخ

ج هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ عدد ۱ است.

سوال 35

همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص شاخص کشندگی بیماری صحیح می‌باشند، بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری شدت بیماری محسوب می‌شود.

گزینه 2 مخرج کسر آن شامل تمامی افرادی است که در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری هستند.

گزینه 3 برای بیان پیش‌آگهی بیماری می‌توان از این شاخص استفاده نمود.

گزینه 4 هرچه درمان یک بیماری بهتر شود انتظار می‌رود که کشندگی کاهش یابد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 36

در محاسبه‌ی میزان کشندگی بیماری‌های در یک منطقه، مخرج کسر چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان/پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 کل مبتلایان به هاری

گزینه 2 جمعیت وسط سال

گزینه 3 جمعیت در معرض خطر

گزینه 4 تعداد کل مرگ‌ها در منطقه

نمایش پاسخ

الف

سوال 37

در یک اپیدمی «وبا» در یک روستا با جمعیت ۱۰۰۰ نفر، ۲۰ نفر مبتلا شده‌اند و از میان آن‌ها ۵ نفر فوت کردند. میزان کشندگی این بیماری چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ۱٪

گزینه 2 ۲/۵٪

گزینه 3 ۵٪

گزینه 4 ۲۵٪

نمایش پاسخ

د

سوال 38

در یک اپیدمی «وبا» در یک جمعیت ۳۰۰۰ نفری، ۳۰ نفر مبتلا شدند از میان مبتلا شدگان ۶ نفر فوت کردند. میزان کشندگی case fatality rate این بیماری چه میزان است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ۲۰٪

گزینه 2 ۳۳٪

گزینه 3 ۱ در هزار

گزینه 4 ۳ در هزار

نمایش پاسخ

الف

سوال 39

میزان کشندگی (Fatality rate) عبارتست از: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 تعداد تلفات ناشی از یک بیماری

گزینه 2 تعداد تلفات ناشی از یک بیماری در زمان خاص

گزینه 3 تعداد تلفات ناشی از یک بیماری به تعداد کل افراد مبتلا

گزینه 4 تعداد تلفات ناشی از یک بیماری در زمان و مکان خاص

نمایش پاسخ

ج

سوال 40

کدامیک از شاخص‌های زیر برای بیان شدت یک بیماری حاد کوتاه‌مدت مناسب است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 میزان کشندگی

گزینه 2 میزان بقای ۵ ساله

گزینه 3 میزان مرگ اختصاصی

گزینه 4 میزان مرگ استاندارد شده

نمایش پاسخ

الف

سوال 41

درباره‌ی نسبت کشندگی بیماری Case Fatality Rate کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران/دندانپزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران))

گزینه 1 تعداد کل مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص تقسیم بر تعداد کل جمعیت در معرض خطر آن بیماری در میانه سال

گزینه 2 تعداد کل مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص تقسیم بر کل جمعیت در میانه سال

گزینه 3 تعداد کل مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص در مدت زمان معین تقسیم بر تعداد کل مبتلایان به آن بیماری در همان مدت زمان

گزینه 4 تعداد کل مرگ‌ها به علت یک بیماری خاص تقسیم بر کل مرگ‌ها به هر دلیل در طول همان سال

نمایش پاسخ

ج

سوال 42

در یکی از شهرهای کشور با یک میلیون نفر جمعیت تا آخر سال ۱۳۹۰، تعداد ده هزار مرگ رخ داده است. از این تعداد دو هزار مورد مربوط به ۲۰ هزار نفر مبتلا به آنفولانزای فصلی بوده است. میزان مرگ اختصاصی علتی ناشی از آنفولانزا و میزان کشندگی بیماری به ترتیب برابر است با: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 ۲ هزار- ۱۰۰ درصد هزار

گزینه 2 ۲۰ درصد- ۱۰ درصد

گزینه 3 ۱۰ در هزار- ۱۰ در هزار

گزینه 4 ۲ درصد- ۱۰ درصد

نمایش پاسخ

ب

سوال 43

کدام میزان عبارت روبرو را بهتر توصیف می‌کنید؟ «۲۵% مبتلایان به مننژیت منگوکوکی می‌میرند» (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 کشندگی

گزینه 2 حمله‌ی ثانویه

گزینه 3 مرگ نسبتي

گزینه 4 مرگ خام

نمایش پاسخ

الف

سوال 44

میزان باروری عمومی در جمعیتی ۱۰۰ هزار نفره که ۲۰٪ آن را خانم‌های سنين باروری تشکیل می‌دهند و تعداد مواليد سالانه‌ی آن ۲۰۰۰ تولد است چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ۲۰٪

گزینه 2 ۱٪

گزینه 3 ۱۰٪

گزینه 4 ۲٪

نمایش پاسخ

ج

سوال 45

در جمعیتی معادل ۳۶ هزار نفر در یک سال، ۳۰۰۰ (سه هزار) تولد زنده رخ می‌دهد، در همان سال ۳۰ بچه‌ی زیر یک سال فوت می‌کنند که ۹ نفر آن‌ها زیر ۲۸ روز سن داشتند. میزان مرگ شیرخواران (IMR) چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ۸ در هزار

گزینه 2 ۱۰ در هزار

گزینه 3 ۱ در هزار

گزینه 4 ۸ در ۱۰ هزار

نمایش پاسخ

ب

سوال 46

در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت در سال ۱۲۹۲ صد هزار مرگ رخ داده است. از این تعداد دویست مورد مربوط به دو هزار نفر مبتلا به سرطان دهانه‌ی رحم در آن سال بوده است. میزان کشندگی سرطان دهانه‌ی رحم چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ده درصد

گزینه 2 دو درصد

گزینه 3 دو دهم درصد

گزینه 4 یک درصد

نمایش پاسخ

الف

سوال 47

درصد افراد فوت شده در بین تمام افراد مبتلا به یک بیماری در یک مدت زمان مشخص را چه می‌نامند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 میزان کشندگی (case fatality rate)

گزینه 2 میزان میرایی بیماری (case mortality rate)

گزینه 3 میزان شیوع مرگ (prevalence mortality rate)

گزینه 4 میزان بروز مرگ (incidence mortality rat)

نمایش پاسخ

الف

سوال 48

تعداد تولدهای زنده در یک سال معین بر جمعیت ۱۵ تا ۲۲ سال همان سال ضربدر هزار بیانگر کدام شاخص است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 میزان تولد خام

گزینه 2 میزان باروری ویژه‌ی سنی

گزینه 3 میزان باروری عمومی

گزینه 4 میزان باروری کل

نمایش پاسخ

ب

سوال 49

کدامیک از موارد زیر در خصوص اندازه‌گیری شاخص میزان حمله‌ی ثانویه صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 این شاخص می‌تواند نقش نسبی عوامل محیطی را در بیماری‌های غیر واگیر بررسی کند.

گزینه 2 این شاخص می‌تواند انتشار بیماری از شخص به شخص دیگر را در اپیدمی‌ها مشخص کند.

گزینه 3 این شاخص می‌تواند برای بررسی افراد یک خانواده در معرض تماس با مورد شاخص مورد استفاده قرار گیرد.

گزینه 4 این شاخص نمی‌تواند نقش عوامل ژنتیکی را در بیماری‌های غیر واگیر بررسی کند.

نمایش پاسخ

د

سوال 50

در یک جامعه تعداد موارد مرگ در کودکان زیر یک ماه ۱۲ نفر، موارد مرگ در کودکان زیر یک سال ۲۰ نفر و تعداد موارد مرگ در کودکان زیر پنج سال ۲۴ نفر است.

براساس این اطلاعات کدام شاخص مرگ و میر زیر قابل محاسبه است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 Infant Mortality Rate

گزینه 2 Neonatal Mortality Rate

گزینه 3 Perinatal Mortality Rate

گزینه 4 Post neonatal Mortality Rate

نمایش پاسخ

د

سوال 51

ویرولانسی یا شدت بیماری با کدامیک از شاخص‌های زیر مشخص می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 میزان کشندگی بیماری

گزینه 2 میزان مرگ اختصاصی بیماری

گزینه 3 میزان مرگ نسبی بیماری

گزینه 4 میزان اختصاصی بودجه به بیماری

نمایش پاسخ

الف

سوال 52

در شهرستان الف با جمعیت چهارصد هزار نفر سالانه ۴۰ نفر از بیماری سرطان ریه فوت می‌شوند. میزان مرگ و میر سالیانه ناشی از بیماری فوق چقدر است؟ (پزشکی

اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 ۵ در یکصد هزار نفر

گزینه 2 ۴ در یکصد هزار نفر

گزینه 3 ۸ در یکصد هزار نفر

گزینه 4 ۱۰ در یکصد هزار نفر

نمایش پاسخ

د

سوال 53

در یک مهدکودک ۴۵ کودک زیر ۵ سال نگهداری می‌شود که ۳۰ نفر آن‌ها علیه بیماری سرخک ایمن می‌باشند به تازگی یک نفر از آن‌ها به سرخک مبتلا شده است و پس از وی ۷ نفر دیگر نیز دچار سرخک شدند. میزان حمله‌ی ثانویه (SAR) بیماری سرخک در این مهدکودک چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 ۱۴%

گزینه 2 ۴۶/۶%

گزینه 3 ۵۰%

گزینه 4 ۶۴%

نمایش پاسخ

ج

سوال 54

از بین رفتن ۵۰ نفر دانش‌آموزان کلاس اول دبستان که هیچ سابقه‌ی ابتلا به آبله‌مرغان نداشته‌اند ابتدا ۴ نفر و سپس در طی دو هفته تعداد ۱۶ نفر دیگر به این بیماری مبتلا شدند. میزان حمله‌ی ثانویه‌ی آبله‌مرغان در این دبستان چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 ۵۰/۴

گزینه 2 ۴۶/۱۶

گزینه 3 ۴۶/۴

گزینه 4 ۵۰/۱۶

نمایش پاسخ

ب

سوال 54

میزان مرگ و میر در کدام گروه نشانگر خوبی برای کیفیت مداخلات بهداشتی- درمانی است؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 مادران

گزینه 2 شیرخواران

گزینه 3 کودکان قبل از مدرسه

گزینه 4 اواخر دوره‌ی جنینی

نمایش پاسخ

ب

سوال 55

در جریان همه‌گیری ابولا یک نفر از اعضای یک خانواده‌ی ۱۱ نفره به طور همزمان موجب ابتلای ۲ نفر دیگر از آن‌ها شده است، میزان حمله‌ی ثانویه چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۱۸

گزینه 2 ۲۰

گزینه 3 ۲۷

گزینه 4 ۳۰

نمایش پاسخ

ب

سوال 56

خانمی به علت خون‌ریزی دستگاه ژنیتال در هفته‌ی ۱۲ حاملگی فوت نموده است. این واقعه در کدامیک از میزان‌های میرایی زیر باید محسوب شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 حول زایمان

گزینه 2 مستقیم مامایی

گزینه 3 اختصاصی زنان در سن باروری

گزینه 4 غیر مستقیم مامایی

نمایش پاسخ

ب

سوال 57

Late maternal mortality به کدام مورد زیر اطلاق می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 مرگ و میر مادران به دلیل بارداری یا عوارض ناشی از آن تا پایان بارداری

گزینه 2 مرگ و میر مادران به دلیل بارداری یا عوارض ناشی از آن تا ۶ هفته پس از زایمان

گزینه 3 مرگ و میر مادران به دلیل بارداری یا عوارض ناشی از آن تا یک سال پس از زایمان

گزینه 4 مرگ و میر مادران به دلیل بارداری یا عوارض ناشی از آن تا دو سال پس از زایمان

نمایش پاسخ

«متوسط تعداد نوزادان زنده به دنیا آمده از زنان یک جامعه در طی دوران بارداری» نشانگر کدامیک از شاخص‌های باروری ذیل است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 میزان باروری کلی

گزینه 2 میزان تولد خام

گزینه 3 میزان باروری عمومی

گزینه 4 میزان باروری نکاحی

نمایش پاسخ

الف

در جمعیت‌شناسی نسبت جنسی ۱/۰۲۵ چگونه تفسیر می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 ۱۰۲ زن در مقابل ۱۰۰ مرد

گزینه 2 ۱۰۲۵ زن در مقابل ۱۰۰۰ مرد

گزینه 3 ۱۰۲۵ مرد در مقابل ۱۰۰۰ زن

گزینه 4 ۱۰۰۰ مرد در مقابل ۱۰۲ زن

نمایش پاسخ

ج

متوسط تعداد فرزندی که یک زن در طول دوره باروری خود به دنیا می‌آورد با کدام شاخص مشخص می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۶ _قطب مشهد)

گزینه 1 باروری واقعی

گزینه 2 باروری عمومی

گزینه 3 تولد خام

گزینه 4 باروری کلی

نمایش پاسخ

د

در یک جمعیت ۵۰ هزار نفره، مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی، برابر با ۵۰ است. میزان باروری کلی چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 ۲/۵

گزینه 2 ۱

گزینه 3 ۲/۱

گزینه 4 ۱/۰.

نمایش پاسخ

الف

در منطقه‌ای تعداد موالید زنده در یک سال ۷۰۰۰ نفر و موارد مرگ به ترتیب در ۲۴ ساعت اول زندگی ۷۰ مورد، در عرض ۴ هفته‌ی اول تولد ۱۰۰ مورد و تا یک سالگی ۲۱۰ مورد گزارش شده است. تمام میزان‌های زیر را می‌توان محاسبه کرد بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- مشترک کشوری)

گزینه 1 مرگ حول زایمان (P.M.R)

گزینه 2 مرگ نوزادان (N.M.R)

گزینه 3 مرگ پس از نوزادی (P.N.M.R)

گزینه 4 مرگ شیرخواران (I.M.R)

نمایش پاسخ

الف

جمعیت منطقه‌ای ۱۰۰ هزار نفر است. تعداد زنان در سنین باروری در این جمعیت ۲۵۰۰ نفر است. در یک سال ۵۰۰ تولد زنده در این جمعیت رخ می‌دهد. در همان سال ۲۵۰ مورد مرگ به تمام علل اتفاق می‌افتد که ۱۰ مورد آن‌ها مرگ مادران به دلیل بارداری و زایمان است. جمله‌ی صحیح کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 به ازای هر ۱۰۰ زن در سن باروری ۲۰ تولد زنده رخ می‌دهد

گزینه 2 هر زن به طور متوسط در طول باروری خود ۲ فرزند به دنیا می‌آورد

گزینه 3 میزان مرگ مادران MMR یک در هزار است

گزینه 4 میزان رشد جمعیت ۲/۵ درصد است

نمایش پاسخ

الف

سوال 65

نسبت جنسی در هنگام تولد تقریباً در بیش‌تر کشورهای جهان در حدود چه عددی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 ۱۰۰ پسر در ازای ۱۰۰ دختر

گزینه 2 ۱۰۲ پسر در ازای ۱۰۰ دختر

گزینه 3 ۱۰۵ پسر در ازای ۱۰۰ دختر

گزینه 4 ۹۹ پسر در ازای ۱۰۰ دختر

نمایش پاسخ

ج

سوال 66

میزان مرگ و میر نوزادان کدامیک از موارد زیر است؟ Neonatal Mortality Rate (NMR) (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 مرگ شیرخواران کم‌تر از یک هفته برای هر هزار تولد زنده در همان دوره

گزینه 2 مرگ شیرخواران کم‌تر از یک ماه برای هر هزار تولد زنده در همان دوره

گزینه 3 مرگ شیرخواران کم‌تر از یک هفته برای هر هزار مرگ و میر جنینی در همان دوره

گزینه 4 مرگ و میر شیرخواران کم‌تر از یک ماه برای هر هزار مرگ و میر جنینی در همان دوره

نمایش پاسخ

ب

سوال 67

در یک اپیدمی مسمومیت غذایی، ۳۰% افراد به علت خوردن سالاد بیمار شده‌اند این عدد نشانه‌ی چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 میزان حمله

گزینه 2 میزان شیوع

گزینه 3 خطر نسبی

گزینه 4 نسبت شانس

نمایش پاسخ

الف

سوال 68

در جمعیت یک شهرستان ۱۰۰ هزار نفری مجموع میزان‌های باروری اختصاصی سنی ۴۲۰ به دست آمده است. میزان باروری کلی TFR در این شهرستان چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 ۱

گزینه 2 ۱/۲

گزینه 3 ۲/۱

گزینه 4 ۳

نمایش پاسخ

ج

سوال 69

تعداد تولدهای زنده در یک سال معین تقسیم بر جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله همان سال ضربدر هزار بیانگر کدام شاخص است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 میزان باروری خام

گزینه 2 میزان تولد خام

گزینه 3 میزان باروری عمومی

گزینه 4 میزان باروری ویژه‌ی سنی

نمایش پاسخ

ج

سوال 70

کدامیک از موارد زیر به «شدت بیماری» اشاره دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 میزان حمله‌ی ثانویه

گزینه 2 میزان بروز

گزینه 3 میزان شیوع

گزینه 4 میزان کشندگی

نمایش پاسخ

د

سوال 71

در یک منطقه با ۳ میلیون نفر جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۰، ۳۰ هزار مرگ رخ داده است. از این تعداد ۶۰۰۰ مورد مربوط به ۶۰ هزار نفر مبتلا به آنفولانزا بوده است. میزان مرگ اختصاصی علتی ناشی از آنفولانزا و میزان کشندگی بیماری به ترتیب عبارتند از: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 ۲ درصد و ۱۰ درصد

گزینه 2 ۱۰ در هزار و ۱۰ در هزار

گزینه 3 ۲ در هزار و ۱۰۰ در هزار

گزینه 4 ۲۰۰ در هزار و ۱۰ درصد

نمایش پاسخ

د

سوال 72

در مورد تولدهای دختر و پسر کدامیک درست است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 این نسبت قاعده‌ی خاصی ندارد و براساس شانس است

گزینه 2 در هنگام تولد در بیش‌تر کشورهای جهان در حدود ۱۰۵ مولود دختر در مقابل ۱۰۰ مولود پسر است

گزینه 3 در هنگام تولد در بیش‌تر کشورهای جهان در حدود ۱۰۵ مولود پسر در مقابل ۱۰۰ مولود دختر است

گزینه 4 در هنگام تولد در بیش‌تر کشورهای جهان تعداد موالید دختر و پسر برابر است

نمایش پاسخ

ج

سوال 73

در سال ۱۳۹۴ در شهر تبریز تعداد ۲۶۰ پسر و ۲۴۵ دختر متولد شده است. نسبت جنسی در زمان تولد در شهر تبریز چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ۱۰۶

گزینه 2 ۹۴

گزینه 3 ۴۸

گزینه 4 ۵۱

نمایش پاسخ

الف

سوال 74

از تقسیم تعداد مردان یک جمعیت بر تعداد زنان همان جمعیت کدام نسبت جمعیت‌شناسی به دست می‌آید؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 تراکم حسابی

گزینه 2 توزیع جغرافیایی

گزینه 3 نسبت جنسی

گزینه 4 نسبت وابستگی

نمایش پاسخ

ج

سوال 75

نسبت جنسی در هنگام تولد تقریباً در بیش‌تر کشورهای دنیا چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 حدود ۱۰۵ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر است.

گزینه 2 حدود ۱۰۰ پسر در مقابل ۱۰۵ دختر است.

گزینه 3 حدود ۱۰۱ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر است.

گزینه 4 حدود ۱۰۱ دختر در مقابل ۱۰۰ پسر است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 76

در یکی از مدارس تعداد ۲۰۱ کودک حضور دارند که به دنبال ابتلا یکی از کودکان به آنفولانزای انسانی تعداد ۵۰ نفر از ۱۰۰ کودک غیر وابسته در عرض کم‌تر از یک هفته دچار این بیماری شده‌اند. میزان حمله‌ی ثانویه بیماری چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۱۵

گزینه 2 ۲۵

گزینه 3 ۷۵

نمایش پاسخ

ب

سوال 77

در یک مهدکودک با ۸۱ کودک، ۳ هفته پس از ابتلای یکی از کودکان به آبله‌مرغان، ۲۰ کودک دیگر مبتلا به آبله‌مرغان شدند. والدین ۲۰ کودک نیز سابقه‌ی قبلی ابتلای فرزند خود به آبله‌مرغان را ذکر نمودند. میزان حمله‌ی ثانویه این بیماری در مهدکودک چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 ۲۵

گزینه 2 ۳۳

گزینه 3 ۴۰

گزینه 4 ۵۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 78

وقتی می‌گوئیم «از هر ۱۰۰۰ تولد زنده ۹۸۷ نفر تا ۲۸ روزگی زنده می‌مانند» کدام گزینه شاخص مربوطه را بهتر نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 $NMR=987/1000$

گزینه 2 $NMR=13/1000$

گزینه 3 $IMR=987/1000$

گزینه 4 $IMR=13/1000$

نمایش پاسخ

ب

سوال 79

میزان مرگ شیرخواران IMR چه نوع میزانی محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 یک میزان خام است

گزینه 2 یک میزان اختصاصی سنی است

گزینه 3 یک میزان اختصاصی علتی است

گزینه 4 یک میزان اختصاصی سنی- علتی است

نمایش پاسخ

ب

سوال 80

در خصوص شاخص مرگ و میر مادران در ایران کدام مورد صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 جمع مرگ دوران بارداری و حین زایمان است

گزینه 2 این شاخص در شهر بالاتر از روستا است

گزینه 3 مخرج کسر در این شاخص تعداد تولدهای زنده است

گزینه 4 در طول چند دهه تغییری در این شاخص ایجاد نشده است

نمایش پاسخ

ج

سوال 81

میزان «مرگ و میر نوزادی» عبارتست از تعداد مرگ و میر: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 در هفته‌ی اول زندگی بر تعداد متولدين زنده همان سال

گزینه 2 در ۴ هفته‌ی اول زندگی بر تعداد متولدين زنده همان سال

گزینه 3 در هفته‌ی اول زندگی بر تعداد کل متولدين همان سال

گزینه 4 در سال اول زندگی بر تعداد متولدين زنده همان سال

نمایش پاسخ

ب

سوال 82

کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های عفونت‌زایی (infectivity) یک بیماری به شمار می‌رود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 کشندگی بیماری case fatality rate

گزینه 2 دوران کمون secondary attack rate

گزینه 3 میزان حمله‌ی ثانویه pathogenicity

گزینه 4 بیماری‌زایی بیماری incubation period

سوال 83

کدامیک از موارد زیر در خصوص شاخص‌های باروری صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 میزان باروری عمومی، تعداد موالید زنده در زنان است.

گزینه 2 میزان باروری کلی، یک زن در تمام طول دوران بارداری خود چند فرزند به دنیا می‌آورد.

گزینه 3 میزان باروری در سال‌های بعد از انقلاب تغییری نیافته است.

گزینه 4 میزان باروری کلی حاصل جمع میزان باروری اختصاصی نسبی است.

سوال 84

در یک جمعیت ۳۰۰۰۰۰ نفری وقایع حیاتی زیر ثبت شده است:

تعداد کل متولدین: ۵/۰ درصد از کل جمعیت

تعداد مرگ ۱ تا ۴ سال: ۲ درصد از مرگ و میر کل

تعداد کل مرگ و میر: ۴/۰ درصد از کل جمعیت

تعداد مرگ زیر ۱ سال: ۲ درصد از مرگ و میر کل

تعداد کل مرگ نوزادی: ۱ درصد از مرگ و میر کل

مطلوب است. میزان مرگ و میر زیر ۵ سال در هر ۱۰۰۰ نفر. (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهرشتی)

گزینه 1 ۳۲

گزینه 2 ۳۰

گزینه 3 ۳۴

گزینه 4 ۳۶

سوال 85

وقوع رویدادی مشخص (بیماری یا مرگ) در یک جمعیت طی یک دوره‌ی زمانی معین که نشان دهنده‌ی خطر رویداد است توسط چه شاخصی اندازه‌گیری می‌شود؟
(دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 خطر یا Risk

گزینه 2 میزان یا Rate

گزینه 3 نسبت یا Ratio

گزینه 4 تناسب یا Proportion

سوال 86

جمعیت مشخص (defined population) کدامیک از موارد زیر را شامل نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 عموماً به عنوان صورت کسر در محاسبه‌ی میزان‌هاست

گزینه 2 ممکن است کل جمعیت یک منطقه‌ی جغرافیایی باشد

گزینه 3 عموماً گروه منتخب مخصوص مثل گروه سنی باشد

گزینه 4 ممکن است یک نمونه از کل جمعیت یک منطقه باشد

سوال 87

کدامیک از شاخص‌های زیر به میزان مرگ و میر کودکان کم‌تر از یک سال اطلاق می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 Neonatal Mortality Rate

گزینه 2 Infant Mortality Rate

گزینه 3 Perinatal Morbidity Rate

گزینه 4 Perinatal Mortality Rate

در یک جمعیت ۲۰۰۰ نفری ۴۰ نفر به بیماری «وبا» مبتلا شده‌اند و از میان مبتلایان ۱۰ نفر فوت کردند، میزان کشندگی این بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷-
قطب اهواز)

گزینه 1 ۱٪

گزینه 2 ۲/۵٪

گزینه 3 ۵٪

گزینه 4 ۲۵٪

نمایش پاسخ

د

در صورتی‌که «تعداد مرگ‌های ایجاد شده به علت یک بیماری به کل موارد همان بیماری» در نظر گرفته شود، کدامیک از شاخص‌های زیر حاصل می‌شود؟ (پزشکی
شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 میزان اختصاصی علتی مرگ

گزینه 2 نسبت تناسبی مرگ

گزینه 3 شدت بیماری

گزینه 4 میزان کشندگی

نمایش پاسخ

د

همه‌ی موارد زیر در خصوص میزان بقاء درست است، بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 از این میزان عمدتاً برای ارزیابی استانداردهای مربوط به روش‌های درمانی استفاده می‌شود

گزینه 2 زمان معمولاً از تاریخ تشخیص بیماری یا شروع درمان محاسبه می‌شود

گزینه 3 میزان بقاء عبارتست از تعداد بیماران زنده از یک بیماری پس از ۵ سال تقسیم بر تعداد کل بیماران تشخیص داده شده

گزینه 4 از این میزان برای سنجش خطر نسبی استفاده می‌شود

نمایش پاسخ

د. عدم پوشش در سبب سبز

چنانچه کلیه‌ی موارد مرگ از سرطان‌های گوارش در طول سال ۱۳۹۵ را در جمعیت استان آذربایجان غربی به مبتلایان آن بیماری‌ها در آن استان در آن سال تقسیم
کنیم، حاصل کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 میزان کشندگی بیمار

گزینه 2 میزان شیوع

گزینه 3 میزان وقوع

گزینه 4 میزان بروز

نمایش پاسخ

الف

در یک کشور آسیایی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد ۵۰ هزار مورد مرگ اتفاق افتاده است. از این تعداد ۳۰۰۰ مورد مرگ مربوط به ۳۶ هزار
نفر مبتلا به بیماری وبا بود. میزان میرایی اختصاصی علتی مرگ بیماری وبا در سال ۲۰۱۷ در این کشور را محاسبه نمایید. (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 یک در هزار نفر

گزینه 2 یک در ده هزار نفر

گزینه 3 ۸/۳ در هزار نفر

گزینه 4 ۶۰ در هزار نفر

$$\frac{50000}{36000} = 1.3888 \approx 1.39$$

نمایش پاسخ

ج

میزان مرگ در یک گروه از بیماران درمان شده ۱۵٪ و در گروه بدون درمان ۱۹٪ بود. چه تعداد بیمار باید درمان شود تا از یک مورد مرگ پیشگیری شود (number
needed to treat)؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 ۲۰

گزینه 2 ۱۰

گزینه 3 ۲۵

نمایش پاسخ

ج. اختلاف درمان با درمان نکردن چهار درصد عدد است. که همان یک عدد در ۲۵ بیمار است.

بجهد حیرت‌ا

سوال 94

عبارت ذیل بیانگر چه شاخصی است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

«متوسط تعداد نوزادان زنده به دنیا آمده از زنان یک جامعه در دوره‌ی باروری»

گزینه 1 میزان تولد خام

گزینه 2 میزان کل باروری

گزینه 3 میزان باروری عمومی

گزینه 4 میزان باوری اختصاصی

نمایش پاسخ

ج. میزان کل باروری برابر است با تعداد فرزندان یک زن در تمام طول دوران باروری و میزان تولد خام تعداد موالید در یک سال در متوسط جمعیت آن سال است.

سوال 95

میزان مرگ مادران (MMR) کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۵ قطب آزاد)

الف)	$\frac{\text{تعداد موارد مرگ مادران به علت عوارض بارداری و زایمان در مدت معین}}{\text{تعداد مادران باردار}}$
ب)	$\frac{\text{تعداد موارد مرگ مادران به علت عوارض زایمان در مدت معین}}{\text{تعداد موالید زنده}}$
ج)	$\frac{\text{تعداد موارد مرگ مادران به علت عوارض بارداری و زایمان در مدت معین}}{\text{تعداد موالید زنده}}$
د)	$\frac{\text{تعداد موارد مرگ مادران به علت عوارض بارداری در مدت معین}}{\text{تعداد مادران باردار}}$

نمایش پاسخ

ج / کسر مربوط به میزان مرگ مادران در گزینه‌ی ج مشاهده می‌شود.

سوال 96

تعداد مرگ کودکان زیر یک سال در یک منطقه ۱۰ نفر، تعداد جمعیت همان منطقه در همان سال ۱۰۰۰۰۰ نفر و تعداد متولدین زنده ۱۰۰۰ نفر است. میزان مرگ و میر

کودکان زیر یک سال کدام مورد است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 ۱۰ در صد هزار

گزینه 2 ۱۰ در هزار

گزینه 3 ۱ در هزار

گزینه 4 ۱ در صد هزار

نمایش پاسخ

ب / تعداد مرگ کودکان زیر یک سال برابر است با نسبت تعداد مرگ کودکان زیر یک سال به تعداد متولدین زنده در همان مدت که ۱۰/۱۰۰۰ می‌شود.

سوال 97

برای محاسبه‌ی شاخص سالیوان بایستی: (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 میزان‌های شیوع بیماری را از میزان‌های بروز کسر کرد.

گزینه 2 میزان‌های مرگ و میر را از میزان موالید کسر کرد.

گزینه 3 هزینه‌های عمده‌ی زندگی را از درآمد سرانه کسر کرد.

گزینه 4 مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی عملکرد را از امید به زندگی کسر نمود.

نمایش پاسخ

د / سالیوان شاخصی است که امید به زندگی بدون ناتوانی را نشان می‌دهد و برای محاسبه‌ی آن باید مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی عملکرد را از امید به زندگی

کسر نمود.

سوال 98

کدامیک از میزان‌های ابتلا، به تخمین خطر سرایت کنندگی یک بیماری عفونی حاد در جامعه کمک می‌کند؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 میزان بروز

گزینه 2 میزان حمله‌ی ثانویه

گزینه 3 میزان شیوع

گزینه 4 میزان مرگ

نمایش پاسخ

ب / میزان حمله‌ی ثانویه برابر است با نسبت تعداد موارد جدید بیماری پس از مواجهه با افراد بیمار به افراد در معرض خطر بیماری که به تخمین خطر سرایت کنندگی یک

بیماری عفونی حاد در جامعه کمک می‌کند.

سوال 99

در یک منطقه با ده میلیون نفر جمعیت تا آخر سال ۱۳۹۷، بیست هزار مرگ رخ داده است. از این تعداد دویست مورد مربوط به دو هزار نفر مبتلا به سرطان دهانه‌ی

رحم در آن سال بوده است. میزان کشندگی سرطان دهانه‌ی رحم چقدر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 یک درصد

گزینه 2 ده در هزار

گزینه 3 ده درصد

گزینه 4 دو در ده هزار

نمایش پاسخ

ج / میزان کشندگی برابر است با ۲۰۰/۲۰۰۰ که ده درصد می‌شود.

سوال 100

در یک جامعه‌ی ۱۰ هزار نفری، ۱۰ نفر در یک سال مبتلا به بیماری هاری شده‌اند، ۹ نفر از مبتلایان فوت کردند، میزان کشندگی بیماری چقدر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 ۹ درصد

گزینه 2 ۹۰ درصد

گزینه 3 ۸ درصد

گزینه 4 ۸۰ درصد

نمایش پاسخ

ب / میزان کشندگی برابر است با ۹/۱۰ که ۹۰ درصد می‌شود.

سوال 101

کدامیک از موارد زیر، دومین علت مرگ و میر در ایران است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 بیماری‌های قلبی عروقی

گزینه 2 بیماری‌های متابولیک

گزینه 3 سرطان‌ها

گزینه 4 سوانح و حوادث

نمایش پاسخ

د / سوانح و حوادث دومین علت و بیماری‌های قلبی عروقی اولین علت مرگ و میر در ایران است.

سوال 102

کدامیک از گزینه‌های زیر، شاخص سالیوان را مشخص می‌نماید؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 امید به زندگی در بدو تولد

گزینه 2 امید به زندگی در یک سالگی

گزینه 3 امید به زندگی بدون ناتوانی

گزینه 4 درجه‌ی رفاه درک شده توسط افراد

نمایش پاسخ

ج / سالیوان شاخصی است که امید به زندگی بدون ناتوانی را نشان می‌دهد.

سوال 103

در یک جمعیت، ۲۰ درصد از کل مرگ‌ها در مدت یک سال به علت بیماری‌های قلبی عروقی رخ داده است. این گزارش بیانگر کدام شاخص زیر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 میزان کشندگی (Case- fatality)

گزینه 2 میزان تناسبی (Proportionate mortality)

گزینه 3 میزان مرگ و میر سالیانه (Annual mortality rate)

گزینه 4 میزان مرگ خام (Crude mortality rate)

$$\text{Proportionate Mortality} = \frac{\text{مرگ خاص}}{\text{کل مرگ‌ها}}$$

نمایش پاسخ

ب / میزان تناسبی برابر است با اینکه چند درصد از کل مرگ‌ها در یک سال به علت یک بیماری خاص رخ داده است.

سوال 104

مخرج مناسب برای کسر ذیل کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

$$\frac{100 \times \text{مرگ از بیماریهای قلبی و عروقی در یکسال}}{\text{میرایی تناسبی برای بیماریهای قلبی و عروقی}}$$

گزینه 1 تعداد مبتلایان به بیماری‌های قلبی و عروقی در آن سال

گزینه 2 تعداد کل افراد جامعه در میانه‌ی سال

گزینه 3 تعداد کل مرگ‌ها در آن سال

گزینه 4 تعداد کل افراد جامعه در معرض خطر بیماری قلبی و عروقی

نمایش پاسخ

ج / میزان تناسبی برابر است با اینکه چند درصد از کل مرگ‌ها در یک سال به علت یک بیماری خاص رخ داده است.

سوال 105

جدول زیر داده‌های جمعیتی شهر الف را در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. با توجه به جدول، میزان مرگ شیرخواران برای آن سال به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟ (پزشکی

کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

infant

جمعیت کل	۱۰۵۳۵۳
تعداد موالید زنده	۲۰۰۰
جمعیت کودکان زیر یک سال	۵۰۰۰
جمعیت کودکان زیر دو سال	۱۲۰۰۰
تعداد مرگ زیر یک سال	۴۵۰
تعداد مرگ زیر دو سال	۷۰۰

گزینه ۱ ۲۲ در ۱۰۰۰

گزینه ۲ ۹ در ۱۰۰۰

گزینه ۳ ۳۵ در ۱۰۰۰

گزینه ۴ ۶ در ۱۰۰۰

نمایش پاسخ

الف / نسبت می‌شود ۴۵۰/۲۰۰۰۰ که جواب گزینه‌ی الف می‌شود.

سوال 106

کدام اصطلاح بیانگر تجربه‌ی ذهنی فقدان سلامتی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه ۱ disease

گزینه ۲ illness

گزینه ۳ sickness

گزینه ۴ disability

نمایش پاسخ

ب illness / بیانگر تجربه‌ی ذهنی فقدان سلامتی است و disease واژه‌ای برخلاف راحتی است.

سوال 107

میزان کشندگی مورد (بیماری) Case fatality rate جزء کدام نشانگرهای بهداشت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه ۱ نشانگرهای بیماری‌زایی Morbidity

گزینه ۲ نشانگرهای میرایی Mortality

گزینه ۳ نشانگرهای کیفیت زندگی

گزینه ۴ میزان‌های ناتوانی

نمایش پاسخ

الف. شاخص‌های بیماری‌زایی مربوط به میزان خطرناک بودن یه بیماری‌ان. شاخص‌های مرگ و میر اوانان که میزان مرگ و میر توی گروه‌های سنی یا جمعیتی رو بررسی می‌کنن.

سوال 108

آسان‌ترین راه برای برآورد بار بیماری در یک جامعه کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه ۱ تعیین میزان مرگ و میر کودکان

گزینه ۲ تعیین میزان امید به زندگی

گزینه ۳ تعیین میزان مرگ و میر از بیماری خاص

گزینه ۴ تعیین میزان مرگ و میر نسبی

نمایش پاسخ

ج. بار بیماری رو با دالی حساب می‌کنیم. مجموع سال‌های از دست رفته به علت معلولیت و سال‌های از دست رفته به علت مرگ و میر بر اثر اون بیماری

$DALY = YLL + YLD$ disability Adjusted Lost pers = years of lost lif by disney

سوال 109

کدام شاخص زیر نشانگر شدت یک بیماریست؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۹ -کشوری)

گزینه ۱ Disability adjusted lost years

گزینه ۲ Mortality rate

گزینه ۳ Case fatality rate

گزینه ۴ Disability adjusted life expectancy

نمایش پاسخ

ج/ شدت بیماری را میزان کشندگی بیماری تعیین میکنند.

سوال 110

بر اساس اهداف SDG کدام گزینه در مورد تعداد مرگ‌ها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره)

گزینه 1 کاهش ۵۰ درصدی

گزینه 2 کاهش ۷۰ درصدی

گزینه 3 به پایان رساندن آن

گزینه 4 کاهش ۴۰ درصدی

نمایش پاسخ

الف کاهش ۵۰ درصدی تعداد مرگ‌ها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان، جزئی از اهداف SDG است.

سوال 111

از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹ در ایران، میرایی تناسبی سرطان‌ها کاهش پیدا کرده است. علت اصلی کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 کم گزارش‌دهی مرگ ناشی از سرطان

گزینه 2 افزایش کل مرگ‌ها به علت کووید-۱۹

گزینه 3 بهبود مراقبت بیماران سرطانی

گزینه 4 کاهش تشخیص موارد سرطان

نمایش پاسخ

ب / افزایش کل مرگ‌ها علت کاهش میرایی تناسبی است.

سوال 112

برای سنجش میزان مرگ و میر نوزادان (Neonatal mortality rate) به کدام‌یک از اطلاعات زیر نیاز است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 تعداد مرگ نوزادان زیر ۲۸ روز در زمان معین و متوسط جمعیت کشور در همان مدت

گزینه 2 تعداد مرگ و میر کودکان زیر یکسال و تعداد موالید زنده در همان مدت

گزینه 3 تعداد مرگ نوزادان زیر ۲۸ روز در زمان معین و تعداد موالید زنده در همان مدت

گزینه 4 تعداد مرگ مادران به علت زایمان، تعداد موالید زنده در زمان معین و متوسط جمعیت کشور در همان مدت

نمایش پاسخ

ج / تعداد مرگ نوزادان زیر ۲۸ روز در زمان معین و تعداد موالید زنده در همان مدت = Neonatal mortality rate

سوال 113

در اکثر کشورهای جهان، میزان مرگ خام در طی دو دهه گذشته افزایش یافته است. مهم‌ترین علت این پدیده کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 گذار اپیدمیولوژیک

گزینه 2 افزایش امید زندگی

گزینه 3 افزایش چاقی و دیابت

گزینه 4 افزایش شهرنشینی و کم تحرکی

نمایش پاسخ

ب افزایش امید به زندگی مهمترین علت افزایش مرگ خام است.

سوال 114

در یک جمعیت یک میلیون نفری، در طی یک سال ۱۰۰ هزار نفر به بیماری ویروسی تنفسی X مبتلا شدند که ۱۰۰۰ نفر از آن‌ها در اثر بیماری جان باختند. در همین مدت ۲۰ هزار نفر به بیماری تنفسی Y مبتلا شدند، که ۱۰۰۰ نفر از آن‌ها در اثر بیماری فوت کردند. کدام گزینه در مورد مقایسه میزان کشندگی این دو بیماری در این جمعیت صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 کشندگی بیماری X بیشتر است.

گزینه 2 کشندگی بیماری Y بیشتر است.

گزینه 3 با هم مساوی است.

گزینه 4 با این اطلاعات قابل قضاوت نیست.

نمایش پاسخ

ب در مورد مقایسه این دو بیماری کشندگی بیماری Y بیشتر است.

سوال 115

عبارت «هر انحراف عینی یا ذهنی از وضعیت فیزیولوژیک سلامت» تعریف کدام واژه است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 Incidence

گزینه 2 Mortality

گزینه 3 Prevalence

گزینه 4 Morbidity

نمایش پاسخ

د Morbidity یعنی: هر انحراف عینی یا ذهنی از وضعیت فیزیولوژیک سلامت

سوال 116

سنجش وضعیت پوشش «واکسیناسیون هپاتیت B» در يك کشور، جزء کدام دسته از نشانگرهاي بهداشتي قرار دارد؟ (علوم پایه دندان پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 میزان بهره‌گیری از خدمات

گزینه 2 میزان ابتلا به بیماری

گزینه 3 اجرائي خدمات بهداشتي

گزینه 4 بیماری‌زایی

نمایش پاسخ

الف / سنجش وضعیت پوشش «واکسیناسیون هپاتیت B» در يك کشور، نشان‌دهنده میزان بهره‌گیری از خدمات است.

سوال 117

تمام موارد زیر درباره مشکلات بررسی بیماری‌های غیر واگیر، صحیح است، به جز: (علوم پایه دندان پزشکی دی ۹۹- میان دوره)

گزینه 1 کوتاه بودن دوره نهفته (کمون) بیماری

گزینه 2 فقدان عامل بیماری‌زای اختصاصی

گزینه 3 دخالت عوامل متعدد در ایجاد بیماری

گزینه 4 نامشخص بودن مرحله شروع یا حمله بیماری

نمایش پاسخ

الف / فقدان عامل بیماری‌زای اختصاصی، خالت عوامل متعدد در ایجاد بیماری و نامشخص بودن مرحله شروع یا حمله بیماری؛ از جمله مشکلات بررسی بیماری‌های غیرواگیر است.

سوال 118

سیستم مناسب مراقبت از بیماری‌ها بایستی کدام یک از اطلاعات زیر را فراهم نماید؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹- میان دوره کشوری)

گزینه 1 چه کسی آلوده به عفونت شده است

گزینه 2 عفونت با چه سرعتی در حال انتشار است

گزینه 3 اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و میر

گزینه 4 داده‌های مورد نیاز برای تصمیم گیرندگان

نمایش پاسخ

ج / یک سیستم مناسب مراقبت از بیماری‌ها باید، اطلاعات بسیار دقیق در مورد مرگ و میر را فراهم نماید.

سایر شاخص‌های اپیدمیولوژیک و تعریف بیماری و سلامت

تعداد سوال: ۵۳

درجه سختی: آسان

نکات: ۱- شاخص سولیوان: متوسط تعداد سالهایی که هر فرد بدون ناتوانی احتمال زنده ماندن دارد.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدامیک از شاخص‌های زیر جنبه‌ی ذهنی (Subjective) ندارند؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 نسبت کسانی که رژیم غذایی مناسب دارند.

گزینه 2 نسبت کسانی که اضطراب و افسردگی دارند.

گزینه 3 نسبت کسانی که رضایت از زندگی دارند.

گزینه 4 میزان حمایت اجتماعی و فعالیت اجتماعی.

نمایش پاسخ

د

سوال 2

کدامیک از گزینه‌های زیر بیان کننده‌ی شاخص سالیوان است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 متوسط تعداد سال‌هایی که هر فرد در بدو تولد، احتمال (انتظار) زنده ماندن دارد.

گزینه 2 اختلاف بین امیدها و انتظارات یک فرد و تجربیات فعلی او

گزینه 3 متوسط تعداد سال‌هایی که هر فرد، بدون ناتوانی، احتمال (انتظار) زنده ماندن دارد.

گزینه 4 میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله‌ی اشخاص درک می‌شود.

نمایش پاسخ

ج

سوال 3

شاخص سالیوان نشان دهنده‌ی چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 امید به زندگی بدو تولد

گزینه 2 امید به زندگی بالای ۶۵ سال

گزینه 3 امید به زندگی بدون احتساب مرگ

گزینه 4 امید به زندگی بدون ناتوانی

نمایش پاسخ

د

سوال 4

شاخص سالیوان چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 متوسط تعداد سال‌هایی که هر فرد احتمال زنده ماندن را دارد.

گزینه 2 یکی از نشانگرهای کیفیت زندگی است.

گزینه 3 شاخصی برای تجربه‌ی ذهنی بیماری است.

گزینه 4 یکی از شاخص‌های مربوط به وضعیت اقتصادی افراد شاغل و غیر شاغل در جامعه است.

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

کدامیک از موارد زیر به تعریف شاخص سالیوان اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 متوسط تعداد سال‌هایی که فرد احتمال زنده ماندن را دارد.

گزینه 2 امید به زندگی همراه با ناتوانی و بیماری جزئی

گزینه 3 متوسط تعداد سال‌هایی که فرد احتمال بستری شدن را دارد.

گزینه 4 امید به زندگی بدون ناتوانی

نمایش پاسخ

د

سوال 6

مناسب‌ترین شاخص برای مقایسه‌ی بار بیماری‌های مختلف در یک جامعه کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 سال‌های عمر از دست رفته منطبق شده با ناتوانی

گزینه 2 امید زندگی منطبق شده با ناتوانی

گزینه 3 میزان مرگ اختصاصی

گزینه 4 میزان کشندگی

نمایش پاسخ

الف

سوال 7

کاربرد کدامیک از شاخص‌های زیر جهت سنجش جنبه‌های ذهنی سلامت بیش‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 امید به زندگی

گزینه 2 کیفیت زندگی

گزینه 3 شاخص سالیوان

گزینه 4 شاخص‌های سبک زندگی

نمایش پاسخ

ب

سوال 8

اگر مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی عملکرد فعالیت‌های عمده را از امید زندگی کسر کنیم کدام شاخص حاصل می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 شاخص وضعیت سالمندان

گزینه 2 شاخص سبک زندگی

گزینه 3 شاخص کیفیت زندگی

گزینه 4 شاخص سالیوان

نمایش پاسخ

د

سوال 9

کدام شاخص نشانگر کیفی وضعیت سلامت افراد جامعه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 شاخص سالیوان

گزینه 2 امید به زندگی

گزینه 3 تراکم جمعیت

گزینه 4 مشارکت کردم در امر سلامت

نمایش پاسخ

الف

سوال 10

کدام شاخص‌های زیر نشان دهنده‌ی کیفیت زندگی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 شاخص امید به زندگی

گزینه 2 شاخص Perl

گزینه 3 شاخص Sullivan

گزینه 4 شاخص Daly

نمایش پاسخ

ج

سوال 11

کدامیک از گزینه‌های زیر منعکس کننده‌ی اختلاف و فاصله‌ی بین امیدها و انتظارات یک فرد با تجربیات فعلی او است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 شاخص سالیوان

گزینه 2 سطح زندگی

گزینه 3 کیفیت زندگی

گزینه 4 امید به زندگی

نمایش پاسخ

د

سوال 12

بهترین راه برآورد بار بیماری در جامعه محاسبه‌ی کدام شاخص است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 PQLI

گزینه 2 HDI

گزینه 3 DALY

گزینه 4 SULIVAN

نمایش پاسخ

ج

سوال 13

کدامیک از موارد زیر، منعکس کننده‌ی اختلاف و فاصله‌ی (gap) بین امیدها و انتظارات یک فرد با تجربیات فعلی او است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- مشترک کشوری)

گزینه 1 سطح زندگی

گزینه 2 موقعیت اقتصادی اجتماعی

گزینه 3 کیفیت زندگی

گزینه 4 وضعیت شغلی

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

کاربرد کدامیک از شاخص‌های زیر جهت سنجش جنبه‌های ذهنی سلامت بیش‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 امید به زندگی

گزینه 2 شاخص سالیوان

گزینه 3 کیفیت زندگی

گزینه 4 شاخص‌های سبک زندگی

نمایش پاسخ

ج

سوال 15

در بهداشت عمومی مفهوم «ill health» به کدامیک اطلاق می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 احساس ناخوشی با بیماری

گزینه 2 احساس ناخوشی بدون بیماری

گزینه 3 احساس سلامتی با بیماری

گزینه 4 احساس سلامتی بدون بیماری

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

کدامیک از گزینه‌های زیر تعریف درست malingering است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 فردی که بیمار است و احساس ناخوشی می‌کند.

گزینه 2 فردی که بیمار است و احساس ناخوشی نمی‌کند.

گزینه 3 فردی که بیمار نیست و احساس ناخوشی نمی‌کند.

گزینه 4 فردی که بیمار نیست و احساس ناخوشی می‌کند.

نمایش پاسخ

د

سوال 17

اگر فردی احساس سوزش معده داشته باشد و پس از انجام آزمایش‌های مختلف مشخص شود هیچ‌گونه بیماری ندارد، کدام تعریف اکولوژیک بیماری برای وی بکار می‌رود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 Disease

گزینه 2 Discomfort

گزینه 3 illness

گزینه 4 ill health

نمایش پاسخ

ج

سوال 18

شخصی دچار سرطان معده است که از نظر میکروسکوپی اختلال عمل سلولی مشخص شده است. این شخص در کدام گروه زیر قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 Disease

گزینه 2 ill health

گزینه 3 illness

گزینه 4 Malingering

نمایش پاسخ

الف

سوال 19

فردی با شکایت از درد شکم به پزشک مراجعه می‌کند. آزمایشات گرفته شده نشان می‌دهد که وی دچار آپاندیسیت است. کدام واژه در مورد وی کاربرد دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 Disease

گزینه 2 Illness

گزینه 3 Ill health

گزینه 4 Screening

نمایش پاسخ

ج

سوال 20

کدام گزینه بیانگر «ill health» است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 احساس ناخوشی بدون بیماری

گزینه 2 احساس بهبودی دارای بیماری

گزینه 3 احساس ناخوشی دارای بیماری

گزینه 4 احساس بهبودی بدون بیماری

نمایش پاسخ

ج

سوال 21

در غربالگری سرطان برای فردی تشخیص سرطان گذاشته می‌شود. در حالی که هیچ‌گونه علائم ناراحتی قابل اظهار ندارد. این فرد مبتلا به..... است. (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 ناخوشی یا Illness

گزینه 2 بیماری یا Disease

گزینه 3 سلامت ناکافی یا Ill health

گزینه 4 ناراحتی یا Malingering

نمایش پاسخ

ب

سوال 22

کدام مورد می‌تواند به عنوان ill health قلمداد شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 احساس سالم بودن و اثبات وجود یک بیماری پس از آزمایش‌های لازم

گزینه 2 احساس سالم بودن بدون وجود علائمی از یک بیماری

گزینه 3 یک تجربه‌ی ذهنی بیماری بدون وجود علائم بیماری

گزینه 4 بیان علائم بیماری و اثبات وجود بیماری پس از بررسی کامل

نمایش پاسخ

د

سوال 23

تجربه‌ی ذهنی فقدان سلامتی را چه می‌نامند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 بیماری (Disease)

گزینه 2 کسالت (Sickness)

گزینه 3 ناتوانی (Disability)

گزینه 4 ناخوشی (illness)

نمایش پاسخ

د

سوال 24

فردی با علائم درد و ضعف جسمانی به پزشک مراجعه می‌کند و بعد از انجام آزمایشات تکمیلی، بیماری به اثبات می‌رسد در این حالت کدام واژه در مورد شرایط وی درست است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 illhealth

گزینه 2 illness

گزینه 3 Discamfort

گزینه 4 Disease

نمایش پاسخ

الف

سوال 25

کدامیک از تعاریف ذیل بیانگر ناخوشی (Illness) است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 ناخوشی موارد مشخصی که از طریق علائم و نشانه‌های بالینی تشخیص داده می‌شود.

گزینه 2 ناخوشی بر پاسخ ذهنی افراد عادی به خوب نبودن دلالت دارد.

گزینه 3 یک فرد ممکن است بیماری داشته باشد ولی نشانه‌ای نداشته باشد.

گزینه 4 هیچکدام

نمایش پاسخ

ب

سوال 26

در کدامیک از موارد زیر غربالگری بهترین اثرات را خواهد داشت؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 احساس بهبودی- بدون بیماری

گزینه 2 احساس بهبودی- دارای بیماری

گزینه 3 احساس ناخوشی- دارای بیماری

گزینه 4 احساس ناخوشی- بدون بیماری

نمایش پاسخ

ب

سوال 27

«فردی هیچ علائمی از بیماری ندارد و در غربالگری به بیماری او پی برده شده است» این وضعیت کدامیک از واژه‌های زیر را تعریف می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 Illness

گزینه 2 Ill-health

گزینه 3 Disease

گزینه 4 Well-health

نمایش پاسخ

ج

سوال 28

شاخصی که سال‌های احتمالی زنده ماندن هر فرد با در نظر گرفتن کیفیت زندگی را سنجش می‌کند، چه نام دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 امید به زندگی

گزینه 2 سولیوان

گزینه 3 دالی

گزینه 4 بار بیماری

نمایش پاسخ

ب

سوال 29

فردی با علائم درد در ناحیه‌ی شکم مراجعه می‌کند. بعد از آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی زخم معده تشخیص داده می‌شود. این حالت مصداق کدام عبارت از دیدگاه اکولوژیک است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 Illness

گزینه 2 Disease

گزینه 3 Ill health

گزینه 4 Discomfort

نمایش پاسخ

ج

سوال 30

هرگونه انحراف از وضع مربوط به فیزیولوژی طبیعی چه به صورت ذهنی و چه به صورت عینی را..... می‌نامند. (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 morbidity

گزینه 2 mortality

گزینه 3 illness

گزینه 4 ill health

نمایش پاسخ

ب

سوال 31

کدامیک از نشانگرهای سلامتی، رشد اجتماعی اقتصادی را بهتر می‌سازد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 میزان مرگ و میر خام

گزینه 2 امید به زندگی

گزینه 3 شاخص سولبوان

گزینه 4 میزان مرگ و میر کودکان

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

کدامیک از فرمول‌های زیر شاخص میزان بقاء را تعریف می‌کند؟ (مخرج / صورت) (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 (کل بیماران درمان شده / کل بیماران تشخیص داده شده پس از ۵ سال) × ۱۰۰

گزینه 2 (کل بیماران مراجعه کننده / کل بیماران زنده مانده پس از ۵ سال) × ۱۰۰

گزینه 3 کل بیماران تشخیص داده شده یا درمان شده / کل بیماران زنده مانده یا درمان شده پس از ۵ سال) × ۱۰۰

گزینه 4 کل بیماران تشخیص داده شده یا درمان شده / کل بیماران زنده مانده پس از ۵ سال) × ۱۰۰

نمایش پاسخ

د. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 33

مطابق با نظریات «DALY سال‌های عمر تطبیق شده برای ناتوانی» کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 امید به زندگی بدون ناتوانی

گزینه 2 سال‌های از دست رفته به علت مرگ زودرس و سال‌های سپری شده با ناتوانی

گزینه 3 سال‌های مورد انتظار در تندرستی کامل

گزینه 4 متوسط تعداد سال‌هایی که افراد متولد شده در یک جمعیت زندگی می‌کنند.

نمایش پاسخ

ب

سوال 34

در مقایسه‌ی کیفیت زندگی با سطح زندگی، کدامیک از موارد ذیل ترجیحاً جزء شاخص‌های کیفیت زندگی محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 میزان رضایت افراد از موهبت‌های زندگی

گزینه 2 وضعیت اقتصادی و میزان درآمد افراد

گزینه 3 وضعیت مسکن و امکانات مادی زندگی افراد

گزینه 4 نوع شغل و وضعیت تغذیه‌ی افراد

نمایش پاسخ

الف. کیفیت زندگی شاخص مهمی برای سنجش جنبه‌های ذهنی است و به صورت اختلاف بین سطح انتظارات انسان‌ها و سطح واقعیت‌ها عنوان می‌شود. میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی شاخص‌های کیفیت زندگی هستند.

سوال 35

«میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله‌ی اشخاص درک می‌شود» و «امید زندگی بدون ناتوانی» به ترتیب مربوط به کدام شاخص‌های زیر می‌باشند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 کیفیت زندگی- سالیوان

گزینه 2 سالیوان- وینسلو

گزینه 3 وینسلو- کیفیت زندگی

گزینه 4 سالیوان- کیفیت زندگی

نمایش پاسخ

الف. میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی شاخص‌های کیفیت زندگی هستند. سالیوان هم شاخصی است که امید به زندگی بدون ناتوانی را نشان می‌دهد.

سوال 36

کدام‌یک از نشان‌گرهای زیر، نشانگر انتخاب شده برای نظارت بر روند پیشرفت به سوی هدف بهداشت برای همه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 مرگ و میر نسبی

گزینه 2 مرگ و میر مربوط به بیماری خاص

گزینه 3 سال‌های زندگی تطبیق داده شده با ناتوانی

گزینه 4 شاخص بودن سولیوان

نمایش پاسخ

د. شاخص سالیوان چیکار می‌کنه؟ سنجش سال‌های احتمالی زنده ماندن هر فرد با در نظر گرفتن کیفیت زندگی. یعنی همون چیزی که توی هدف بهداشت برای همه دنبالشیم. زندگی زیاد با کیفیت! آره دوبار!

سوال 37

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با مفهوم کیفیت زندگی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 مجموعه‌ای مرکب از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که توسط هر فرد یا گروهی قابل درک است، جدیدترین تعریف از کیفیت زندگی است.

گزینه 2 کیفیت زندگی جزء عینی بهزیستی است

گزینه 3 کیفیت زندگی عبارتی است که در سازمان ملل به جای استاندارد زندگی به کار می‌رود.

گزینه 4 تفاوت در کیفیت‌های زندگی مردم را می‌توان از طریق مقایسه‌ی درصد تولید ناخالص ملی بدست آورد.

نمایش پاسخ

الف. ۳۴- الف کیفیت زندگی: اختلاف و فاصله بین امیدها و انتظارات یک فرد با تجربیات فعلی او. مجموعه‌ای مرکب از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که توسط هر فرد یا گروهی قابل درک است و هم عینی و هم ذهنی (پس ب غلطه) کیفیت زندگی رو هم همیشه اندازه گرفت (با سطح زندگی اشتباهش بگیرین)

سوال 38

کدام شاخص دستیابی به بیشترین توانایی‌های پایه‌ی انسانی یعنی داشتن عمری طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از زندگی را منعکس می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 استاندارد زندگی

گزینه 2 کیفیت زندگی

گزینه 3 شاخص توسعه انسانی

گزینه 4 شاخص سولیوان

نمایش پاسخ

ج. شاخص توسعه‌ی انسانی منعکس کننده‌ی دستیابی به بیش‌ترین توانایی‌های پایه‌ی انسانی یعنی داشتن عمری طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از زندگی است.

سوال 39

کدامیک از موارد زیر در رابطه با شاخص کیفیت جسمی زندگی (Physical Quality of Life Index) صحیح است؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 این شاخص شامل سه نشانگر امید به زندگی در بدو تولد، مرگ و میر نوزادان و سواد آموزی است.

گزینه 2 شاخص کیفیت جسمی زندگی، رشد اقتصادی را ارزیابی می‌کند.

گزینه 3 این شاخص دستیابی به بیش‌ترین توانایی‌های پایه‌ی انسانی یعنی داشتن عمر طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از یک زندگی خوب و استاندارد را منعکس می‌کند.

گزینه 4 این شاخص نتایج سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ارزیابی می‌کند.

نمایش پاسخ

د. PQL سه شاخص یعنی میراثی شیرخواران، امید زندگی در پایان یک سالگی و میزان با سوادی را شامل می‌شود و نتایج سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ارزیابی می‌کند.

سوال 40

کدامیک از گزینه‌های زیر در رابطه با نشانگر امید به زندگی صحیح است؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 در امید به زندگی در یک سالگی اثر مرگ و میر شیرخواران و در امید به زندگی در پنج سالگی اثر مرگ و میر کودکان حذف می‌شود.

گزینه 2 امید به زندگی در یک سالگی بیش‌تر از همه‌ی موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه 3 آسان‌ترین راه برای برآورد بار یک بیماری در جامعه است.

گزینه 4 نمی‌توان آن را به عنوان نشانگر سلامتی مثبت در نظر گرفت.

نمایش پاسخ

الف. در امید به زندگی در یک سالگی اثر مرگ و میر شیرخواران و در امید به زندگی در پنج سالگی اثر مرگ و میر کودکان حذف می‌شود.

سوال 41

کدام گزینه زیر درباره موارد بدون علایم بالینی بیماری Subclinical cases صحیح نیست؟(دندان پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 عامل بیماری از این موارد به دیگران منتقل نمی شود .

گزینه 2 ه ایجاد ایمنی اکتسابی در افراد مبتلا منجر می شود.

گزینه 3 تشخیص موارد تنها با آزمایش های پارا کلینیکی امکان پذیر است.

گزینه 4 این موارد در افزایش ایمنی گروهی در جامعه نقش مهمی دارد .

نمایش پاسخ

الف/ در موارد بدون علایم بالینی عامل بیماری قابل انتقال می باشد.

سوال 42

در یک مطالعه مقطعی از تفاضل امید به زندگی و مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی در عملکرد کدامیک اط شاخص های زیر قابل محاسبه است؟
(دندان پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 شاخص سالیوان

گزینه 2 بار بیماری

گزینه 3 امید به زندگی تطبیق داده شده با سلامت

گزینه 4 میزان ناتوانی

نمایش پاسخ

الف /شاخص سالیوان= ناتوانی _ امید به زندگی

سوال 43

کدامیک از شاخص های زیر سه بعد طول عمر دانش و درآمد را شامل میشود؟(دندان پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 استاندارد زندگی

گزینه 2 کیفیت زندگی

گزینه 3 سطح زندگی

گزینه 4 توسعه انسانی

نمایش پاسخ

د /دستیابی به بیشترین توانایی های ذپایه انسانی یعنی داشتن عمر طولانی و آگاه بودن و لذت بردن از زندگی را شاخص توسعه انسانی گویند.

سوال 44

اگر پس از بررسی وضعیت سلامت فردی که اظهار علایم بیماری میکند مشخص شود که هیچ گونه عارضه ای ندارد کدامیک از موارد زیر مطرح می باشد؟
(پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 Disease

گزینه 2 Illness

گزینه 3 Ill health

گزینه 4 Discomfort

نمایش پاسخ

ب /فرد فکر میکند بیمار است ولی آزمایشات این را اثبات نمی کند.

سوال 45

برآورد شده است که ۷۰ درصد از کل موارد سرطان ریه که در سطح یک استان مشخص اتفاق می افتد، مرتبط با مصرف تنباکو است. این درصد بیانگر کدام شاخص اپیدمیولوژیک است؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹ - میان دوره)

گزینه 1 خطر نسبی خام

گزینه 2 خطر نسبی تعدیل شده

گزینه 3 خطر منتسب

گزینه 4 خطر منتسب جمعیت

نمایش پاسخ

د / خطر متنسب یک نسبت است و عبارت است از تفاضل میزان بروز بیماری در گروه مواجهه یافته ها از میزان بروز پیامد در گروه مواجهه نیافته است، مشروط بر اینکه علل دیگری به جز علت تحت بررسی، اثرات مشابهی در دو گروه داشته باشد.

سوال 46

یک تست سریع برای تشخیص بیماری کووید ۱۹ ابداع شده است. شرکت سازنده ادعا می کند که در بین ۲۰۰ مورد قطعی مبتلا به بیماری، در ۱۸۰ مورد و در بین ۱۰۰ نفر که قطعاً به بیماری مبتلا نبودند تنها در ۵ مورد این تست سریع مثبت شده است. بر این اساس، حساسیت و ویژگی تست به ترتیب چند درصد است؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹ - میان دوره)

گزینه 1 ۹۰ ، ۵

گزینه 2 ۹۰ ، ۵

گزینه 3 ۸۰ ، ۵

گزینه 4 ۸۰ ، ۹۵

نمایش پاسخ

ب حساسیت ۹۰ و ویژگی ۹۵ است.

سوال 47

فردی با اظہار علایمی که می تواند مبین سرطان کولون باشد مراجعه نموده است و بعد از بررسی و انجام آزمایشات، بیماری او به اثبات می رسد. در این حالت کدام واژه مناسب است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری)

گزینه 1 Illness

گزینه 2 Ill Health

گزینه 3 Diseases

گزینه 4 Discomfort

نمایش پاسخ

ب / Ill Health واژه مناسبی برای این فرد بعد از تشخیص سرطان می باشد.

سوال 48

کدام گزینه در مورد مفهوم DALYS صحیح است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری)

گزینه 1 امید زندگی منطبق شده با ناتوانی در یک جامعه

گزینه 2 (امید زندگی عاری از ناتوانی + سال های از دست رفته به علت ناتوانی) در یک جام

گزینه 3 سال های عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس ناشی از یک بیماری

گزینه 4 (سال های عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس + سال های عمر از دست رفته به علت ناتوانی) ناشی از یک بیماری

نمایش پاسخ

د / DALYS = سال های عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس + سال های عمر از دست رفته به علت ناتوانی ناشی از یک بیماری

سوال 49

چند عاملی بودن (Multifictorial) بیماری های غیر واگیر با کدامیک از معیارهای علیتی هیل در تضاد است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری)

گزینه 1 قدرت رابطه

گزینه 2 ویژگی رابطه

گزینه 3 تقدم زمانی

گزینه 4 ارتباط مقدار- پاسخ

نمایش پاسخ

ب / چند عاملی بودن (Multifictorial) بیماری های غیر واگیر با ویژگی رابطه در تضاد است.

سوال 50

برای ایجاد شاخص توسعه انسانی (HDI) حداکثر مقدار تعیین شده برای نشانگرهای میزان باسواد بزرگسالان و امید به زندگی در بدو تولد به ترتیب عبارت است از: (علوم پایه دندان پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری)

گزینه 1 ۱۰۰ درصد - ۷۰ سال

گزینه 2 ۱۰۰ درصد - ۸۵ سال

گزینه 3 ۲۵ درصد - ۱۰۰ سال

گزینه 4 ۸۵ درصد - ۷۰ سال

نمایش پاسخ

ب- شاخص توسعه انسانی منعکس‌کننده‌ی دستیابی به بیشترین توانایی‌های پایه‌ی انسان یعنی داشتن عمری طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از زندگی است.

۸۵ سال بدون بهرادرنگسل!

سوال 51

کدام‌یک از گزینه‌های زیر برای فردی که احساس درد و سوزش در ناحیه دهان دارد ولی معاینات نشان می‌دهند که هیچ‌گونه عارضه‌ای ندارد مناسب است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 Illness

گزینه 2 Ill health

گزینه 3 Disease

گزینه 4 Healthy

نمایش پاسخ

الف / illness حالتی که شخص احساس درد دارد ولی آزمایش ها، سلامت او را تایید می‌کنند.

سوال 52

کدام‌یک از موارد زیر در مورد شاخص توسعه انسانی (HDI) صحیح نیست؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 مقدار حداقل و حداکثر برای نشانگر امید زندگی در بدو تولد برای ایجاد HDI به ترتیب ۴۵ و ۸۵ سال است.

گزینه 2 درآمد سرانه، نقش محوری در محاسبه HDI دارد و کشورهای با درآمد سرانه یکسان، HDI یکسان دارند.

گزینه 3 در محاسبه HDI، مخلوطی از نشانگرهای درآمد، باسوادی بزرگسالان و امید زندگی در بدو تولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه 4 اگر مقدار HDI در کشوری ۵۰۰ باشد، نشان می‌دهد این کشور ۵۰ درصد از مسیر خود را برای رسیدن به بالاترین ارزش ممکن طی کرده‌است.

نمایش پاسخ

ب - لزوماً کشورهای با درآمد سرانه یکسان، HDI یکسان ندارند.

سوال 53

اگر در کشوری میزان باسوادی بزرگسالان ۵۰۷۲ درصد باشد، در محاسبه HDI این کشور کدام یک از مقادیر زیر برای میزان باسوادی بزرگسالان استفاده می‌شود؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 ۰.۵۲۵

گزینه 2 ۰.۸۵۲

گزینه 3 ۰.۷۹۱

گزینه 4 ۰.۷۲۵

نمایش پاسخ

د/ میزان باسوادی بزرگسالان، ۰.۷۲۵ خواهد بود.

میزان باسوادی ۱

غربالگری

تعداد سوال: ۱۳۳

درجه سختی: متوسط

نکات: نحوه محاسبه ارزش اخباری مثبت و حساسیت پرتکرار بوده است.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

تمام گزینه‌های زیر درباره‌ی اهداف غربالگری صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 تشخیص زودرس بیماری در جامعه

گزینه 2 پیشگیری نخستین و اولیه از بروز بیماری

گزینه 3 درمان به موقع موارد ابتلا

گزینه 4 پیشگیری از وخامت و شدت بیماری

نمایش پاسخ

ب

سوال 2

از یک آزمون غربالگری که حساسیت و ویژگی آن در تشخیص بیماری به ترتیب ۹۰% و ۸۰% است برای بررسی شیوع یک بیماری در یک جامعه استفاده می‌کنیم. اگر در یک جامعه‌ی فرضی شیوع بیماری صفر درصد باشد، چند درصد از افراد جامعه آزمون مثبت خواهند داشت؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 ۲۰

گزینه 2 ۰

گزینه 3 ۱۰

گزینه 4 ۸۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

در یک جمعیت ۱۰۰۰ نفری که ۱۰۰ نفر آن‌ها به یک بیماری مبتلا هستند و ۹۰۰ نفر دیگر به این بیماری مبتلا نیستند، میزان حساسیت آزمون غربالگری برای افراد مبتلا که ۸۰ نفر آنان مثبت تشخیص داده شده‌اند، در این جمعیت چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 ۴۰ درصد

گزینه 2 ۸۰ درصد

گزینه 3 ۶۰ درصد

گزینه 4 ۹۰ درصد

نمایش پاسخ

ب

سوال 4

در یک برنامه‌ی غربالگری برای پرفشاری خون، ۸۰ درصد از افراد بیمار و ۲۰ درصد از افراد سالم، مبتلا تشخیص داده شده‌اند. ارزش اخباری مثبت آن آزمون غربالگری چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۲۰%

گزینه 2 ۵۰%

گزینه 3 ۸۰%

گزینه 4 ۱۰۰%

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

کدامیک از شاخص‌های زیر بیانگر پایایی یک آزمون تشخیصی است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 ویژگی

گزینه 2 حساسیت

گزینه 3 کاپا

گزینه 4 ارزش اخباری

نمایش پاسخ

ج

سوال 6

وقتی می‌گوییم حساسیت نوار قلب در تشخیص سکته‌ی قلبی ۹۵% است، چه مفهومی‌دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۹۵% بیماران سکته‌ی قلبی با نوار قلب تشخیص داده می‌شوند.

گزینه 2 نوار قلب ۹۵% افراد سالم طبیعی است.

گزینه 3 ۵% بیماران سکته‌ی قلبی با نوار قلب تشخیص داده می‌شوند.

گزینه 4 نوار قلب ۵% افراد سالم طبیعی است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 7

حساسیت آزمون‌های غربالگری عبارت است از: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

الف) مثبت واقعی
منفی کاذب+مثبت واقعی

ب) مثبت واقعی
مثبت کاذب+مثبت واقعی

ج) منفی واقعی
منفی کاذب+منفی واقعی

د) منفی واقعی
مثبت کاذب+منفی واقعی

نمایش پاسخ

سوال 8

نتایج حاصله از آزمایش خلط ۱۰۰ بیمار مشکوک به سل ریوی با دو روش کشت و میکروسکپی در جدول زیر آمده است، درصد حساسیت و ویژگی آزمایش میکروسکوپی در مقایسه با کشت به ترتیب عبارتند: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

(برهنگری) آزمایش میکروسکوپی			
	+	-	
+	۲۵	۱۰	۳۵
- (تشخیص)	۵	۶۰	۶۵
	۳۰	۷۰	

گزینه 1 ۷۱ و ۸۵

گزینه 2 ۸۳ و ۹۲

گزینه 3 ۷۱ و ۹۲

گزینه 4 ۸۳ و ۸۵

نمایش پاسخ

سوال 9

خانم ۴۰ ساله‌ای با نتیجه‌ی آزمایش طبیعی مراجعه و در خصوص احتمال بیمار نبودن خود سؤال می‌کند. مفهوم این پرسش با کدامیک از موارد زیر انطباق دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

سوال 10

در ارزیابی قدرت سونوگرافی، از ۲۵۰۰ فرد مبتلا به آپاندیسیت که بیماری آن‌ها به وسیله‌ی لام پاتولوژی به عنوان استاندارد طلایی تأیید شده و ۵۰۰۰ فرد شاهد با علائم آپاندیسیت اما سالم، قبل از عمل جراحی سونوگرافی به عمل آمده است. نتیجه‌ی سونوگرافی برای ۱۵۰۰ فرد بیمار و ۱۰۰۰ فرد شاهد مثبت گزارش شده بود. ارزش اخباری منفی سونوگرافی چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 ۸۰٪

گزینه 2 ۶۰٪

گزینه 3 ۴۰٪

گزینه 4 ۲۰٪

نمایش پاسخ

سوال 11

فردی ۵۰ ساله با یک نتیجه‌ی آزمایش مثبت مراجعه نموده است و از شما راجع به احتمال بیمار بودن خود سؤال می‌کند، سوال وی مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

سوال 12

در یک مطالعه روی ۵۰۰ بازمانده‌ی زلزله، ۱۰۰ نفر براساس تشخیص روان‌پزشک (استاندارد طلایی) مبتلا به اختلال PTSD شناخته شده‌اند. نتیجه‌ی ارزیابی با استفاده از یک آزمون غربالگری بیماری در ۸۰ نفر از ۱۰۰ بیمار، مثبت و در ۳۶۰ نفر از ۴۰۰ غیر بیمار، منفی به دست آمد. بر این اساس، ویژگی و ارزش اخباری مثبت به ترتیب چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 ۹۰، ۶۷

گزینه 2 ۹۰، ۸۰

گزینه 3 ۸۰، ۶۷

گزینه 4 ۸۰، ۸۰

نمایش پاسخ

کدامیک از شاخص‌های مربوط به یک آزمایش تشخیصی تحت تأثیر میزان شیوع بیماری در جامعه هدف قرار نمی‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 اعتبار

نمایش پاسخ

ج

در انجام آزمون‌های موازی (همزمان) برای تشخیص یک بیماری کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 افزایش ویژگی خالص

گزینه 2 افزایش حساسیت خالص

گزینه 3 افزایش ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 کاهش موارد مثبت کاذب

نمایش پاسخ

ب

اگر شیوع یک بیماری در جامعه‌ای کاهش پیدا کند کدامیک از معیارهای تست کاهش پیدا می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ج

کدامیک از شاخص‌های نظام مراقبت در تشخیص موارد بیماری از اهمیت بیش‌تری برخوردار است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران/پزشکی شهریور و اسفند ۹۴ - قطب تبریز)

گزینه 1 ارزش اخباری منفی- حساسیت

گزینه 2 ویژگی- ارزش اخباری منفی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت- ارزش اخباری منفی

گزینه 4 حساسیت- ارزش اخباری مثبت

نمایش پاسخ

د

آزمونی برای تشخیص هپاتیت C در ۲۰۰ بیمار تشخیص داده توسط بیوپسی و ۲۰۰ فردی که مبتلا به بیماری نیستند انجام شده است. نتیجه‌ی آزمون در ۱۸۰ بیمار مبتلا به بیماری مثبت و در ۱۵۰ نفر از افراد سالم منفی است. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 ارزش اخباری منفی ۷۵٪

گزینه 2 ارزش اخباری مثبت ۹۵٪

گزینه 3 ویژگی ۷۵٪

گزینه 4 حساسیت ۷۵٪

نمایش پاسخ

ج

آزمونی برای تشخیص هپاتیت C در ۲۰۰ بیمار تشخیص داده توسط بیوپسی و ۲۰۰ فردی که مبتلا به بیماری نیستند انجام شده است. نتیجه‌ی آزمون در ۱۸۰ بیمار مبتلا به بیماری مثبت و در ۱۵۰ نفر از افراد سالم منفی است. کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد و همدان)

گزینه 1 ارزش اخباری مثبت ۹۵٪ است.

گزینه 2 حساسیت آزمون ۹۰٪ است.

گزینه 3 ارزش اخباری منفی ۷۵٪ است.

گزینه 4 ویژگی ۸۲.۵٪ است.

نمایش پاسخ

سوال 19

در یک مطالعه، سطح آلفا فیتوپروتئین سرم در ۲۰۰۰ مادر باردار، برای ارزیابی ناهنجاری‌های مادرزادی جنین اندازه‌گیری شد. شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی در نوزادان متولد شده ۲۰٪ بود. آلفا فیتوپروتئین در مادران ۲۸۰ نوزاد ناهنچار و ۲۴۰ نوزاد سالم بالا گزارش شده بود. میزان حساسیت آزمون آلفا فیتوپروتئین در تشخیص ناهنجاری جنینی چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۶۰

گزینه 2 ۷۰

گزینه 3 ۸۶

گزینه 4 ۹۵

نمایش پاسخ

سوال 20

جهت تشخیص ضایعات پستان از سونوگرافی استفاده کردیم و نتایج حاصل از انجام این تست در مقایسه با استاندارد طلایی در جدول زیر آمده است. ارزش اخباری مثبت این تست چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

سالم	بیمار	نتیجه قطعی نتیجه سونوگرافی
۳۰	۴۰	مثبت
۹۰	۴۰	منفی

گزینه 1 ۵۰

گزینه 2 ۵۷

گزینه 3 ۶۹

گزینه 4 ۷۵

نمایش پاسخ

سوال 21

ویژگی یک آزمایش ۸۰٪ است. معنی این عبارت کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ۸۰٪ افراد با پاسخ مثبت سالم هستند.

گزینه 2 ۸۰٪ افراد با پاسخ منفی سالم هستند.

گزینه 3 ۸۰٪ افراد سالم، تست منفی دادند.

گزینه 4 ۸۰٪ افراد بیمار، تست مثبت دادند.

نمایش پاسخ

سوال 22

به منظور بررسی دقت عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص سل، از ۱۰۰ بیمار مبتلا به سل و ۱۰۰ فرد سالم عکس قفسه‌ی سینه گرفته شد. نتیجه‌ی گرافی در ۸۰ نفر از مبتلایان به سل مثبت شده است. بر این اساس کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 حساسیت عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص بیماران مبتلا به سل ۸۰ درصد است.

گزینه 2 ویژگی عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص بیماران مبتلا به سل ۸۰ درصد است.

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص بیماران مبتلا به سل، ۸۰ درصد است.

گزینه 4 ارزش اخباری منفی عکس قفسه‌ی سینه در تشخیص بیماران مبتلا به سل، ۸۰ درصد است.

نمایش پاسخ

سوال 23

۳۰۰ زن باردار را با تست غربالگری که حساسیت آن ۹۰٪ و ویژگی آن ۷۰٪ است مورد آزمون غربالگری قرار دادیم. چند نفر از زنان باردار به طور کاذب منفی خواهد شد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 ۳۱۰ نفر

گزینه 2 ۲۷۰ نفر

گزینه 3 ۳۰ نفر

گزینه 4 ۹۰ نفر

نمایش پاسخ

سوال 24

احتمال بیمار بودن فرد زمانی که نتیجه‌ی آزمون غربالگری او مثبت است بیانگر کدام شاخص غربالگری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 ارزش اخباری مثبت

گزینه 2 حساسیت

گزینه 3 ویژگی

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

الف

سوال 25

با توجه به جدول زیر که حاصل نتایج مطالعه‌ای بر روی آزمون غربالگری تست بک برای تشخیص اضطراب است. میزان شیوع اضطراب چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

نتیجه تشخیص قطعی	نتیجه آزمایش غربالگری	
	مثبت	منفی
مثبت	۲۰	۱۰
منفی	۳۰	۹۰

گزینه 1 ۱۰٪

گزینه 2 ۳۳٪

گزینه 3 ۲۰٪

گزینه 4 ۵۰٪

نمایش پاسخ

ب

سوال 26

ارزش اخباری مثبت تست ذکر شده در سؤال قبل چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 ۴۰٪

گزینه 2 ۲۵٪

گزینه 3 ۶۶٪

گزینه 4 ۹۰٪

نمایش پاسخ

ج

سوال 27

مخرج کسر محاسبه‌ی حساسیت در ارزشیابی یک آزمون غربالگری کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 مثبت حقیقی+ منفی کاذب

گزینه 2 مثبت حقیقی+ مثبت کاذب

گزینه 3 منفی حقیقی+ مثبت حقیقی

گزینه 4 منفی حقیقی+ منفی کاذب

نمایش پاسخ

الف

سوال 28

حساسیت یک آزمون غربالگری یعنی؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز/پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران/ پزشکی اسفند ۹۳- قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 احتمال سالم بودن یک فرد سالم تشخیص داده شده

گزینه 2 توانایی یک آزمون در تشخیص درست افراد سالم

گزینه 3 توانایی یک آزمون در تشخیص درست افراد بیمار

گزینه 4 احتمال بیمار بودن یک فرد بیمار تشخیص داده شده

نمایش پاسخ

ج

سوال 29

پزشکی با دیدن نتیجه‌ی مثبت آزمایشی در یک بیمار و با توجه به تخمینی که از شیوع آن بیماری در جامعه دارد، احتمال بیمار بودن وی را ۹۰ درصد برآورد می‌کند. این احتمال ۹۰ درصد کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ارزش اخباری مثبت

گزینه 3 ویژگی

گزینه 4 احتمال بیماری در آن جامعه

با افزایش ویژگی یک آزمون غربالگری، کدام مورد کاهش می‌یابد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 منفی کاذب

گزینه 2 منفی واقعی

گزینه 3 مثبت کاذب

گزینه 4 مثبت واقعی

در یک آزمایش غربالگری نسبت بیماران واقعی در بین افرادی که آزمایش مثبت داشته‌اند، چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ارزش اخباری مثبت

گزینه 3 ویژگی

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

با استفاده از جدول زیر احتمال این که فردی با جواب آزمایش مثبت واقعاً به بیماری مبتلا باشد چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

سالم	بیمار	لیست غربالگری مثبت
۲۷۰	۹۰	لیست غربالگری منفی
۱۷۳۰	۱۱۰	

گزینه 1 ۴۵

گزینه 2 ۲۵

گزینه 3 ۳۳/۳

گزینه 4 ۷۵

شیوع یک بیماری در جمعیت ۱۰۰۰ نفری، ۲۰% است. ارزش اخباری مثبت یک تست با حساسیت و ویژگی ۸۰٪، چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ۲۵

گزینه 2 ۴۰

گزینه 3 ۵۰

گزینه 4 ۶۰

در فصل زمستان سال گذشته تعداد ۳۰۰ نفر با شکایت از گلودرد و تب به پزشک شاغل در درمانگاه مراجعه نموده و تشخیص بالینی برای ۱۰ نفر از این بیماران، گلو درد استرپتوکوکسی بوده است. برای تمام بیماران کشت گلو انجام شد که نتایج کشت ۱۲۰ نفر مثبت بود. چنان چه نتیجه‌ی تشخیص بالینی و کشت در ۸۰ نفر مثبت باشد. حساسیت معاینه‌ی بالینی در تشخیص گلودرد چند درصد بوده است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 ۸۸

گزینه 2 ۸۰

گزینه 3 ۶۶

گزینه 4 ۲۰

در یک مطالعه بر روی ۲۰۰ بیمار، نتایج کشت گلو برای عفونت استرپتوکوکی به عنوان مرجع استاندارد با معاینه‌ی بالینی مقایسه شده است. از ۱۲۰ بیماری که معاینه‌ی بالینی آن‌ها دال بر عفونت استرپتوکوکی گلو بود. ۸۰ نفر کشت گلوی مثبت داشتند و از ۸۰ بیماری که معاینه‌ی بالینی آن‌ها منفی بود. ۲۰ نفر کشت گلویشان مثبت گزارش شد. حساسیت معاینه‌ی بالینی برای تشخیص عفونت استرپتوکوکی گلو چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 ۶۰

گزینه 2 ۶۶

گزینه 3 ۷۵

گزینه 4 ۸۰

نمایش پاسخ

د

سوال 36

چنانچه در جمعیت فرضی صد هزار نفره، شیوع بیماری X برابر با ده درصد باشد و در این جمعیت جهت غربالگری از تستی با حساسیت برابر با ۸۰% و ویژگی ۹۰% استفاده شود، ارزش اخباری مثبت چند درصد خواهد بود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 ۴۷

گزینه 2 ۵۳

گزینه 3 ۷۹

گزینه 4 ۹۶

نمایش پاسخ

الف

سوال 37

نسبت بیماران واقعی در بین افرادی که آزمایش مثبت داشته‌اند، بیانگر کدامیک از شاخص‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ج

سوال 38

با توجه به داده‌های جدول زیر به ترتیب حساسیت و ویژگی آزمون بکار رفته کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

نتیجه آزمون غربالگری		
بیمار	سالم	
مثبت	۸۰	۲۰
منفی	۲۰	۸۰

گزینه 1 ۸۰% و ۲۰%

گزینه 2 ۲۰% و ۸۰%

گزینه 3 ۸۰% و ۸۰%

گزینه 4 ۲۰% و ۲۰%

نمایش پاسخ

ج

سوال 39

کدام گزینه قدرت یک آزمون غربالگری در تشخیص درست همه‌ی کسانی که بیمار هستند را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/پزشکی اسفند ۹۴_ قطب تبریز)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

الف

سوال 40

با توجه به داده‌های جدول زیر، کدام گزینه نشان دهنده‌ی ارزش اخباری مثبت آزمون غربالگری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

		جمعیت	
		بیمار	غیربیمار
نتایج غربالگری	مثبت	۲۰۰	۵۰
	منفی	۱۰۰	۴۵۰

گزینه 1 ۶۶/۶ درصد

گزینه 2 ۸۰ درصد

گزینه 3 ۲۰ درصد

گزینه 4 ۸۱/۸ درصد

نمایش پاسخ

ب

سوال 41

پاسخ انجام آزمون غربالگری در یک جامعه ۲۰۰ نفری، ۸۰ مثبت و ۱۲۰ نفر منفی است. آزمون معتبر وجود بیماری را برای ۴۰ نفر با نتیجه‌ی مثبت و ۱۰ نفر با نتیجه‌ی منفی مورد تأیید قرار دارد. ارزش اخباری مثبت آزمون چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 ۸۰ درصد

گزینه 2 ۹۲ درصد

گزینه 3 ۷۳ درصد

گزینه 4 ۵۰ درصد

نمایش پاسخ

د

سوال 42

خانم ۳۵ ساله‌ای با نتیجه‌ی مثبت تست بارداری ادرار توسط Baby check به پزشک مراجعه می‌کند و از وی می‌پرسد چقدر احتمال دارد که من واقعاً باردار باشم؟ او کدامیک از شاخص‌های ارزش تشخیصی تست غربالگری را پرسیده است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ج

سوال 43

در این جدول میزان حساسیت و ویژگی‌های آزمون و میزان ارزش اخباری مثبت به ترتیب کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

	بیماری		
	+	-	
تست	+	۴۰	۱۰
	-	۳۰	۲۰

گزینه 1 ۸۰٪ - ۶۷٪ - ۵۷٪

گزینه 2 ۶۵٪ - ۸۰٪ - ۶۰٪

گزینه 3 ۸۰٪ - ۵۰٪ - ۶۰٪

گزینه 4 ۷۰٪ - ۸۰٪ - ۳۰٪

نمایش پاسخ

الف

سوال 44

کدام شاخص زیر در آزمون‌های غربالگری با نوسانات میزان شیوع بیماری در جامعه ارتباط دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 ویژگی آزمون

گزینه 2 ارزش اخباری

گزینه 3 حساسیت آزمون

گزینه 4 اعتبار خارجی

نمایش پاسخ

ب

سوال 45

اگر یک بیماری فرضی در جامعه شیوع بالایی نداشته باشد، ارزش اخباری آزمون تشخیصی این بیماری متأثر از کدام خاصیت آزمون قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 حساسیت آزمون

گزینه 2 ویژگی آزمون

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت آزمون

گزینه 4 ارزش اخباری منفی آزمون

نمایش پاسخ

سوال 46

حساسیت تستی برای تشخیص حاملگی ۹۵% و ویژگی آن ۸۰% است. اگر ۴۰۰ زن باردار را با این تست آزمایش کنیم، در چند نفر از آن‌ها نتیجه‌ی آزمایش به طورکاذب منفی خواهد شد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 ۱۰

گزینه 2 ۲۰

گزینه 3 ۶۰

گزینه 4 ۸۰

نمایش پاسخ

سوال 47

مرد ۳۵ ساله‌ای با نتیجه‌ی یک نوبت آزمون مثبت براساس آزمون وسترن بلات مراجعه نموده است و در مورد احتمال بیمار بودن خود با توجه به نتیجه‌ی آزمون سؤال می‌کند. سؤال وی مترادف با کدامیک از خصوصیات آزمون است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

سوال 48

اگر درصد مثبت کاذب تستی، ۱۳ درصد و منفی کاذب آن ۱۱ درصد باشد حساسیت و ویژگی برحسب درصد (از راست به چپ) کدامند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ۱۱ و ۱۳

گزینه 2 ۱۳ و ۱۱

گزینه 3 ۸۹ و ۸۷

گزینه 4 ۸۷ و ۸۹

نمایش پاسخ

سوال 49

در یک جمعیت ده هزار نفری که میزان شیوع بیماری ۵% است از تست A برای تشخیص بیماری مذکور استفاده شده است. تست در ۴۰۰ نفر مثبت حقیقی و در ۱۹۰۰ نفر مثبت کاذب شده است. میزان حساسیت چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 ۲۰%

گزینه 2 ۴۰%

گزینه 3 ۶۰%

گزینه 4 ۸۰%

نمایش پاسخ

سوال 50

کدامیک از ملاک‌های یک آزمون تشخیصی در شرایط بالینی اهمیت بیش‌تری دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری

گزینه 4 درصد مثبت‌های کاذب

نمایش پاسخ

سوال 51

فردی با نتیجه‌ی آزمون مثبت برای ایدز به پزشک مراجعه می‌کند، او از پرسنل آزمایشگاه شنیده است که جواب تست قطعی نیست. لذا از پزشک سؤال می‌کند چقدر احتمال دارد من مبتلا به بیماری ایدز باشم؟ پزشک با دانستن کدام گزینه‌ی زیر می‌تواند به سؤال بیمار پاسخ دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 حساسیت تست

گزینه 2 ویژگی تست

گزینه 3 ارزش اخباری منفی تست

نمایش پاسخ

د

سوال 52

اطلاعات غربالگری یک جمعیت ۱۰۰۰ نفری در جدول زیر برای بیماری حصبه نمایش داده شده است، براساس نتایج Gold satandard میزان شیوع بیماری و حساسیت آزمون به ترتیب چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

سالیم	میتلا	آزمون غربالگری
۱۰۰	۵۰	+
۲۰۰	۱۵۰	-
۸۰۰	۳۰۰	

گزینه 1 ۵۰ و ۲۰

گزینه 2 ۲۰ و ۲۵

گزینه 3 ۳۳ و ۲۵

گزینه 4 ۲۵ و ۵۰

نمایش پاسخ

ب

سوال 53

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص معیار انجام غربالگری صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 بیماری از تاریخچه‌ی شناسایی شده‌ی خوبی برخوردار نباشد.

گزینه 2 تست غربالگری از ویژگی بالا و حساسیت پایین برخوردار باشد.

گزینه 3 برای بیماری‌های حاد بکار می‌رود.

گزینه 4 بین زمان ابتلای افراد و بروز علائم آشکار بیماری فاصله‌ی زمانی وجود داشته باشد.

نمایش پاسخ

د

سوال 54

در جامعه‌ای فرضی شیوع بیماری X برابر پنج درصد و بروز آن یک درصد است. در این جامعه آزمونی یا حساسیت و ویژگی ۸۰% جهت غربالگری این بیماری به کار برده شده است. چنانچه به هر ۴ مورد (حساسیت، ویژگی، بروز و شیوع)، ۵% اضافه شود کدام مورد بیش‌ترین تأثیر را بر ارزش اخباری مثبت خواهد داشت؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 شیوع

گزینه 2 بروز

گزینه 3 حساسیت

گزینه 4 ویژگی

نمایش پاسخ

الف

سوال 55

ماموگرافی و آزمایش پاپ‌اسمیر از دهانه‌ی رحم، جزء کدامیک از انواع غربالگری می‌باشند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 توده‌ی مردم (Mass screening)

گزینه 2 یک بیماری منفرد (Single disease)

گزینه 3 چند مرحله‌ای (Multiphasic)

گزینه 4 هدف‌دار (Selective)

نمایش پاسخ

ب

سوال 56

کدام گزینه به اولین بار غربالگری در جامعه اطلاق می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 غربال همگانی

گزینه 2 غربال بروز

گزینه 3 غربال شیوع

گزینه 4 موردیابی

نمایش پاسخ

ج

سوال 57

در شرح حال گرفته شده از ۱۰۰ مادری که برای مراقبت‌های کودکان خود به یک مرکز بهداشتی درمانی مراجعه می‌نمودند ۶۰ نفر سابقه‌ی ایمن‌سازی برعلیه ب.ث.ژ برای فرزندان خود را ذکر نمودند، در حالی که در بررسی پرونده‌های بهداشتی ۷۰ کودک واکسن ب.ث.ژ زده بودند. چنانچه از ۶۰ مادری که سابقه‌ی واکسیناسیون فرزندان‌شان را ذکر نمودند واقعاً ۵۵ مورد واکسینه شده باشند، ارزش اخباری مثبت چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ۹۱/۷ درصد

گزینه 2 ۶۲/۵ درصد

گزینه 3 ۸۳/۳ درصد

گزینه 4 ۷۸/۶ درصد

نمایش پاسخ

الف

سوال 58

این تعریف در مبحث غربالگری مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

افراد بیماری که به وسیله‌ی آزمون، منفی تشخیص داده شده‌اند.

گزینه 1 منفی کاذب

گزینه 2 مثبت کاذب

گزینه 3 منفی حقیقی

گزینه 4 مثبت حقیقی

نمایش پاسخ

الف

سوال 59

در آزمون‌های غربالگری، کدامیک از اندازه‌های زیر با تغییر میزان شیوع تغییر می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۵ - قطب اصفهان)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری

گزینه 4 پایایی

نمایش پاسخ

ج

سوال 60

احتمال تشخیص صحیح موارد بیماری با احتمال اینکه هر مورد بیماری با کمک آزمون شناسایی شود به کدام مورد اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 حساسیت $\frac{r}{a+c}$

گزینه 2 ویژگی $\frac{d}{d+b}$

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت $\frac{a}{a+b}$

گزینه 4 ارزش اخباری منفی $\frac{d}{c+d}$

نمایش پاسخ

الف

سوال 61

به منظور غربالگری یک بیماری در جامعه، از یک آزمایش با حساسیت ۷۰ درصد و ویژگی ۸۰ درصد استفاده شده است. اگر تعداد جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر و شیوع بیماری ۵

درصد باشد، انتظار می‌رود در چه تعدادی از افراد سالم، نتیجه‌ی آزمایش مثبت گزارش شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 ۱۵۰۰ نفر

گزینه 2 ۱۸۰۰ نفر

گزینه 3 ۱۹۰۰ نفر

گزینه 4 ۲۲۵۰ نفر

نمایش پاسخ

ج

سوال 62

حساسیت و ویژگی یک تست جدید برای تشخیص حاملگی، به ترتیب ۹۵ و ۸۰ درصد است. اگر ۳۰۰ زن حامله را با این تست آزمایش کنیم، در چند نفر از آن‌ها نتیجه

به طور کاذب منفی می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 ۵

گزینه 2 ۱۵

گزینه 3 ۲۰

گزینه 4 ۶۰

سوال 63

براساس معاینه توسط چشم پزشک (به عنوان استاندارد طلایی) از ۲۰۰ دانش‌آموز یک مدرسه ۵۰ نفر دارای عیوب انکساری هستند. در معاینات غربالگری بدو ورود به مدرسه از این ۵۰ دانش‌آموز ۴۰ دانش‌آموز از نظر وجود عیب انکساری مثبت تشخیص داده شده‌اند. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 ویژگی معاینات غربالگری ۲۵ درصد است.

گزینه 2 حساسیت معاینات غربالگری ۲۵ درصد است.

گزینه 3 ویژگی معاینات غربالگری ۸۰ درصد است.

گزینه 4 حساسیت معاینات غربالگری ۸۰ درصد است.

الف دال؟

سوال 64

کدامیک از موارد زیر در صورتی که حساسیت (sensivity) تست غربالگری زیاد باشد، کم می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 مثبت واقعی

گزینه 2 منفی واقعی

گزینه 3 منفی کاذب

گزینه 4 مثبت کاذب

سوال 65

اگر یک آزمون غربالگری در ۱۰% موارد افراد مبتلا را غیر مبتلا نشان دهد و ۲۰% موارد افراد سالم را مبتلا نشان دهد حساسیت و ویژگی آزمون به ترتیب از راست به چپ چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 ۸۰ و ۹۰

گزینه 2 ۸۰ و ۱۰

گزینه 3 ۹۰ و ۸۰

گزینه 4 ۲۰ و ۱۰

سوال 66

حساسیت یک آزمون در صورت بالا بودن، کدامیک از موارد زیر را کاهش می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد و اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 مثبت کاذب

گزینه 2 منفی کاذب

گزینه 3 مثبت حقیقی

گزینه 4 منفی حقیقی

سوال 67

نسبتی از افراد دارای نتیجه‌ی آزمون منفی که بیمار نمی‌باشند، با کدامیک از شاخص‌ها زیر همخوانی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 ارزش اخباری مثبت

گزینه 2 حساسیت

گزینه 3 ارزش اخباری منفی

گزینه 4 ویژگی

سوال 68

کدامیک از خصوصیات نظام مراقبت از شاخص‌های توانایی نظام مراقبت در تشخیص موارد به شمار می‌آید؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 انعطاف‌پذیری

گزینه 2 ارزش اخباری مثبت

گزینه 3 معرف بودن

نمایش پاسخ

ب

سوال 69

حساسیت و ویژگی یک تست جدید برای تشخیص حاملگی به ترتیب ۹۵% و ۸۰% است، اگر ۴۰۰ خانم باردار را با این تست آزمایش کنیم، در چند نفر از آن‌ها نتیجه‌ی منفی گزارش خواهد شد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 ۲۰ نفر

گزینه 2 ۳۸ نفر

گزینه 3 ۸۰ نفر

گزینه 4 ۳۲۰ نفر

نمایش پاسخ

الف

سوال 70

در اجرای یک برنامه‌ی غربالگری برای دیابت، در آزمایش اول سطح غربالگری قند خون ۱۶۰ میلی‌گرم در صد و در آزمایش دوم ۳۰ ۱ میلی‌گرم درصد انتخاب شد. کدامیک از عبارات زیر در مورد این دو آزمایش صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 نسبت مثبت کاذب آزمایش دوم بیش‌تر است

گزینه 2 حساسیت آزمایش اول بیش‌تر است

گزینه 3 نسبت مثبت کاذب آزمایش اول بیش‌تر است

گزینه 4 ویژگی آزمایش دوم بیش‌تر است

نمایش پاسخ

الف

سوال 71

سوگرایی فرصت زمانی (lead time bias) در غربالگری بیماری‌ها زمانی رخ می‌دهد که (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 خطاب منظم در روش‌های اثبات، تشخیص یا تأیید موارد وجود داشته باشد

گزینه 2 پیگیری گروه‌ها در یک مرحله قابل مقایسه در مسیر طبیعی آن شروع نشده باشد

گزینه 3 انتخاب مواردی با دوره‌های طولانی نامتناسب در یک گروه و عدم انتخاب در گروه دیگر داشته باشیم

گزینه 4 تست تشخیصی روی افراد دارای علائم بیماری انجام شود

نمایش پاسخ

ب

سوال 72

در یک جامعه‌ی ۱۰ هزار نفری شیوع بیماری ۵ درصد است، اگر یک آزمون با حساسیت ۹۰ درصد و ویژگی ۸۰ درصد به کار ببریم، چند نفر از بیماران را به درستی شناسایی می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 ۵۰ نفر

گزینه 2 ۱۰۰ نفر

گزینه 3 ۴۰۰ نفر

گزینه 4 ۴۵۰ نفر

نمایش پاسخ

د

سوال 73

تمام معیارهای زیر برای غربالگری بیمار صحیح است بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 مورد غربالگری به لحاظ سلامتی مسأله مهم و جدی باشد.

گزینه 2 بین زمان تماس افراد و شروع بیماری و بروز علائم زمان طولانی وجود نداشته باشد.

گزینه 3 امکانات برای تأیید قطعی تشخیص موجود باشد.

گزینه 4 درمان مؤثر برای بیماری مورد نظر وجود داشته باشد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 74

در جامعه‌ای وقتی نتیجه‌ی یک آزمون تشخیصی در فردی منفی می‌شود. احتمال سالم بودن وی حدود ۹۵ درصد است. این عدد اشاره به کدامیک از شاخص‌های زیر دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 عکس احتمال بیماری در جامعه

گزینه 2 حساسیت

گزینه 3 ویژگی

گزینه 4 ارزش اخباری

نمایش پاسخ

د

سوال 75

حساسیت در یک تست غربالگری عبارت است از: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 نسبت افرادی که واقعاً سالمند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز منفی شده است. $d/b+d$

گزینه 2 احتمالی که شخص واقعاً بیمار باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم مثبت باشد. $a/a+b$

گزینه 3 احتمالی که شخص واقعاً سالم باشد و نتیجه‌ی آزمایش او منفی باشد. $d/b+d$

گزینه 4 نسبت افرادی که واقعاً بیمارند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز مثبت شده است. $a/a+c$

نمایش پاسخ

د

سوال 76

در یک آزمون غربالگری برای تشخیص حاملگی که بر روی ۳۰۰ زن باردار با آزمونی که حساسیت آن ۸۰ درصد و ویژگی آن ۹۰ درصد است، انجام شده است، در چند نفر تشخیص حاملگی اشتباه خواهد بود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 ۳۰ نفر

گزینه 2 ۶۰ نفر

گزینه 3 ۲۴۰ نفر

گزینه 4 ۲۷۰ نفر

نمایش پاسخ

ب

سوال 77

در آزمون‌های غربالگری، احتمال مثبت حقیقی بودن فردی که آزمونش مثبت شده است، را چه می‌گویند؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان/دندان پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان دوره کشوری)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ج

سوال 78

اگر یک آزمون غربالگری در ۲۰ % موارد افراد مبتلا را غیر مبتلا و در ۳۰ % موارد افراد سالم را مبتلا نشان دهد حساسیت و ویژگی آزمون به ترتیب از راست به چپ چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 ۸۰ و ۷۰

گزینه 2 ۲۰ و ۳۰

گزینه 3 ۲۰ و ۷۰

گزینه 4 ۸۰ و ۳۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 79

نتیجه‌ی ماموگرافی و پاتولوژی (به عنوان استاندارد طلایی) در تشخیص سرطان پستان در نمونه‌ای از ۴۵۰ بیمار به شرح ذیل است. اگر یک بیمار از همان جامعه نتیجه‌ی ماموگرافی مثبت داشته باشد، چقدر احتمال دارد به سرطان پستان مبتلا باشد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

نتیجه‌ی پاتولوژی از نظر سرطان پستان			
		مثبت	منفی
نتیجه‌ی ماموگرافی از نظر سرطان پستان	مثبت	۵۰	۱۵۰
	منفی	۵۰	۳۰۰

گزینه 1 ۰/۷۵

گزینه 2 ۰/۵۰

گزینه 3 ۰/۲۰

گزینه 4 ۰/۲۵

نمایش پاسخ

سوال 80

ویژگی عبارتست از نسبت افراد حقیقتاً سالمی که به وسیله‌ی آزمون غربالی سالم تشخیص داده شده‌اند. به عبارت دیگر: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 مثبت حقیقی

گزینه 2 منفی حقیقی

گزینه 3 مثبت کاذب

گزینه 4 منفی کاذب

نمایش پاسخ

ب

سوال 81

این تعریف مربوط به کدامیک از شاخص‌های غربالگری است؟ (احتمالی که شخص بیمار باشد و نتیجه هم مثبت باشد.) (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 ویژگی

گزینه 2 حساسیت

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت (positive predictive value)

گزینه 4 ارزش اخباری منفی (negative predictive value)

نمایش پاسخ

ج

سوال 82

کدامیک از موارد زیر در مورد غربالگری صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 افرادی که نتیجه‌ی غربالگری آن‌ها مثبت کاذب است دچار اطمینان کاذب می‌شوند

گزینه 2 یکی از اهداف آن تشخیص گروه‌هایی است که بیش‌تر از دیگران در معرض بیماری هستند

گزینه 3 تست غربالگری معمولاً تست پیچیده و گران قیمتی است

گزینه 4 افرادی که نتیجه‌ی غربالگری آن‌ها منفی کاذب است ممکن است دچار نگرانی شوند

نمایش پاسخ

ب

سوال 83

کدامیک از موارد زیر از اهداف غربالگری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 برآورد هزینه‌های درمان بیماری

گزینه 2 شناخت تاریخچه‌ی بیماری

گزینه 3 شناخت عامل بیماری

گزینه 4 تشخیص زودرس بیماری

نمایش پاسخ

د

سوال 84

چنانچه شیوع یک بیماری در جامعه ۳۰ درصد باشد و از تستی برای غربالگری این بیماری استفاده شود که دارای حساسیت و ویژگی ۹۰ درصد است، انتظار چه ارزش اخباری مثبتی برای این تست دارید؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 ۷۹ درصد

گزینه 2 ۹۰ درصد

گزینه 3 ۲۷ درصد

گزینه 4 ۸۱ درصد

نمایش پاسخ

الف

سوال 85

در نظام مراقبت و گزارش‌دهی اطلاعات، بیش‌ترین حساسیت و کم‌ترین ارزش اخباری مثبت مطابق با کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

گزینه 2 بیمارستان شهرستان

گزینه 3 بیمارستان دانشگاهی

گزینه 4 خانه‌ی بهداشت

نمایش پاسخ

در نظام مراقبت بیماری‌ها در کشور به ترتیب بیش‌ترین حساسیت و بیش‌ترین ارزش اخباری مثبت مربوط به کدامیک است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی- خانه‌ی بهداشت

گزینه 2 بیمارستان شهرستان- پایگاه بهداشتی

گزینه 3 خانه‌ی بهداشت- بیمارستان دانشگاهی

گزینه 4 بیمارستان دانشگاهی- مرکز بهداشتی درمان شهری

نمایش پاسخ

ج

آگر آزمون A در بین ۲۰۰ بیمار مبتلا به بیماری B در ۱۴۰ مورد مثبت در بین ۱۰۰ فرد سالم در ۴۰ نفر مثبت شود، حساسیت و ویژگی آزمون به ترتیب از راست به چپ چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 ۴۰ و ۷۰

گزینه 2 ۷۰ و ۴۰

گزینه 3 ۶۰ و ۷۰

گزینه 4 ۷۰ و ۶۰

نمایش پاسخ

ج *دال بیشتر؟*

در تست‌های غربالگری بیماری‌ها «احتمالی که شخص واقعاً بیمار باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم مثبت باشد» اشاره به کدام خصوصیت دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ارزش اخباری مثبت

گزینه 3 ویژگی

گزینه 4 دقت

نمایش پاسخ

ب

فردی با نتیجه‌ی یک نوبت آزمایش منفی براساس آزمون وسترن بلات مراجعه نموده است و در مورد احتمال سالم بودن خود با توجه به نتیجه‌ی آزمون سؤال می‌کند سؤال وی مترادف با کدامیک از خصوصیت آزمون است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 ویژگی

گزینه 2 حساسیت

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

د

در یک برنامه‌ی غربالگری برای بیماری دیابت روی ۱۰۰۰ نفر، ۱۲۰ نفر مثبت واقعی و ۶۸۰ نفر منفی واقعی گزارش شده است. در صورتی که براساس آزمایش معتبر (گلد استاندارد) ۲۰۰ نفر بیمار و ۸۰۰ نفر سالم باشند، ارزش اخباری مثبت غربالگری چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۱۵

گزینه 2 ۵۰

گزینه 3 ۶۰

گزینه 4 ۹۰

نمایش پاسخ

ب

کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد تعریف ویژگی درست است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 احتمالی است که شخص واقعاً بیمار باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم مثبت باشد

گزینه 2 نسبت افرادی که واقعاً سالمند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز منفی شده است

گزینه 3 نسبت افرادی که واقعاً بیمارند و نتیجه‌ی آزمایش غربالگری آن‌ها نیز مثبت شده است

گزینه 4 احتمالی است که شخص واقعاً سالم باشد و نتیجه‌ی آزمایش او هم منفی باشد

نمایش پاسخ

سوال 92

اگر حساسیت یک آزمایش در آزمون غربالگری کم باشد، کدامیک از موارد زیر زیاد می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 مثبت حقیقی

گزینه 2 مثبت کاذب

گزینه 3 منفی حقیقی

گزینه 4 منفی کاذب

نمایش پاسخ

سوال 93

در یک جمعیت ۲۰۰ نفری، شیوع دیابت ۱۰ درصد است. در غربالگری جمعیت از نظر بیماری دیابت، نتیجه‌ی آزمون غربالگری در ۱۵ نفر از افراد بیمار مثبت است. حساسیت آزمون غربالگری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 ۷۵%

گزینه 2 ۷%

گزینه 3 ۱۰%

گزینه 4 ۸۰%

نمایش پاسخ

سوال 94

ارزش اخباری مثبت یک آزمون غربالگری در جمعیت «الف» بیش‌تر از جمعیت «ب» است. بالا بردن کدام عامل در جمعیت «الف» می‌تواند دلیل این موضوع باشد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 ویژگی آزمون

گزینه 2 حساسیت آزمون

گزینه 3 شیوع بیماری

گزینه 4 میزان کشندگی بیماری

نمایش پاسخ

سوال 95

براساس معیارهای غربالگری، کدامیک از فعالیت‌های زیر به عنوان آزمایش‌های غربالگری محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 ماموگرافی جهت تشخیص سرطان پستان

گزینه 2 پاپ‌اسمیر جهت تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم

گزینه 3 سنجش بینایی کودکان جهت تشخیص حدت بینایی

گزینه 4 نمونه‌گیری از گلو جهت تشخیص اپیدمی آنفولانزا

نمایش پاسخ

سوال 96

فرض کنید شیوع بیماری ایدز در ایران ۰۱ ٪ و حساسیت تست الایزا در تشخیص بیماران ۹۷% باشد. چنانچه شیوع ایدز در ایران به دو برابر افزایش یابد، حساسیت تست الایزا چقدر خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 ۲%

گزینه 2 ۹۷ %

گزینه 3 ۹۵ %

گزینه 4 ۹۹%

نمایش پاسخ

سوال 97

چک آپ روتین سالمندان و غربالگری سرطان دهانه‌ی رحم به ترتیب جزء کدام نوع از غربالگری‌ها محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 چند منظوره، هدف‌دار

گزینه 2 چند مرحله‌ای، بیماری منفرد

گزینه 3 هدف‌دار، موردیابی

گزینه 4 چندوجهی، توده‌ی مردم

سوال 98

کدامیک از معیارهای انجام غربالگری نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 بیماری مورد نظر شیوع نسبتاً زیادی داشته باشد.

گزینه 2 بین زمان تماس و بروز علائم زمان کوتاهی وجود داشته باشد.

گزینه 3 تاریخچه‌ی بیماری به خوبی شناخته شده باشد.

گزینه 4 بیماری مورد نظر مسئله‌ای جدی باشد.

سوال 99

در ویزیت دوره‌ای دوران نوجوانی کدامیک از غربالگری‌ها به صورت روتین انجام می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 تست پوستی سل

گزینه 2 پاپ‌اسمیر

گزینه 3 کلسترول

گزینه 4 انحراف ستون فقرات

د. غربالگری‌های پاپ‌اسمیر برای سرطان در خانم‌ها و کلسترول در افراد مسن انجام می‌گیرد.

سوال 100

کدامیک از موارد زیر جزء اهداف غربالگری است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 تشخیص زودرس بیماری در جامعه

گزینه 2 درمان به موقع موارد ابتلاء

گزینه 3 تشخیص گروه‌هایی که بیش‌تر از دیگران در معرض خطر بیماری هستند یا بیماری در آن‌ها وقوع بیش‌تری دارد.

گزینه 4 همه‌ی موارد بالا

د. اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است.

سوال 101

«غربالگری از گروه‌هایی که با عامل خاصی مواجهه دارند» به چه نوعی از غربالگری اشاره دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 غربالگری یک بیماری منفرد

گزینه 2 غربالگری هدف‌دار

گزینه 3 موردیابی

گزینه 4 هیچکدام

ب. غربالگری **هدف‌دار** مثلاً در غربالگری پنومونی از کارگران معدن دیده می‌شود. که گروه‌هایی هستند که با عامل خاصی مواجهه دارند.

سوال 102

یک آزمون غربالگری با ویژگی (Specifity) بالا از رخداد کدامیک از موارد زیر می‌کاهد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 مثبت حقیقی

گزینه 2 منفی حقیقی

گزینه 3 مثبت کاذب

گزینه 4 منفی کاذب

ج. هرچه ویژگی بیش‌تر باشد مثبت کاذب کم‌تر و هرچه حساسیت بیش‌تر باشد منفی کاذب کم‌تر است.

سوال 103

در یک جمعیت ۲۱۱ نفری، ۲۱ نفر مبتلا به بیماری دیابت هستند. در غربالگری جمعیت از نظر بیماری دیابت، نتیجه‌ی آزمون غربالگری در ۱۵ نفر از افراد بیمار مثبت

است. حساسیت آزمون غربالگری چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 ۷ درصد

گزینه 2 ۸ درصد

گزینه 3 ۷۵ درصد

گزینه 4 ۸۲ درصد

ج. حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب. یعنی ۱۵/۲۱ که حدوداً ۷۵ درصد می‌شود.

سوال 104

از آنجا که بیماری‌های مزمن مثل سرطان، دیابت و بیماری‌های قلبی- عروقی درمان قطعی و کامل ندارند، لذا علاوه‌بر مراقبت منظم، کدامیک از اقدامات زیر در تشخیص زودرس آن‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- مشترک کشوری)

گزینه 1 واکسیناسیون

گزینه 2 غربالگری

گزینه 3 درمان

گزینه 4 بازتوانی

نمایش پاسخ

ب / اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است و برای بیماری‌های مزمن مثل سرطان بسیار کاربرد دارد.

سوال 105

با توجه به جدول زیر کدامیک از گزینه‌های زیر درست است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

	بیمار	سالم	جمع
مثبت	۱	ب	۱ + ب
منفی	پ	ت	پ + ت
جمع	۱ + پ	ب + ت	

الف) حساسیت = $\frac{1}{1+p}$

ب) ارزش اخباری (نتایج مثبت آزمون) $\frac{1}{1+p}$

ج) ویژگی $\frac{t}{p+t}$

د) ارزش اخباری (نتایج منفی آزمون) $\frac{t}{p+t}$

نمایش پاسخ

الف / حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب و گزینه‌ی الف صحیح است.

سوال 106

در صورت بالا بودن حساسیت یک آزمون تشخیصی کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 درصد مثبت کاذب این آزمون پایین است.

گزینه 2 نتیجه‌ی منفی این آزمون ارزشمند است.

گزینه 3 احتمال بیمار بودن فرد بالا است.

گزینه 4 درصد منفی کاذب این آزمون بالا است.

نمایش پاسخ

ب / حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب و در صورت بالا بودن آن نتیجه‌ی منفی آزمون ارزشمند است.

سوال 107

در مورد تفاوت بین یک آزمون غربالگری با یک آزمون تشخیصی کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 آزمون تشخیصی روی افراد به ظاهر سالم انجام می‌شود

گزینه 2 هدف آزمون غربالگری تعیین علت علائم است

گزینه 3 آزمون تشخیصی روی تعداد نسبتاً زیادی از افراد انجام می‌شود

گزینه 4 در آزمون غربالگری بروز موارد مثبت کاذب بیش‌تر است

نمایش پاسخ

د / اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است و در آزمون غربالگری بروز موارد مثبت کاذب بیش‌تر است.

سوال 108

پاسخ آزمون غربالگری در یک جامعه‌ی ۲۰۰ نفری، ۸۰ نفر مثبت و ۱۲۰ نفر منفی است. آزمون معتبر وجود بیماری را برای ۴۰ نفر با نتیجه‌ی مثبت و ۱۰ نفر با نتیجه‌ی منفی مورد تأیید قرار داده است. ارزش اخباری منفی آزمون چقدر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 ۸۰%

گزینه 2 ۷۳%

گزینه 3 ۹۲%

گزینه 4 ۵۰%

نمایش پاسخ

ج / ارزش اخباری منفی آزمون برابر است با ۱۱۰/۱۲۰ که ۹۲ درصد می‌شود.

سوال 109

آزمونی که برای غربالگری یک بیماری در جمعیت بکار گرفته شد و نتایج منفی کاذب آن بسیار پایین بوده است دارای کدام خصوصیت است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 حساسیت بالا

گزینه 2 ارزش اخباری منفی پایین

گزینه 3 بازده پایین

گزینه 4 ویژگی بالا

نمایش پاسخ

الف / حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب و در صورت بالا بودن آن نتایج منفی کاذب آن بسیار پایین است.

سوال 110

برای کارگران معدن ذغال سنگ درخواست تصویربرداری از ریه برای تشخیص زودهنگام پنوموکونیوز شده است. این نوع غربالگری چه نام دارد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 Population Based

گزینه 2 Selective

گزینه 3 Opportunistic

گزینه 4 Multiphasic

نمایش پاسخ

ب / غربالگری هدفدار مثلاً در غربالگری پنومونی از کارگران معدن دیده می‌شود. که گروه‌هایی هستند که با عامل خاصی مواجهه دارند.

سوال 111

در کدام مورد زیر غربالگری بهترین اثر را خواهد داشت؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 احساس ناخوشی، بدون بیماری

گزینه 2 احساس بهبودی، بدون بیماری

گزینه 3 احساس بهبودی، دارای بیماری

گزینه 4 احساس ناخوشی، دارای بیماری

نمایش پاسخ

ج / در مواردی که فرد بیمار است ولی احساس بهبودی دارد غربالگری بهترین اثر را خواهد داشت.

سوال 112

کدامیک از شاخص‌های زیر برای ارزیابی ارزش تشخیصی یک تست آزمایشگاهی تحت تأثیر شیوع بیماری قرارداد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 ارزش اخباری مثبت

گزینه 2 میزان مثبت کاذب

گزینه 3 حساسیت

گزینه 4 ویژگی

نمایش پاسخ

الف / افزایش شیوع یک بیماری موجب افزایش ارزش اخباری مثبت آن می‌شود.

سوال 113

احتمال مثبت بودن آزمون در یک فرد بیمار و احتمال سالم بودن فردی که آزمون منفی داشته است، به ترتیب..... و..... نامیده می‌شود. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 حساسیت و ویژگی

گزینه 2 ارزش اخباری مثبت و ویژگی

گزینه 3 حساسیت و ارزش اخباری منفی

گزینه 4 ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ج / حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب احتمال سالم بودن فردی که آزمون منفی داشته است ارزش اخباری منفی است.

سوال 114

به «احتمال منفی شدن یک تست در افراد سالم» چه واژه‌ای اطلاق می‌گردد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ب / احتمال منفی شدن یک تست در افراد سالم ویژگی نام دارد. حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب احتمال سالم بودن فردی که آزمون منفی داشته است ارزش اخباری منفی است.

سوال 115

حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت یک تست آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری کبد چرب در یک جمعیت با شیوع برابر با ۱۰٪، به ترتیب ۶۰، ۸۰ و ۷۵ درصد است. ارزش اخباری مثبت تست مذکور در یک جمعیت با شیوع ۲۰٪، کدامیک از مقادیر ذیل می‌تواند باشد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 ۸۵%

گزینه 2 ۷۵%

گزینه 3 ۶۵%

گزینه 4 ۵۵%

نمایش پاسخ

الف / افزایش شیوع یک بیماری موجب افزایش ارزش اخباری مثبت آن می‌شود.

سوال 116

کدامیک از گزینه‌های زیر نشان‌دهنده‌ی ویژگی تست سنجش عفونت HIV است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 درصدی از افراد بیمار که تست HIV در آن‌ها منفی شده است

گزینه 2 درصدی از افراد بیمار که تست HIV در آن‌ها مثبت شده است

گزینه 3 درصدی از افراد سالم که تست HIV در آن‌ها مثبت شده است

گزینه 4 درصدی از افراد سالم که تست HIV در آن‌ها منفی شده است

نمایش پاسخ

د / احتمال منفی شدن یک تست در افراد سالم ویژگی نام دارد.

سوال 117

در یک برنامه‌ی غربالگری دیابت، تست A از 140mg/dl به بالا تست B از 126mg/dl به بالا مثبت تلقی شده است. بر این اساس می‌توان گفت: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

گزینه 1 حساسیت تست A بیش از تست B است.

گزینه 2 ویژگی تست B بیش از تست A است.

گزینه 3 تعداد نتایج مثبت کاذب با تست A بیش از تست B است.

گزینه 4 تعداد نتایج منفی کاذب با تست A بیش از تست B است.

نمایش پاسخ

د / تست A یک سری از دیابتی‌ها را نمی‌تواند تشخیص بدهد و تعداد نتایج منفی کاذب با تست A بیش از تست B است. صحیح

سوال 118

نتایج یک آزمون غربالگری در جمعیت ۱۰۰ نفره نشان داد که ۲۰ درصد از افراد مثبت می‌باشند. اگر آزمون غربالگری مدنظر، دارای ارزش اخباری منفی (Negative Predictive Value) ۵۰ درصد باشد. چند نفر منفی کاذب (False Negative) داریم؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

گزینه 1 ۸۰ نفر

گزینه 2 ۴۰ نفر

گزینه 3 ۲۰ نفر

گزینه 4 ۵۰ نفر

نمایش پاسخ

ب / ارزش اخباری منفی می‌شود d/c+d و مخرج ۸۰ و جواب کسر ۵۰ است پس تعداد منفی کاذب ۴۰ نفر است.

سوال 119

کدامیک در مورد اجرای برنامه‌های غربالگری در یک جامعه صحیح نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 غربالگری معمولاً برای بیماری‌های مزمن انجام می‌شود.

گزینه 2 اولین و دومین دور غربالگری یک بیماری در جامعه، غربالگری بروز نامیده می‌شود.

گزینه 3 بیماری مورد غربالگری باید شیوع نسبتاً زیادی داشته باشد.

گزینه 4 تست غربالگری باید حساسیت و ویژگی مناسبی داشته باشد.

نمایش پاسخ

ب / اهداف غربالگری شامل تشخیص زودرس درمان به موقع و جلوگیری از پیشرفت و انتشار بیماری است و برای بیماری‌های مزمن مثل سرطان بسیار کاربرد دارد و اولین غربالگری غربالگری بروز نامیده می‌شود.

سوال 120

کدام نوع سوگرایی در غربالگری، ناشی از عدم پیگیری گروه‌ها در یک مرحله قابل مقایسه در سیر طبیعی بیماری است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 سوگرایی تشخیص

گزینه 2 سوگرایی فرصت زمانی

گزینه 3 سوگرایی مدت

گزینه 4 سوگرایی یادآوری

نمایش پاسخ

ب / سوگرایی فرصت زمانی در غربالگری، ناشی از عدم پیگیری گروه‌ها در یک مرحله قابل مقایسه در سیر طبیعی بیماری است.

سوال 121

در یک برنامه‌ی غربالگری سرطان پستان، ۱۰۰۰ خانم ماموگرافی شدند. اگر فراوانی این بیماری در این جمعیت ۲۰% باشد و نتیجه‌ی ماموگرافی در ۱۵۰ نفر از مبتلایان و ۸۰ نفر از زنان سالم مثبت شود، حساسیت و ویژگی این تست را محاسبه کنید. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 حساسیت= ۷۵ , ویژگی=۱۰

گزینه 2 حساسیت= ۷۵ , ویژگی=۹۰

گزینه 3 حساسیت= ۲۵ , ویژگی=۱۰

گزینه 4 حساسیت= ۶۵ , ویژگی=۹۰

نمایش پاسخ

ب / ۱۵۰ نفر از ۲۰۰ نفر مبتلا تشخیص داده شده‌اند پس حساسیت آن ۷۵ درصد است و ۸۰ نفر از ۸۰۰ نفر سالم مثبت شده‌اند پس ویژگی آن ۱۰ درصد است.

سوال 122

قدرت یک آزمون برای تشخیص صحیح کسانی که واقعاً بیمار هستند، یعنی: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 حساسیت

گزینه 2 ویژگی

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ج / قدرت یک آزمون برای تشخیص صحیح کسانی که واقعاً بیمار هستند ارزش اخباری مثبت است و حساسیت یعنی مثبت واقعی تقسیم بر مثبت واقعی و منفی کاذب.

سوال 123

چنانچه در هنگام غربالگری بیماران با شدت بیماری کم‌تر در گروه غربالگری شده و بیماران با شدت بیماری شدیدتر در گروه غیر غربالگری قرار گرفته باشند، کدام سوگیری زیر رخ داده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 تشخیص

گزینه 2 فرصت زمانی

گزینه 3 مدت

گزینه 4 انتخاب

نمایش پاسخ

الف / سوگیری تشخیص زمانی رخ می‌دهد که در هنگام غربالگری بیماران با شدت بیماری کم‌تر در گروه غربالگری شده و بیماران با شدت بیماری شدیدتر در گروه غیر غربالگری قرار گرفته باشند و سوگرایی فرصت زمانی در غربالگری، ناشی از عدم پیگیری گروه‌ها در یک مرحله قابل مقایسه در سیر طبیعی بیماری است.

سوال 124

غربالگری «به منظور جستجوی حاملین سالم یک بیماری در یک جمعیت» مثالی از چه نوع غربالگری است؟ (دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 غربالگری هدف‌دار Selective

گزینه 2 موردیابی Case finding

گزینه 3 غربالگری یک بیماری منفرد Single disease screening

گزینه 4 غربالگری چند مرحله‌ای Multiphasic screening

نمایش پاسخ

ب

سوال 125

این تعریف با کدام مفهوم آماری انطباق بیشتری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)
(احتمال نتیجه‌ی منفی، در شرایطی که بیماری وجود ندارد)

گزینه 1 منفی کاذب

گزینه 2 ویژگی (specificity)

گزینه 3 حساسیت (sensitivity)

گزینه 4 ارزش اخباری منفی (Negative Preditive Valus)

نمایش پاسخ

ب

سوال 126

براساس معیارهای Wilson و Jounger کدام‌یک از بیماری‌های زیر برای غربالگری مناسب‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 بیماری‌های پریدونتال

گزینه 2 پوسیدگی‌های دندان

گزینه 3 سرطان‌های دهانی

گزینه 4 مال الکوژن‌های دندان

نمایش پاسخ

ج

سوال 127

در یک جامعه، هدف از انجام غربالگری‌های سلامت دهان و دندان چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 از بین بردن عوامل خطر سلامت دهان و دندان

گزینه 2 تشخیص و درمان به موقع مشکلات سلامت دهان و دندان

گزینه 3 انجام خدمات توانبخشی در جهت حفظ سلامت دهان و دندان

گزینه 4 جلوگیری از به وجود آمدن عوامل خطر سلامت دهان و دندان

نمایش پاسخ

ب. کلا غربالگری یعنی چی؟ بیماریابی و درمان به موقع

سوال 128

کدامیک از موارد زیر از ویژگی‌های آزمون غربالگری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 برای اشخاص به ظاهر سالم بکار می‌رود.

گزینه 2 دقت بیش‌تر و هزینه‌ی بیش‌تری از آزمون تشخیصی دارد.

گزینه 3 به صورت انفرادی روی بیماران اعمال می‌شود.

گزینه 4 برای افراد بیمار با دارای نشانه‌ی بیماری انجام می‌شود.

نمایش پاسخ

الف. آزمون غربالگری به صورت گروهی روی افراد سالم انجام می‌شه. دقت و هزینه‌ی پایینی داره.

سوال 129

دو شیوه تشخیصی (تست سریع و تست PCR) را برای آزمایش نمونه گلو در تشخیص کووید-۱۹ به صورت آزمایش‌های متوالی به کار گرفته‌ایم. اگر حساسیت تست سریع و تست PCR به ترتیب ۶۰ و ۸۰ درصد باشند، حساسیت خالص چند درصد است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 ۴۸

گزینه 2 ۶۴

گزینه 3 ۷۲

گزینه 4 ۹۶

نمایش پاسخ

الف حساسیت خالص ۴۸ درصد است.

سوال 130

بیمار با در دست داشتن نتیجه یک تست غربالگری خون مخفی مدفوع که نتیجه مثبت را نشان داده‌است، به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک به او می‌گوید: "احتمال اینکه شما به سرطان روده بزرگ مبتلا باشید، ۴۸ درصد است". این درصد بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 حساسیت آزمایش

گزینه 2 ویژگی آزمایش

گزینه 3 ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ارزش اخباری منفی

نمایش پاسخ

ج / ارزش اخباری مثبت بیانگر این درصد است.

سوال 131

کدامیک از عبارات زیر در مورد ویژگی "validity" در آزمون‌های غربالگری بیماری‌ها صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 پذیرش مردمی و وجود حداکثر میزان همکاری

گزینه 2 ارائه نتایج مشابه در صورت تکرار آزمون روی همان موضوع یا فرد

گزینه 3 توانایی آزمون در شناسایی درست همه کسانی که بیمار نیستند

گزینه 4 توانایی آزمون در تشخیص موارد بیمار از غیر بیمار

نمایش پاسخ

د/ validity یعنی: توانایی آزمون در تشخیص موارد بیمار از غیر بیمار

سوال 132

کدامیک از موارد زیر در مورد اصول آزمون‌های غربالگری از نظر Jounger & Wilson صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 قابلیت پذیرش تست برای جمعیت مورد توجه نیست.

گزینه 2 بیماری باید دارای مرحله نهفته قابل تشخیص باشد.

گزینه 3 به دلیل اهمیت موضوع، تناسب انجام تست با شرایط اقتصادی جامعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

گزینه 4 لازم نیست که درمان پذیرفته‌شده‌ای برای بیماران شناسایی شده وجود داشته باشد.

نمایش پاسخ

ب / معیارهای غربالگری عبارتند از: بیماری مزمن باشد.- بیماری جدی یا خطرناک باشد- شیوع بالایی داشته باشد.-کاملاً شناخته شده باشد.- دوره کمون طولانی داشته باشد.- تست غربالگری ساده و ارزان و قابل اعتماد باشد.

سوال 133

برای محاسبه حساسیت (Sensitivity) یک آزمون غربالی، برای صورت کسر، به کدامیک از اطلاعات زیر نیاز دارید؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 افراد سالمی که به وسیله آزمون، منفی تشخیص داده شده‌اند.

گزینه 2 افراد بیماری که به وسیله آزمون، منفی تشخیص داده شده‌اند.

گزینه 3 افراد سالمی که به وسیله آزمون، مثبت تشخیص داده شده‌اند.

گزینه 4 افراد بیماری که به وسیله آزمون، مثبت تشخیص داده شده‌اند.

نمایش پاسخ

د / حساسیت (Sensitivity) یعنی: توانایی یک آزمایش برای داشتن مثبت واقعی.

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

تعدادسوال: ۱۸۱

درجه سختی:متوسط

نکات:۱- در مطالعه مورد و شاهد یک گروه بیمار و گروه دیگر سالم اند اما در مطالعه عمگروهی هر دو گروه سالم اند.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

در طراحی مطالعه‌ی همگروهی، نمونه‌ی مورد مطالعه به کدام شکل تقسیم می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 سالم به صورت تصادفی

گزینه 2 بیمار به صورت تصادفی

گزینه 3 بیمار براساس مواجهه با عامل خطر

گزینه 4 سالم براساس مواجهه با عامل خطر

نمایش پاسخ

د

سوال 2

احتمال رخداد کدامیک از تورش‌های زیر در مطالعات مورد شاهدهی بیش‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 پاسخ‌دهی

گزینه 2 مصاحبه‌گر

گزینه 3 یادآوری

گزینه 4 مراقبت

نمایش پاسخ

ج

سوال 3

در کدامیک از موارد زیر، مطالعه از نوع مورد شاهدهی است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 گروهی از افراد جامعه را انتخاب و سپس به طور همزمان کلسترول خون (مواجهه مورد نظر) و دیابت نوع ۲ (پیامد تحت مطالعه) را با کنترل و اندازه‌گیری مخدوش‌گرها ارزیابی کرده‌اند.

گزینه 2 در شروع مطالعه گروهی از افراد سالم را انتخاب کرده و آن‌ها را تا ۵ سال پیگیری نموده‌اند و سپس رخداد موارد بیماری قلبی را ارزیابی کرده‌اند.

گزینه 3 گروهی از افراد مبتلا به فشار خون را به طور تصادفی در دو گروه قرار داده، به یک گروه داروی اسپیرین و گروه دیگر، دارونما تجویز کرده و بعد از ۶ ماه اثر دارو را در کاهش مقدار فشار خون ارزیابی کرده‌اند.

گزینه 4 یک گروه ۴۵ ساله و بیش‌تر از بیماران قلبی و گروهی از بیماران جراحی شده همان گروه سنی (که بدون بیماری قلبی هستند) را انتخاب و سپس در مورد چاقی در کودکی با آن‌ها مصاحبه شده است.

نمایش پاسخ

د

سوال 4

کدام مورد زیر از نقاط قوت مطالعات همگروهی آینده‌نگر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 تخمین خطر نسبی به دست می‌آید.

گزینه 2 راهکار قوی برای محاسبه بروز است.

گزینه 3 روش مناسبی برای مطالعه‌ی پیامدهای نادر است.

گزینه 4 مقرون به صرفه است

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

در یک مطالعه بر روی ۲۲ هزار پزشک به منظور تعیین تأثیر آسپیرین در پیشگیری از بیماری‌های قلبی و همچنین تأثیر بتاکاروتن در پیشگیری از سرطان، هر یک از پزشکان در یکی از ۴ گروه زیر قرار گرفتند، گروه ۱: آسپیرین و بتاکاروتن مصرف می‌کنند، گروه ۲: آسپیرین و بتاکاروتن مصرف نمی‌کنند، گروه ۳: آسپیرین و گول دارو مصرف می‌کنند، گروه ۴: بتاکاروتن و گول دارو مصرف می‌کنند. نام این روش تحقیقاتی چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 پژوهش متقاطع

گزینه 2 طرح فاکتوریال

گزینه 3 طرح تصادف لایه‌ای

گزینه 4 طرح مداخله‌ای نیمه تجربی

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

در یک مطالعه همگروهی که هدف آن بررسی ارتباط بین مصرف سیگار و ابتلا به سرطان ریه است گروه‌های مورد مطالعه شامل چه افرادی می‌باشند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 افراد سالم سیگاری و غیر سیگاری

گزینه 2 افراد مبتلا به سرطان ریه سیگاری و غیر سیگاری

گزینه 3 افراد مبتلا به سرطان ریه و افراد سالم

گزینه 4 افراد سیگاری که به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می‌شوند.

نمایش پاسخ

الف

سوال 7

در خصوص انتخاب شاهد‌ها در مطالعات مورد شاهی کدام مورد صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 شاهد‌ها می‌توانند از بین همسایگان فرد انتخاب شوند.

گزینه 2 همسران مورد، نمی‌توانند به عنوان گروه شاهد انتخاب شوند.

گزینه 3 برادران و خواهران گروه مورد، نمی‌توانند به عنوان گروه شاهد انتخاب شوند.

گزینه 4 شاهد‌ها در مطالعات مورد شاهی باید به صورت تصادفی از کل جامعه انتخاب شوند.

نمایش پاسخ

د

سوال 8

در کدامیک از شرایط زیر انجام مطالعه کوهورت مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 کوتاه بودن فاصله‌ی میان مواجهه و پیامد

گزینه 2 کم بودن شیوع

گزینه 3 داشتن منابع مالی محدود

گزینه 4 وجود شواهد هر چند اندک از رابطه‌ی بین مواجهه و پیامد

نمایش پاسخ

الف

سوال 9

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهد برای رفع تفاوت بین گروه‌های مطالعه از نظر عواملی به غیر از مواجهه مورد مطالعه، از کدامیک از روش‌های زیر استفاده می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 تعریف معیارهای ورود

گزینه 2 تخصیص تصادفی گروه‌ها

گزینه 3 همسان‌سازی

گزینه 4 استفاده از شاهد‌های متعدد

نمایش پاسخ

سوال 10

کدامیک از گزینه‌های زیر از مشخصات یک مطالعه کوهورت است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- مشترک کشوری)

گزینه 1 بروز بالاتر موارد بیماری تحت بررسی در گروه مواجهه

گزینه 2 بروز یکسان موارد بیماری تحت بررسی در گروه‌های مواجهه و غیر مواجهه

گزینه 3 بروز بالاتر موارد بیماری تحت بررسی در گروه غیر مواجهه

گزینه 4 مواجهه یکسان با عامل خطر در گروه‌های تحت مطالعه

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

برای نشان دادن رابطه‌ی علیتی، توانایی انواع مطالعات از قوی به ضعیف به ترتیب کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 اکولوژیک- همگروهی- مورد شاهی- مقطعی

گزینه 2 کارآزمایی بالینی- موردی شاهی- مقطعی- همگروهی

گزینه 3 اکولوژیک- کارآزمایی بالینی- همگروهی- موردی شاهی

گزینه 4 کارآزمایی بالینی- همگروهی- موردی شاهی- اکولوژیک

نمایش پاسخ

د

سوال 12

بزرگ‌ترین ضعف مطالعات موردی- شاهی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 تخصیص غیر تصادفی بیماران به گروه‌های مورد مطالعه

گزینه 2 انتخاب مورد و شاهد از منابع مجزا

گزینه 3 از دست رفتن نمونه‌ها به دلیل طولانی شدن دوره‌ی مطالعه

گزینه 4 نامناسب بودن آن برای بررسی بیماری‌های نادر

نمایش پاسخ

ب

سوال 13

در یک مطالعه‌ی موردی- شاهی که هدف آن بررسی ارتباط بین مصرف سیگار و ابتلا به سرطان مثانه است، گروه‌های مورد و شاهد به ترتیب به چه صورت انتخاب می‌شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 افراد سالم سیگاری و غیر سیگاری

گزینه 2 افراد مبتلا به سرطان مثانه سیگاری و غیر سیگاری

گزینه 3 افراد مبتلا به سرطان مثانه و افراد سالم

گزینه 4 افراد سیگاری به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می‌شوند.

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

مطالعه‌ی بزرگی در سال ۱۹۵۴ برای ارزیابی کارآیی واکسن تزریقی فلج اطفال روی حدود یک میلیون کودک انجام شد، مثالی از کدام نوع مطالعه است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 Community trial

گزینه 2 Clinical trial

گزینه 3 Field trial

گزینه 4 Prospective trial

نمایش پاسخ

ج

سوال 15

هدف از مطالعه دوسویه کور عبارت است از: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 کاهش اثرات ناشی از تنوع نمونه‌گیری

گزینه 2 اجتناب از سوگیری مربوط به ناظر و افراد تحت مطالعه

گزینه 3 فراهم کردن امکان مقایسه‌ی افراد درمان شده و درمان نشده

گزینه 4 اجتناب از سوگرایی ناظر و تنوع نمونه‌گیری

نمایش پاسخ

سوال 16

کدامیک از گزینه‌های زیر از مزایای مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر محسوب نمی‌شود: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 معمولاً هزینه‌ی آن کم‌تر از مطالعه مورد شاهدهی است.

گزینه 2 اندازه‌گیری دقیق مواجهه امکان‌پذیر است.

گزینه 3 میزان بروز را می‌توان محاسبه کرد.

گزینه 4 بسیاری از پیامدهای بیماری را می‌توان همزمان مطالعه کرد.

نمایش پاسخ

سوال 17

کدامیک از مطالعات زیر از نوع مطالعه‌ی موردی – شاهدهی است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 بررسی فراوانی موارد مرگ از سرطان در یک منطقه

گزینه 2 بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به سرطان و مقایسه آن با افراد سالم

گزینه 3 پیگیری بیماران مبتلا به فشار خون و افرادی که فشار خون ندارند و محاسبه‌ی فراوانی سکته‌ی قلبی در آنان

گزینه 4 بررسی ارتباط سرانه‌ی مصرف ماهی دودی با بروز متفاوت سرطان مری در مناطق مختلف

نمایش پاسخ

سوال 18

در کدامیک از موارد زیر، بیش‌تر از مطالعات مداخله‌ای (کارآزمایی بالینی) استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 نشان دادن فراوانی وقوع بیماری‌ها

گزینه 2 ارزیابی دقت تست‌های تشخیصی

گزینه 3 تعیین علت بیماری‌ها

گزینه 4 بررسی تأثیر داروها

نمایش پاسخ

سوال 19

مطالعات مقطعی روی کدامیک از گروه‌های زیر انجام می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند۹۴ و شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 فقط بیماران

گزینه 2 یک نمونه‌ی تصادفی از جمعیت

گزینه 3 گروهی از افراد بیمار و گروهی از افراد به ظاهر سالم

گزینه 4 فقط افراد سالم

نمایش پاسخ

سوال 20

براساس یک مطالعه‌ی کوهورت در جامعه‌ای نتیجه‌گیری شده است که خطر ابتلا به سردرد در زنان دو برابر مردان است. کدامیک از شاخص‌های زیر مبنای این مقایسه است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 خطر منتسب

گزینه 2 شیوع لحظه‌ای

گزینه 3 خطر نسبی

گزینه 4 شیوع دوره‌ای

نمایش پاسخ

سوال 21

در کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک، احتمال تحلیل رفتن افراد مورد مطالعه بیش‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 گذشته‌نگر

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 اکولوژیک

نمایش پاسخ

برای به دست آوردن میزان بروز سکت‌هی قلبی در یک استان و تعیین ریسک فاکتورهای احتمالی آن کدام نوع طراحی مطالعه را ترجیح می‌دهید؟ (پزشکی شهرپور ۹۳-
قطب همدان)

گزینه 1 همگروهی (Cohort)

گزینه 2 گزارش سری (Case – Series)

گزینه 3 مقطعی (Cross – Sectional)

گزینه 4 موردی- شاهدی (Case – Control)

نمایش پاسخ

الف

بهترین مطالعه‌ی مشاهده‌ای تحلیلی برای بررسی رابطه‌ی علت و معلول چه نوع مطالعه‌ای است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 مطالعه‌ی مداخله‌ای شاهددار تصادفی شده

گزینه 2 مطالعه‌ی کوهورت

گزینه 3 مطالعه‌ی مورد شاهدی

گزینه 4 مطالعه‌ی مقطعی

نمایش پاسخ

ب

برای پیدا کردن عوامل خطر یک بیماری با شیوع یک در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر، مناسب‌ترین مطالعه در بدو امر کدامیک از گزینه‌های ذیل است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب
شمال)

گزینه 1 مورد- شاهدی

گزینه 2 کوهورت آینده‌نگر

گزینه 3 کوهورت تاریخی

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

الف

در مطالعه‌ای برای بررسی ارتباط مواجهه با مواد رنگی و عقب‌ماندگی ذهنی کودکان، والدین ۱۰۰۰ کودک عقب‌مانده‌ی ذهنی و والدین ۱۰۰۰ کودک سالم در مورد مواجهه
با مواد رنگی مصاحبه شدند. نوع مطالعه را مشخص کنید؟ (پزشکی شهرپور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 همگروهی تاریخی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 مورد- شاهدی

نمایش پاسخ

د

در یک مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک به بررسی وضعیت شیوع بیماری پریدونشیوم در یک گروه از زنان دچار بیماری دیابت می‌پردازند. این مطالعه چه نوع مطالعه‌ای است؟
(دندان‌پزشکی شهرپور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 تجربی

گزینه 2 تحلیلی

گزینه 3 توصیفی

گزینه 4 گذشته‌نگر

نمایش پاسخ

ج

خطای یادآوری در کدامیک از انواع مطالعات بیش‌تر رخ می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 مورد- شاهدی

گزینه 2 کارآزمایی بالینی

گزینه 3 همگروهی آینده‌نگر

گزینه 4 همگروهی تاریخی

نمایش پاسخ

سوال 28

در یک کلان شهر مطالعه‌ای جهت تعیین شیوع پوسیدگی دندان طراحی شده است. این مطالعه باید با کدامیک از روش‌های اپیدمیولوژیک زیر انجام شود؟
(دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مداخله‌ای

گزینه 3 مورد- شاهد

گزینه 4 همگروهی

نمایش پاسخ

سوال 29

در مطالعات پزشکی، مطالعات مرتبط با سنجش، نگرش، عمل و رفتار (KAP) در کدام گروه قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 مطالعات مقطعی

گزینه 2 مطالعات مداخله‌ای

گزینه 3 مطالعات مشاهده‌ای

گزینه 4 مطالعات همگروهی

نمایش پاسخ

سوال 30

کدامیک از مطالعات زیر از نظر نشان دادن رابطه‌ی علت و معلولی قوی‌ترین شواهد را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

سوال 31

یک گروه از بیماران مبتلا به بالا بودن فشار خون و یک گروه از افراد سالم همسان شده (سنی و جنسی) برای بررسی ارتباط از نظر سابقه‌ی فامیلی بیماری مورد مقایسه قرار گرفتند. این مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک از چه نوعی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 مورد شاهدی

گزینه 2 مداخله‌ای

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 همگروهی

نمایش پاسخ

سوال 32

یک گروه از بیماران مبتلا به سرطان مثانه و یک گروه از افراد سالم همسان شده (سنی و جنسی) برای بررسی ارتباط از نظر سابقه‌ی مصرف سیگار مورد مقایسه قرار گرفتند. این مطالعه از چه نوعی می‌باشند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 مداخله‌ای

گزینه 2 مورد شاهدی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 همگروهی کوهورت

نمایش پاسخ

سوال 33

عدم تشخیص تقدم و تأخر زمانی در وقوع رابطه (مواجهه- پیامد)، از کدامیک از مطالعات اپیدمیولوژیک نمی‌تواند حاصل شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 مورد شاهدی

گزینه 2 همگروهی کوهورت

گزینه 3 مداخله‌ای

گزینه 4 مقطعی

برای مقایسه‌ی تأثیر دو روش درمانی، ۳۰۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان به طور تصادفی به دو گروه «الف» (جراحی به تنهایی) و «ب» (جراحی همراه با شیمی‌درمانی) تخصیص یافته‌اند، روش این مطالعه کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 کارآزمایی بالینی

گزینه 4 کارآزمایی میدانی

یک پرستار اعتقاد دارد که با استفاده از خواندن قرآن، بیماران در مدت زمان کوتاه‌تری بهبود می‌یابند جهت آزمون این فرضیه‌ی بهترین نوع مطالعه کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 مداخله‌ای

گزینه 4 همگروهی

شاخص خطر نسبی (Relative Risk) در کدامیک از مطالعات اپیدمیولوژیک زیر قابل اندازه‌گیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان/پزشکی شهریور ۹۵ _ قطب کرمان / پزشکی اسفند ۹۵ _ قطب تبریز)

گزینه 1 توصیفی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 مورد شاهدی

کدامیک از مطالعات زیر، برای بررسی وجود ارتباط آماری بین یک مواجهه و بیماری، شواهد قوی‌تری فراهم می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- مشترک کشوری)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد شاهدی

گزینه 3 سری موارد

گزینه 4 همگروهی

محقق‌ی جهت بررسی ارتباط بین تماس با مواد خاصی در صنایع لاستیک‌سازی و ابتلا به سرطان مثانه، پرونده‌ی کارگران خط تولید و کارمندان دفتری را که از سال ۱۳۷۳ در یک کارخانه‌ی لاستیک‌سازی مشغول به کار بوده‌اند، شناسایی کرده، ابتلا آن‌ها به سرطان مثانه را از طریق مطالعه‌ی پرونده‌ی پزشکی موجود در واحد سلامت کارخانه در سال ۱۳۹۳ بررسی کرده و بروز سرطان مثانه در دو گروه را محاسبه و مقایسه نموده است. نوع مطالعه چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 مورد شاهدی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 اکولوژیک

بررسی ارتباط بین واردات و تولیدات سیگار با مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در ۲۲ کشور منطقه‌ی مدیترانه‌ی شرقی چه نوع مطالعه‌ای است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 اکولوژیک

گزینه 2 مقطعی تحلیلی

گزینه 3 همگروهی

گزینه 4 تجربی

نمایش پاسخ

الف

سوال 40

کدامیک از مطالعات اپیدمیولوژیک زیر به مطالعه‌ی شیوع معروف است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز/پزشکی اسفند ۹۶_ قطب تهران)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 مداخله‌ای

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 مورد- شاهی

نمایش پاسخ

ج

سوال 41

جهت بررسی عوامل خطر بیماری‌های نادر، کدام روش مطالعاتی زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 کارآزمایی بالینی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 مورد- شاهی

نمایش پاسخ

د

سوال 42

برای بررسی تأثیر یک دارو بر یک بیماری خاص کدام مطالعه مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 همگروهی آینده‌نگر

گزینه 2 کارآزمایی بالینی

گزینه 3 مورد- شاهی

گزینه 4 همگروهی گذشته‌نگر

نمایش پاسخ

ب

سوال 43

در یک مطالعه دویست فرد مبتلا به سرطان زبان و دویست فرد غیر مبتلا به سرطان زبان از نظر سابقه‌ی نوشیدن چای داغ مورد سؤال قرار گرفته‌اند. همه‌ی بیماران مبتلا به سرطان زبان از نظر سن، وزن، جنس و نژاد با افراد غیر مبتلا جور شده‌اند. نوع مطالعه چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 مورد- شاهی

گزینه 4 تجربی

نمایش پاسخ

ج

سوال 44

محقق‌ی قصد دارد به بررسی اثر ورزش منظم روزانه به مدت ۳۰ دقیقه در کنترل حملات سردرد میگرن بپردازد. بهترین نوع مطالعه برای این بررسی چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 کارآزمایی بالینی تصادفی شده

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 مورد- شاهی

گزینه 4 کوهورت

نمایش پاسخ

الف

سوال 45

یک پزشک به تأثیر نوشیدن چای در کاهش درد بعد از عمل جراحی در بیماران اعتقاد دارد. برای اثبات این قضیه کدام نوع مطالعه را پیشنهاد می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 مطالعه‌ی مقطعی

گزینه 2 مطالعه‌ی مورد- شاهدی

گزینه 3 مطالعه‌ی همگروهی

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

د

سوال 46

یک مطالعه رابطه‌ی بین بروز سرطان معده و غذاهای تند مصرفی را در رژیم‌های غذایی کشورهای مختلف بررسی کرده است. این بررسی چه نوع مطالعه‌ای است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 اکولوژیک

گزینه 4 همگروهی

نمایش پاسخ

د

سوال 47

در بررسی ارتباط علیتی بین سن بالا در زمان اولین حاملگی و افزایش خطر سرطان پستان کدامیک از طرح‌های مطالعاتی زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 کوهورت

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

ج

سوال 48

در یک مجتمع مدرسه‌ای با ۱۵۰۰ دانش‌آموز به طور ناگهانی بیماری عفونی پوستی با منشأ نامشخص شایع شد. برای بررسی علت بیماری کدام مطالعه بهتر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 Case – control

گزینه 2 Small area analysis

گزینه 3 Historycall cohort

گزینه 4 Corss – sectional

نمایش پاسخ

ج

سوال 49

برای بررسی سبب‌شناسی یک بیماری نادر که در اکثر بیماران سریعاً منجر به مرگ می‌شود، کدام مطالعه‌ی زیر در اولویت است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸_قطب تهران)

گزینه 1 موردی- شاهدی

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 کوهورت

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

الف

سوال 50

در صورتی که سؤال بالینی در مورد مقایسه‌ی اثربخشی دو داروی فشار خون در پیشگیری از عوارض کلیوی باشد، مناسب‌ترین نوع مطالعه برای این کار کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 cohort

گزینه 2 case reports

گزینه 3 clinical trials

نمایش پاسخ

ج

سوال 51

محققى قصد دارد برای تعیین ارتباط بین بیماری نادر الف با ریسک فاکتور ب مطالعه‌ای انجام دهد. کدامیک از طراحی‌ها برای آن مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳-
قطب همدان)

گزینه 1 موردی- شاهدی (Case – Control)

گزینه 2 گزارش سری (Case – Series)

گزینه 3 مقطعی (Cross – Sectional)

گزینه 4 همگروهی (Cohort)

نمایش پاسخ

الف

سوال 52

داده‌های وضعیت جسمی- روانی تمام دانشجویانی که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه جندی شاپور اهواز نام‌نویسی کرده بودند در سال ۱۳۹۳ استخراج و مورد مطالعه قرار گرفت تا مشخص شود آیا رشته‌ی تحصیلی با ابتلای آن‌ها به بیماری قلبی در سال ۱۴۲۰ رابطه‌ای خواهد داشت یا خیر؟ این مطالعه از چه نوعی است؟ (پزشکی شهریور ۹۳-
قطب اهواز)

گزینه 1 Cross sectional

گزینه 2 Case – Control

گزینه 3 Historical cohort

گزینه 4 Cohort

نمایش پاسخ

ج

سوال 53

یک گروه از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس برای بررسی از نظر مصرف سیگار و تأثیر آن به مدت ده سال پیگیری شدند. این مطالعه از چه نوع است؟ (پزشکی
شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 موردی- شاهدی

گزینه 3 همگروهی

گزینه 4 مداخله‌ای

نمایش پاسخ

د

سوال 54

محققى قصد دارد برای تعیین ارتباط بین بیماری نادر A با ریسک فاکتور B مطالعه‌ای انجام دهد. کدام طراحی برای این نوع تحقیق مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳-
قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 موردی- شاهدی (Case – Control)

گزینه 2 همگروهی (Cohort)

گزینه 3 مقطعی (Cross sectional)

گزینه 4 گزارش مورد (Case report)

نمایش پاسخ

الف

سوال 55

برای مشخص کردن عوامل خطر بروز بیماری دیابت بارداری بهترین روش مطالعاتی کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 مقطعی (Cross sectional)

گزینه 2 موردی- شاهدی (Case – Control)

گزینه 3 همگروهی (Cohort)

گزینه 4 بررسی موارد (Case series)

نمایش پاسخ

ج

سوال 56

یک صد هزار خانمی که از کرم ضد آفتاب استفاده می‌کنند با پنجاه هزار خانمی که از کرم ضد آفتاب استفاده نمی‌کنند به مدت ۱۰ سال برای تعیین درصد بروز عوارض پوستی ناشی از آفتاب پیگیری شده‌اند. مطالعه از چه نوعی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 کوهورت

گزینه 3 مورد- شاهدی

گزینه 4 مداخله‌ای

نمایش پاسخ

ب

سوال 57

کدامیک از مطالعات زیر برای بررسی وجود ارتباط آماری بین یک مواجهه و بیماری، شواهد قوی‌تری فراهم می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 سری‌موارد

گزینه 4 همگروهی

نمایش پاسخ

د

سوال 58

در صورت کوتاه بودن فاصله میان مواجهه با عامل خطر و بروز یک بیماری، کدامیک از طرح‌های مطالعاتی زیر جهت بررسی ارتباط بین عامل خطر با بیماری مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 کارآزمایی بالینی

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 مورد- شاهدی

گزینه 4 کوهورت

نمایش پاسخ

د

سوال 59

محققی در نظر دارد در مطالعه‌ای به بررسی ارتباط مصرف گوشت‌های فراوری شده با سرطان روده‌ی بزرگ بپردازد. کدام مطالعه‌ی زیر بهترین شواهد را برای ارزیابی این ارتباط فراهم می‌سازد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 مطالعه‌ی مقطعی

گزینه 2 مطالعه‌ی مورد- شاهدی

گزینه 3 مطالعه‌ی اکولوژیک

گزینه 4 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر

نمایش پاسخ

د

سوال 60

کدام نوع مطالعه‌ی زیر برای بررسی ارتباط بین پیامدهای مختلف با یک عامل خطر خاص مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 مورد- شاهدی

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 کوهورت

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

ج

سوال 61

در کدامیک از انواع مطالعات زیر اندازه‌گیری میزان مواجهه، قبل از اندازه‌گیری بروز پیامد انجام می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 مورد- شاهدی (Case-Control)

گزینه 2 مقطعی (Cross-Sectional)

گزینه 3 همگروهی (Cohort)

گزینه 4 اکولوژیک (Ecologic)

نمایش پاسخ

ج

در مطالعه‌ای ۵۲۳ بیمار مبتلا به نارسایی کلیه و ۶۰۰ فرد سالم برای ۱۰ سال پیگیری شدند و بروز مرگ در آن‌ها مقایسه گردید. نوع مطالعه چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 کوهورت

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

ج

در یک مطالعه که عامل خطر را در دو گروه بررسی می‌کنیم که آیا دچار بیماری می‌شوند یا نه، نوع مطالعه چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 آینده‌نگر کوهورت

گزینه 3 گذشته‌نگر مورد شاهد

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

ب

برای بررسی ارتباط بین از دست رفتن دسته جمعی بستگان (مثلاً به دنبال زلزله) و اعتیاد، کدام نوع مطالعه مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

الف

ریزش در پیگیری، سوگرایی کدامیک از مطالعات زیر محسوب می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 مورد- شاهدی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 اکولوژیک

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

ب

کدامیک از گزینه‌های زیر در مطالعات مورد- شاهدی در مقایسه با مطالعات کوهورت صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 این مطالعات در موارد مواجهه با عامل خطر مناسب‌ترند.

گزینه 2 این مطالعات معمولاً کم هزینه هستند.

گزینه 3 این مطالعات برای بیماری‌های با دوره‌ی کمون طولانی مناسب‌ترند.

گزینه 4 این مطالعات معمولاً زمان کم‌تری طول می‌کشند.

نمایش پاسخ

الف

کدام مورد زیر از مزیت‌های مطالعات مورد شاهدی محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 سنجش خطر نسبی

گزینه 2 سنجش خطر اضافی

گزینه 3 ارزان بودن

گزینه 4 به دست آوردن میزان بروز

نمایش پاسخ

ج

در چه نوع مطالعه‌ای از عامل خطر به سمت بیماری حرکت می‌کنیم؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 مورد- شاهدی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 توصیفی

نمایش پاسخ

ب

سوال 69

در مطالعه یک همه‌گیری، جهت بررسی عمیق‌تر، معمولاً از چه نوع مطالعه‌ای استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 توصیفی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

د

سوال 70

برای بررسی علل ایجادکننده‌ی سرطان ریه کدامیک از انواع مطالعات مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 مورد- شاهدی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 کارآزمایی بالینی

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

ج

سوال 71

کدام عامل نقش مؤثرتری در افزایش بیماری دیابت در جامعه دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 ژنتیک

گزینه 2 محیط فیزیکی

گزینه 3 رفتار فردی

گزینه 4 کیفیت خدمات بهداشتی

نمایش پاسخ

ج

سوال 72

محققى در يك مطالعه دو گروه از افراد سالم، شامل گروهى كه با يك عامل خطر مواجه داشته‌اند و گروهى كه با اين عامل خطر مواجهه نداشتند را انتخاب نموده و از نظر بروز بيمارى به مدت شش ماه مورد پيگيرى قرار داده است. اين تحقيق يك مطالعه است. (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 کارآزمایی بالینی

گزینه 4 همگروهی (کوهورت)

نمایش پاسخ

د

سوال 73

مقدار p کوچک‌تر از ۰.۰۵، در آزمون آماری انجام شده در مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دهنده‌ی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 اختلافی را که براساس درمان یا مواجهه پیدا کرده‌ایم ثابت می‌کند

گزینه 2 یافته‌های مشاهده شده فقط ناشی از تصادف نبوده است.

گزینه 3 نمونه‌گیری بدون سوگرایی و براساس تصادف انجام شده است.

گزینه 4 تعداد حجم نمونه برای انجام مطالعه کافی بوده است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 74

برای بررسی عامل خطر در بیماری‌هایی که بین مواجهه و بیماری دوران نهفته‌ی طولانی وجود دارد، کدام نوع مطالعه مناسب‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز، همدان و زنجان)

گزینه 1 مطالعه‌ی مقطعی

گزینه 2 مطالعه‌ی همگروهی

گزینه 3 مطالعه‌ی مورد- شاهدهی

گزینه 4 مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

ج

سوال 75

همه‌ی عبارت‌های زیر در مورد مطالعه‌ی همگروهی درست است بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۶_قطب تهران)

گزینه 1 طرح همگروهی آینده‌نگر، یک راهکار قوی برای تعیین بروز و بررسی علل بالقوه یک حالت است.

گزینه 2 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر بویژه برای مطالعه‌ی سوابق بیماری‌های کشنده با ارزش است.

گزینه 3 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر از مواجهه با عاملی در زمان حال شروع و به پیامد در زمان آینده ختم می‌شود.

گزینه 4 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر برای مطالعه‌ی پیامدهای نادر روشی ارزان و با کارایی زیاد است.

نمایش پاسخ

د

سوال 76

برای ارزشیابی کارآیی یک واکسن خاص کدامیک از مطالعات زیر قوی‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۶_ قطب مشهد/ پزشکی اسفند ۹۷ _ قطب اهواز)

گزینه 1 مقطعی تحلیلی

گزینه 2 همگروهی تاریخی

گزینه 3 مورد- شاهدهی

گزینه 4 کارآزمایی صحرایی

نمایش پاسخ

د

سوال 77

در کدامیک از انواع اپیدمیولوژی علت رخدادها و سبب‌شناسی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز/پزشکی شهریور ۹۶_قطب تهران)

گزینه 1 اپیدمیولوژی گذشته‌نگر

گزینه 2 اپیدمیولوژی تجربی

گزینه 3 اپیدمیولوژی آینده‌نگر

گزینه 4 اپیدمیولوژی تحلیلی

نمایش پاسخ

د

سوال 78

کدامیک از موارد زیر به بررسی «علت رخدادها، علیت و سبب‌شناسی تأثیر عوامل خطرزا» می‌پردازد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران/پزشکی اسفند۹۶_ قطب مشهد/ پزشکی اسفند۹۷_ قطب اهواز)

گزینه 1 اپیدمیولوژی توصیفی

گزینه 2 اپیدمیولوژی تحلیلی

گزینه 3 اپیدمیولوژی سرولوژی

گزینه 4 اپیدمیولوژی تجربی

نمایش پاسخ

د

سوال 79

در اپیدمیولوژی توصیفی، همه‌ی عوامل زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند، بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

گزینه 2 زمان وقوع بیماری

گزینه 3 توزیع مکانی

گزینه 4 رابطه‌ی علیتی

نمایش پاسخ

د

مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی کدامیک از مراحل زیر را شامل نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 فرضیات مربوط به عوامل اتیولوژیک را نفی یا اثبات می‌کند.

گزینه 2 بیماری را برحسب زمان- مکان و شخص توصیف می‌کند.

گزینه 3 حجم بیماری را اندازه‌گیری می‌کند.

گزینه 4 یافته‌ها را با شاخص‌های موجود مقایسه می‌کند.

نمایش پاسخ

الف

عبارت درست را انتخاب کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 در مطالعات توصیفی فرضیات توصیه شده رد یا تأیید می‌شوند.

گزینه 2 در مطالعات توصیفی رابطه‌ی علت و معلولی تعیین می‌شود.

گزینه 3 در مطالعات توصیفی فرضیه ایجاد می‌گردد.

گزینه 4 در مطالعات توصیفی میزان تأثیر مشخص می‌شود

نمایش پاسخ

ج

مطالعه بر روی داوطلبان شرکت در تحقیق، احتمال ایجاد کدام سوگرایی را افزایش می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 انتخاب

گزینه 2 یادآوری

گزینه 3 اندازه‌گیری

گزینه 4 مخدوش شدگی

نمایش پاسخ

الف

در یک مطالعه قصد محقق بررسی تأثیر مصرف داروی A توسط مادران بر ایجاد ناهنجاری جنینی می‌باشند. در این مطالعه از ۴۰ نفر از مادران دارای نوزادان سالم و ۴۰ نفر از مادران دارای نوزادان با ناهنجاری مادرزادی در مورد مصرف داروی A در زمان بارداری سؤال می‌شود. کدام سوگرایی در این مطالعه احتمالاً وجود خواهد داشت؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 سوگرایی انتخاب

گزینه 2 سوگرایی یادآوری

گزینه 3 سوگرایی اندازه‌گیری

گزینه 4 پدیده‌ی ویل- راجرز

نمایش پاسخ

ب

محققى برای اطمینان از نتایج یک مطالعه منتشر شده، آن را تکرار نمود. او برای انجام مطالعه دقیقاً همان روش‌های نمونه‌گیری و اندازه‌گیری را مورد استفاده قرار داد با این تفاوت که حجم نمونه را به پنج برابر نمونه‌ی مطالعه‌ی قبلی افزایش داد. کدامیک از خطاها در مطالعه‌ی دوم نسبت به مطالعه‌ی اول کم‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 مخدوش کنندگی

گزینه 2 سوگیری انتخاب

گزینه 3 سوگیری یادآوری

گزینه 4 خطای تصادفی

نمایش پاسخ

د

نتایج یک مطالعه نشان داد بین نوشیدن قهوه و سرطان پانکراس رابطه وجود دارد. مطالعات بعدی مشخص نمودند فراوانی بیش‌تر سرطان پانکراس در مصرف کنندگان قهوه، در واقع ناشی از سیگار کشیدن بیش‌تر در این افراد بوده است. در مطالعه‌ی اول، عامل مخدوش کننده کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 قهوه

گزینه 2 قهوه و سیگار

گزینه 3 سیگار

نمایش پاسخ

الف

سوال 86

حجم نمونه کم در یک مطالعه منجر به کدامیک از خطاهای زیر می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 خطای مخدوش کنندگی

گزینه 2 خطای تصادفی

گزینه 3 خطای اندازه‌گیری

گزینه 4 خطای انتخاب

نمایش پاسخ

ب

سوال 87

در یک مطالعه‌ی کارآزمایی تصادفی شده یک طرح تقاطع برنامه‌ریزی شده: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 مشکل احتمالی اثر ترتیبی را از بین می‌برد.

گزینه 2 باید مشکل احتمالی اثرات باقی‌مانده از درمان اول را مدنظر قرار دهد.

گزینه 3 به تصادفی‌سازی لایه‌بندی شده احتیاج دارد.

گزینه 4 تعمیم‌پذیری نتایج مطالعه را افزایش می‌دهد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 88

در خصوص نسبت شانس و خطر نسبی گزینه‌ی درست را مشخص نمایید. (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 نسبت شناس در مطالعات مورد- شاهدی و همگروهی و خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است.

گزینه 2 نسبت شانس فقط در مطالعات مورد- شاهدی و خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است.

گزینه 3 نسبت شانس فقط در مطالعات همگروهی و خطر نسبی فقط در مطالعات مورد- شاهدی قابل اندازه‌گیری است.

گزینه 4 نسبت شانس فقط در مطالعات مورد- شاهدی و خطر نسبی هم در مطالعات مورد- شاهدی و هم مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 89

در ارزشیابی یک روش درمانی جدید نسبت به روش جاری، کدامیک از انواع کارآزمایی‌های زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 صحرایی

گزینه 2 شاهددار تصادفی شده

گزینه 3 شاهددار تاریخی

گزینه 4 اجتماعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 90

در یک کارآزمایی بالینی بهترین ابزار جهت مصون نگهداشتن مطالعه از سوگرایی آگاهانه و ناآگاهانه کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 همسان‌سازی

گزینه 2 تعریف معیارهای ورود

گزینه 3 استتار (کورسازی)

گزینه 4 تصادفی‌سازی

نمایش پاسخ

ج

سوال 91

در بررسی اثر درمان در تمام بیماری‌های زیر طراحی مطالعه‌ی کارآزمایی متقاطع مناسب است بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 اوتیت حاد کودکان

گزینه 2 میگرن

گزینه 3 آسم و آلرژی

گزینه 4 دیابت نوع دو

نمایش پاسخ

سوال 92

در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی جهت قابل مقایسه بودن گروه‌های مورد مطالعه کدام روش مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 همسان‌سازی فردی در گروه‌های مورد مطالعه

گزینه 2 همسان‌سازی گروهی در گروه‌های مورد مطالعه

گزینه 3 تخصیص افراد در گروه‌ها به انتخاب تصادفی

گزینه 4 تعیین معیارهای ورود و خروج جهت شروع مطالعه

نمایش پاسخ

سوال 93

تمام موارد زیر از معیارهای خروج از مطالعه در کارآزمایی بالینی است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 عدم امکان همسان‌سازی

گزینه 2 عدم امکان پیگیری

گزینه 3 وجود خطر غیر قابل قبول اثرات جانبی شدید

گزینه 4 عدم امکان رعایت مداخله

نمایش پاسخ

سوال 94

تخصیص تصادفی بیماران در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی کدام تورش را کاهش می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 اطلاعات (informationbias)

گزینه 2 یادآوری (recallbias)

گزینه 3 مصاحبه (interviewbias)

گزینه 4 انتخاب (selectionbias)

نمایش پاسخ

سوال 95

هدف از کورسازی (Blinding) در مطالعات کارآزمایی بالینی، جلوگیری از کدامیک از انواع سوگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 انتخاب

گزینه 2 یادآوری

گزینه 3 بریکسون

گزینه 4 اطلاعات

نمایش پاسخ

سوال 96

در یک کارآزمایی بالینی تصادفی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 باید بیماران به صورت تصادفی انتخاب شده باشند.

گزینه 2 باید یک نمونه‌ی تصادفی از جامعه‌ی بیماران گرفته شود.

گزینه 3 باید نمونه‌ی تصادفی از جامعه گرفته شود و به صورت تصادفی در گروه‌های درمانی قرار گیرند.

گزینه 4 باید بیماران به صورت تصادفی در گروه‌های درمانی قرار گیرند.

نمایش پاسخ

سوال 97

در طراحی مطالعات کارآمایی بالینی، کدام اقدام زیر به ترتیب برای کنترل اثرات مشاهده‌گر و متغیرهای مخدوش کننده انجام می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- مشترک کشوری)

گزینه 1 کاهش خطای انتخاب- تسهیل اندازه‌گیری پیامد

گزینه 2 تصادفی‌سازی- تسهیل اندازه‌گیری پیامد

گزینه 3 همسان‌سازی- نمونه‌گیری غیر تصادفی

گزینه 4 کورسازی- تصادفی‌سازی

نمایش پاسخ

به منظور شناسایی هرگونه واکنش نامطلوب یک فرآورده‌ی دارویی – تحقیقاتی و یا مطالعه‌ی جذب از کدام مطالعه استفاده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 کارآزمایی بالینی

گزینه 2 کوهورت

گزینه 3 مورد- شاهدی

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

الف

اساس کارآزمایی بالینی کدام مورد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 تقسیم تصادفی

گزینه 2 تئورسازی

گزینه 3 پیگیری

گزینه 4 برآورد حجم نمونه

نمایش پاسخ

الف

کدامیک از موارد زیر جزء نقاط ضعف یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 قدرت استنتاج علتی آن

گزینه 2 تخصیص تصادفی آن

گزینه 3 دکورسازی آن

گزینه 4 گران و وقت‌گیر بودن آن

نمایش پاسخ

د

در مطالعه‌ی بررسی ارتباط بین سن اولین بارداری زیر ۳۰ سال و سرطان پستان، اندازه‌ی خطر نسبی ۸۰% برآورد شده است. در این صورت بارداری زیر ۳۰ سال چه ارتباطی با بروز سرطان پستان دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 بدون ارتباط

گزینه 2 محافظت کننده

گزینه 3 عامل خطر

گزینه 4 مخدوش‌کننده

نمایش پاسخ

ج

در بررسی ارتباط علیتی بین سن در زمان اولین حاملگی و افزایش خطر سرطان پستان کدامیک از طرح‌های مطالعاتی زیر مناسب‌تر و انجام پذیرتر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 کوهورت

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 اکولوژیک

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

الف

بهترین روش مطالعه برای اندازه‌گیری میزان بروز بیماری‌ها کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک/پزشکی شهریور ۹۷ _ قطب زنجان)

گزینه 1 مورد- شاهدی Case-control

گزینه 2 همگروهی Cohort study

گزینه 3 مقطعی Cross sectional

گزینه 4 مداخله‌ای (RCT) Interventional

نمایش پاسخ

ب

محدودیت مطالعات مقطعی در بررسی علل بیماری‌ها به کدامیک از ضوابط «ارتباط علیتی» برمی‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 ارتباط زمانی

گزینه 2 شدت ارتباط

گزینه 3 ثبات ارتباط

گزینه 4 ویژگی ارتباط

نمایش پاسخ

الف

سوال 105

همه‌ی موارد زیر در مورد مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر درست است، بجز: (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۷ _ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 یک راهکار قوی برای تعیین بروز و بررسی علل بالقوه یک حالت است.

گزینه 2 یک مطالعه‌ی آینده‌نگر به پژوهشگر فرصت اندازه‌گیری درست و کامل متغیرهای مهم را می‌دهد.

گزینه 3 مطالعه‌ی همگروهی آینده‌نگر برای مطالعه پیامدهای نادر، روشی ارزان و کارآمد است.

گزینه 4 مطالعه‌ی همگروهی مستلزم پیگیری گروه‌های افراد در طول زمان است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 106

کدامیک از مطالعات زیر از نظر طراحی مداخله‌ای محسوب می‌شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 مطالعات مقطعی

گزینه 2 مطالعات تجربی یا کارآزمایی بالینی

گزینه 3 مطالعات همگروهی یا کوهورت

گزینه 4 مطالعات مورد شاهد

نمایش پاسخ

ب

سوال 107

براساس غربالگری نوزادان در بدو تولد، ۱۶۰ نوزاد مبتلا به هیپوتیروئیدی و ۳۲۰ نوزاد سالم وارد مطالعه شده‌اند. وضعیت بهره‌ی هوشی این کودکان در ۵ سالگی مقایسه گردیده است. نوع مطالعه چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 کوهورت

گزینه 2 مورد- شاهدی

گزینه 3 کارآزمایی بالینی

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 108

مطالعات مورد- شاهدی روی کدامیک از گروه‌های زیر انجام می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 فقط گروه بیماران

گزینه 2 گروهی از بیماران و گروهی از افراد سالم

گزینه 3 فقط افراد سالم

گزینه 4 گروهی از افراد مواجهه یافته با یک عامل خطر و افراد مواجهه نیافته

نمایش پاسخ

ب

سوال 109

مناسب‌ترین روش برای اندازه‌گیری میزان شیوع بیماری‌ها کدامیک از موارد ذیل است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران/پزشکی اسفند ۹۶_ قطب شیراز و همدان/ دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز))

گزینه 1 مورد- شاهدی (Case-control)

گزینه 2 مقطعی (Cross-Sectional)

گزینه 3 همگروهی (Cohort)

گزینه 4 مداخله‌ای (Intervention)

نمایش پاسخ

ب

سوال 110

در تمامی بیماری‌های زیر انجام مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی متقاطع (cross over) امکان‌پذیر است بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 دیابت قندی

گزینه 2 سکته‌ی قلبی

گزینه 3 فشار خون بالا

گزینه 4 سردرد میگرنی

نمایش پاسخ

ب

سوال 111

در بررسی یک اپیدمی غذایی، تعدادی از مشتریان یک رستوران دچار علائم مسمومیت غذایی شدند. جهت بررسی اپیدمی، اپیدمیولوژیست مربوطه‌ی غذاهای مصرف شده ۵۰ مشتری که دچار مسمومیت شده‌اند را با غذاهای مصرف شده ۵۰ مشتری دیگر همان رستوران که مسموم نشده‌اند، مقایسه می‌کند. نوع مطالعه انجام شده چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 کارآزمایی بالینی

گزینه 2 کوهورت

گزینه 3 مورد- شاهدهی

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

ج

سوال 112

مطالعه‌ای نشان داده است که یک آزمون غربالگری سرطان موجب تشخیص زودتر بیماران شده است اما موجب افزایش بقای بیماران نشده است. در تعیین کارایی این آزمون تشخیصی، دچار چه سوگرایی می‌شویم؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 سوگرایی تشخیصی (Detection bias)

گزینه 2 سوگرایی فرصت زمانی ((Lead time bias

گزینه 3 سوگرایی مدت (Length bias)

گزینه 4 سوگرایی انتخاب (Selection bias)

نمایش پاسخ

ب

سوال 113

همه‌ی موارد زیر جزء نقاط قوت یک مطالعه‌ی مقطعی است بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 برای رویداد پیامد نباید انتظار کشید.

گزینه 2 مطالعه‌ی مقطعی را می‌توان با هزینه‌ی اندک یا بدون هزینه‌ی اضافی به عنوان نخستین مرحله‌ی یک مطالعه‌ی همگروهی یا تجربی در نظر گرفت.

گزینه 3 مطالعه‌ی مقطعی برای مطالعه‌ی بیماری‌های نادر عملی است.

گزینه 4 نتایج آن ویژگی‌های جمعیتی و بالینی گروه تحت مطالعه را در آغاز مطالعه مشخص می‌کند.

نمایش پاسخ

د

سوال 114

میزان بروز بیماری‌ها (Incidence Rate) در کدامیک از مطالعات زیر قابل محاسبه است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 مطالعات مقطعی

گزینه 2 مطالعات مورد شاهد

گزینه 3 مطالعات کوهورت

گزینه 4 مطالعات توصیفی

نمایش پاسخ

ج

سوال 115

در یک مطالعه به منظور بررسی ارتباط مصرف نیتروزآمین با سرطان معده، ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان معده و ۱۰۰ فرد سالم از نظر سابقه‌ی مصرف غذاهای حاوی نیتروزآمین مورد مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 توصیفی تحلیلی

گزینه 2 مورد- شاهدهی

گزینه 3 همگروهی

گزینه 4 نیمه تجربی

نمایش پاسخ

سوال 116

کدام شاخص زیر در ارزیابی تأثیر ایجاد مانع در مسیر یک بیماری در مداخلات بهداشت محیط نقش مهم‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

- گزینه 1 هزینه‌ی اثربخشی
- گزینه 2 شیوع بیماری
- گزینه 3 مرگ و میر بیمار
- گزینه 4 وسعت منطقه

نمایش پاسخ

سوال 117

در یک مطالعه بیماران مبتلا به سرطان ریه با گروه کنترل از نظر سن، جنس و سطح اجتماعی همسان شدند و فراوانی مصرف سیگار در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه از چه نوعی است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

- گزینه 1 همگروهی
- گزینه 2 مقطعی
- گزینه 3 مورد- شاهدی
- گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

سوال 118

برای بررسی ارتباط میان سابقه‌ی بیماری تبخال و سرطان لب، کدامیک از روش‌های طراحی مطالعه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

- گزینه 1 کارآزمایی بالینی
- گزینه 2 همگروهی گذشته‌نگر
- گزینه 3 مورد- شاهدی
- گزینه 4 مقطعی مقایسه‌ای

نمایش پاسخ

سوال 119

در مورد مطالعات مورد- شاهدی کدام عبارت درست نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

- گزینه 1 گذشته‌نگر
- گزینه 2 مقایسه‌ای
- گزینه 3 تحلیلی
- گزینه 4 توصیفی

نمایش پاسخ

سوال 120

نمودار رابطه‌ی بین ریسک- اکسپوژر در کدام مورد با بقیه متفاوت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

- گزینه 1 کشیدن سیگار- سرطان ریه
- گزینه 2 فشار خون- بیماری قلبی عروقی
- گزینه 3 سن مادری- سندرم داون
- گزینه 4 استئوپروز- شکستگی‌ها

نمایش پاسخ

سوال 121

سیگار کشیدن جزء عوامل خطر کدام دسته از بیماری‌های زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

- گزینه 1 سکنه‌ی مغزی
- گزینه 2 تصادفات وسایل نقلیه
- گزینه 3 دیابت
- گزینه 4 تشمع کبد

نمایش پاسخ

در یک کارآزمایی بالینی بهترین ابزار جهت مصون نگهداشتن مطالعه از سوگرایی انتخاب کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 همسان‌سازی

گزینه 2 تصادفی‌سازی

گزینه 3 کورسازی

گزینه 4 تعریف معیارهای ورود

نمایش پاسخ

ب

برای مطالعه‌ی «ارتباط بین مواجهه با گاز خردل و ابتلا به برونشیت مزمن در سربازان جنگ تحمیلی» کدام مطالعه مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 کارآزمایی بالینی

گزینه 2 همگروهی گذشته‌نگر

گزینه 3 مورد- شاهدهی

گزینه 4 مقطعی توصیفی تحلیلی

نمایش پاسخ

ب

دو گروه از بیماران مبتلا به بیماری اسکروزیس منتشر و افراد سالم همسان شده از نظر داشتن سابقه‌ی فامیلی بیماری مقایسه شدند. این مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک از کدام نوع است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 همگروهی (آینده‌نگر)

گزینه 2 مورد- شاهدهی (گذشته‌نگر)

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 مداخله‌ای

نمایش پاسخ

ب

محاسبه‌ی میزان بروز در کدامیک از مطالعات زیر انجام می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدهی

گزینه 3 اکولوژیک

گزینه 4 همگروهی

نمایش پاسخ

د

سوگرایی یادآوری recall bias در کدام مطالعه‌ی زیر بیش‌تر دیده می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدهی

گزینه 3 کار آزمایی بالینی

گزینه 4 همگروهی

نمایش پاسخ

ب

جهت بررسی عوامل مؤثر بر ناهنجاری مادرزادی، ۳۰ مادر با کودک مبتلا به ناهنجاری مادرزادی و ۳۰ مادر با کودک سالم انتخاب شدند. نوع مطالعه‌ی مورد نظر چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 مورد- شاهدهی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 بوم‌شناسی

نمایش پاسخ

سوال 128

در مطالعه‌ای به منظور مقایسه دو روش مختلف درمان اسهال حاد، کودکان مبتلا به یک حمله‌ی اسهال حاد به صورت تصادفی با دو روش درمانی «مایع درمانی خوراکی با پایه‌ی برنج» و «مایع درمانی خوراکی با پایه‌ی گلوکز- روش مرسوم» تحت درمان قرار گرفتند.

سپس میانگین مدت ابتلا به اسهال در دو گروه مقایسه شد. نوع مطالعه کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدهی

گزینه 3 همگروهی

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

د

سوال 129

محققى در نظر دارد رابطه‌ی بین استفاده زیاد از تلفن همراه و ابتلا به تومورهای مغزى را بررسى نماید. با توجه به اینکه افراد جوان‌تر نسبت به افراد مسن، از تلفن همراه بیش‌تر استفاده می‌کنند، در این مطالعه احتمال رخداد کدام مورد وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 مخدوش شدگی

گزینه 2 خطای تصادفی

گزینه 3 سوگرایی تشخیص

گزینه 4 برهم‌کنش

نمایش پاسخ

سوال 130

کدام نوع از مطالعات زیر با استناد به مستندات، وجود یا عدم وجود عوامل خطرزای بیماری را در افراد واجد بیماری با افراد فاقد بیماری مقایسه می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 مورد- شاهدهی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 تجربی

نمایش پاسخ

سوال 131

یک نمونه‌ی تصادفی از ساکنین یک جامعه با استفاده از پرسش‌نامه‌ی تلفنی مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی سن چاقی و ابتلا به دیابت یک رابطه‌ی قوی گزارش شد. این طرح مطالعه بهترین توصیف برای کدام مورد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 Cohort

گزینه 2 Cross- sectional

گزینه 3 Experimental

گزینه 4 Case- control

نمایش پاسخ

سوال 132

برای پاسخ به پرسش پژوهش: «شیوع عفونت کلامیدیایی در زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیماری‌های آمیزشی چقدر است؟» چه نوع مطالعه‌ای مناسب است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 همگروهی گذشته‌نگر (تاریخی)

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 آکولوژیکال

گزینه 4 مورد- شاهدهی

نمایش پاسخ

ب. مطالعات مقطعی ساده هستند و معمولاً شیوع را اندازه می‌گیرند. این مطالعات نمی‌توانند میزان بروز موارد جدید را محاسبه کنند.

سوال 133

میزان بروز در تمام انواع مطالعات اپیدمیولوژیک زیر قابل محاسبه است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 همگروهی آینده‌نگر

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 کارآزمایی بالینی

گزینه 4 همگروهی گذشته‌نگر

نمایش پاسخ

ب. مطالعات مقطعی ساده هستند و معمولاً شیوع را اندازه می‌گیرند. این مطالعات نمی‌توانند میزان بروز موارد جدید را محاسبه کنند.

سوال 134

کدامیک از انواع مطالعات زیر می‌تواند در شناخت ویژگی‌های بیماران در یک دوره‌ی زمانی استفاده کرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 همگروهی

گزینه 2 مورد شاهدهی

گزینه 3 اکولوژیک

گزینه 4 سری موارد

نمایش پاسخ

د. همه‌ی موارد از سری مطالعه‌های اپیدمیولوژیک می‌باشند و این مطالعات در شناخت ویژگی‌های بیماران در یک دوره‌ی زمانی نقش دارند. *Case-Series* ؟

سوال 135

همه‌ی موارد زیر جزء نقاط ضعف مطالعه‌های مورد- شاهدهی است به استثنای: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 روش مستقیمی برای برآورد بروز یا شیوع بیماری یا خطر منتسب یا خطر افزوده وجود ندارد.

گزینه 2 چند پیامد را می‌توان همزمان مطالعه کرد.

گزینه 3 اطلاعاتی که در اختیار مطالعه‌های مورد- شاهدهی است محدود است.

گزینه 4 استعداد فزاینده‌ی آن‌ها به سوگرایی است.

نمایش پاسخ

ب. نقاط ضعف آن شامل سوگرایی و مخدوش شدگی نمونه‌گیری از دو جمعیت است. همچنین ترتیب تقدم و تأخر را مشخص نمی‌کند. و شیوع بروز یا خطر افزوده را بدست نمی‌دهد.

سوال 136

مدیران یک کارخانه‌ی خودروسازی اخیراً با مسئله‌ی شکایت چند کارگر بخش رنگ‌کاری خودرو در خصوص ابتلا به سرطان مثانه مواجه شده‌اند، به گونه‌ای که بزودی احتمال صدور رأی محکومیت در دادگاه وجود دارد. در صورتی که بخواهیم در یک مطالعه‌ی کم هزینه و سریع به بررسی رابطه‌ی سرطان مثانه و تماس با رنگ بپردازیم، کدام نوع مطالعه را پیشنهاد می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 مورد- شاهدهی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 گزارش موارد

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

الف. مورد- شاهدهی برای حالت‌های نادر مفید است و نسبت شانس را بدست می‌دهد. و معمولاً برآورد خوبی از خطر نسبی است.

سوال 137

برای بررسی رابطه‌ی عوامل خطر با یک بیماری نادر، کدام طراحی مطالعه مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 مورد- شاهد

گزینه 2 کوهورت

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 کارآزمایی بالینی

نمایش پاسخ

الف. مورد- شاهدهی برای حالت‌های نادر مفید است و نسبت شانس را بدست می‌دهد. و معمولاً برآورد خوبی از خطر نسبی است.

سوال 138

اگر در یک زمان مشخص که مواجهه اتفاق افتاده سنجش متغیرهای مستقل را در شروع مطالعه انجام دهیم و سپس در دوره‌ی زمانی معین پیگیری و پیامدها را اندازه‌گیری نماییم، از چه نوع مطالعه‌ای استفاده کرده‌ایم؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد- شاهدهی

گزینه 3 همگروهی آینده‌نگر

گزینه 4 همگروهی گذشته‌نگر

نمایش پاسخ

د. در مطالعه‌ی همگروهی برخلاف مورد شاهدهی ترتیب تقدم و تأخر رویداد پیامدهای متعدد را می‌توان مطالعه کرد. این مطالعه اگر از داده‌های پیشین استفاده کند گذشته‌نگر است.

سوال 139

در یک مطالعه‌ی کوهورت، محققین نتوانستند همه‌ی بیماران در معرض خطر را پیگیری کنند. برای برآورد خطر رخداد پیامد، کدام مورد توصیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

- گزینه 1 بروز تراکمی
- گزینه 2 شیوع دوره‌ای
- گزینه 3 بروز تجمعی
- گزینه 4 شیوع لحظه‌ای

نمایش پاسخ

الف. در مطالعه‌ی همگروهی برخلاف مورد شاهدهی ترتیب تقدم و تأخر رویداد پیامدهای متعدد را می‌توان مطالعه کرد. این مطالعه بروز و خطر نسبی و خطر افزوده را بدست می‌دهد.

برآورد خطر رخداد پیامد به بروز تراکمی

سوال 140

کورسازی و راندومیزیشن در مطالعات کارآزمایی بالینی برای کنترل کدامیک از خطاها صورت می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

- گزینه 1 اطلاعات و انتخاب
- گزینه 2 انتخاب و اطلاعات
- گزینه 3 مخدوش شدگی و انتخاب
- گزینه 4 اطلاعات و مخدوش شدگی

نمایش پاسخ

د. مخدوش شدگی به خاطر اثرگذاری متغیرها روی هم بوجود می‌آید که با راندومیزیشن قابل حل است. خطای اطلاعات هم به دلیل ثبت غلط آن‌هاست که با کورسازی حل می‌شود.

سوال 141

محققى در آنالیز نهایی مطالعه‌ی خود تحت عنوان «بررسی رابطه‌ی ابتلا به یک بیماری خاص و خطر مرگ»، میزان مرگ در اثر ابتلا به همان بیماری را در گروه‌های مطالعاتی با یکدیگر مقایسه کرده است، نوع مطالعه کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- مشترک کشوری)

- گزینه 1 مورد- شاهدهی
- گزینه 2 همگروهی
- گزینه 3 مقطعی توصیفی
- گزینه 4 کارآزمایی

نمایش پاسخ

ب / در مطالعه‌ی همگروهی برخلاف مورد شاهدهی ترتیب تقدم و تأخر رویداد پیامدهای متعدد را می‌توان مطالعه کرد.

سوال 142

همه‌ی گزینه‌های زیر می‌تواند جزء نقاط قوت مطالعات همگروهی آینده‌نگر باشد به استثنای: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد)

- گزینه 1 یک راهکار قوی برای تعیین بروز و بررسی علل بالقوه‌ی یک حالت است.
- گزینه 2 به پژوهشگر فرصت اندازه‌گیری درست و کامل متغیرهای مهم را می‌دهد.
- گزینه 3 برای مطالعه‌ی پیامدهای نادر روشی ارزان و کاراست.
- گزینه 4 برای مطالعه‌ی انواع خاصی از پیشگویی‌کننده‌ها نظیر عادت‌های تغذیه‌ای که یادآوری درست آن‌ها برای افراد مشکل است، حائز اهمیت است.

نمایش پاسخ

ج / برای مطالعه‌ی پیامدهای نادر مطالعه‌ی مورد- شاهدهی مناسب است نه همگروهی آینده‌نگر.

سوال 143

همه‌ی موارد زیر جزء نقاط ضعف مطالعه‌ی مورد- شاهدهی است بجز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد)

- گزینه 1 شیوع، بروز یا خطر افزوده را به دست نمی‌دهد.
- گزینه 2 به یک متغیر وابسته محدود شده است.
- گزینه 3 ترتیب تقدم و تأخر حوادث را مشخص نمی‌کند.
- گزینه 4 برای مطالعه‌ی حالت‌های نادر مفید است.

نمایش پاسخ

د / مورد- شاهدهی برای حالت‌های نادر مفید است و نسبت شانس را بدست می‌دهد. و معمولاً برآورد خوبی از خطر نسبی است.

سوال 144

بهترین روش برای مطالعه‌ی شیوع پرفشاری خون در شهرستان ارومیه چیست؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

- گزینه 1 مطالعه‌ی کوهورت cohort study
- گزینه 2 مطالعه‌ی مورد شاهد (case- control)
- گزینه 3 مطالعه‌ی توصیفی
- گزینه 4 مقطعی (cross- sectional study)

نمایش پاسخ

د / مطالعات مقطعی ساده هستند و معمولاً شیوع را اندازه می‌گیرند. این مطالعات نمی‌توانند میزان بروز موارد جدید را محاسبه کنند.

سوال 145

در ارزیابی طغیان بیماری‌ها (اپیدمی‌ها)، معمولاً چه نوع مطالعه‌ی اپیدمیولوژیکی پیشنهاد می‌شود؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 مطالعه‌ی مورد- شاهد

گزینه 2 مطالعات مداخله‌ای

گزینه 3 مطالعه‌ی کوهورت

گزینه 4 مطالعه‌ی توصیفی

نمایش پاسخ

الف / مورد- شاهدی برای حالت‌های نادر مفید است و نسبت شانس را بدست می‌دهد. و معمولاً برآورد خوبی از خطر نسبی است. این مطالعات برای ارزیابی طغیان بیماری‌ها مناسب است.

odds Ratio

سوال 146

در بررسی فشار خون، دو گروه با هم مقایسه شدند. گروه اول شامل ۱۵۰۰ نفر افرادی بودند که بیماری را گزارش کرده بودند و گروه دوم شامل ۳۰۰۰ نفر افراد سالم و بدون بیماری بودند. گروه اول در ۱۵۰ نفر و گروه دوم نیز در ۱۸۰ نفر سابقه‌ی فامیلی فشار خون را در بستگان درجه یک خود گزارش کردند. نوع این مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک چیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 توصیفی

گزینه 2 مورد شاهدی

گزینه 3 مقطعی

گزینه 4 همگروهی

نمایش پاسخ

ب / مورد- شاهدی برای حالت‌های نادر مفید است و نسبت شانس را بدست می‌دهد. افراد مورد مطالعه در صورت این سوال به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شده‌اند.

سوال 147

سنجش کارآیی داروهای جدید، نیازمند انجام کدام نوع از مطالعات است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 همگروهی

گزینه 3 کارآزمایی تصادفی شده

گزینه 4 مورد- شاهدی

نمایش پاسخ

ج / مطالعات کارآزمایی بالینی و در کل مداخله‌ای درستی یک روش درمانی و مفید بودن یک دارو و یا صحت یک فرضیه را می‌سنجد.

سوال 148

کدامیک از اقدامات ذیل جهت افزایش مقایسه‌پذیری گروه‌ها در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، انجام می‌گردد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 کورسازی

گزینه 2 تخصیص تصادفی

گزینه 3 همسان‌سازی

گزینه 4 محدودسازی

نمایش پاسخ

ب / جهت افزایش مقایسه‌پذیری گروه‌ها در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی باید افراد به صورت تصادفی انتخاب شوند.

سوال 149

بروز عوارض واکسن آنفولانزا در یک جمعیت ۲ در ۱۰۰۰ نفر در سال است. کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک ذیل جهت بررسی علل احتمالی ایجاد کننده‌ی این عوارض مناسب‌تر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد شاهدی

گزینه 3 کارآزمایی بالینی

گزینه 4 همگروهی (کوهورت)

نمایش پاسخ

ب / مورد- شاهدی برای حالت‌های نادر مفید است و این عارضه هم نادر است.

سوال 150

کورسازی (Masking) در کدام نوع از مطالعات اپیدمیولوژیک انجام می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 مورد شاهدی

گزینه 3 همگروهی

نمایش پاسخ

د / کورسازی و تخصیص تصادفی برای جلوگیری از بروز خطا در مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی استفاده می‌شوند.

سوال 151

در کدام نوع از مطالعات زیر، بررسی رابطه‌ی زمانی بین مواجهه و پیامد آسان‌تر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 همگروهی گذشته‌نگر

گزینه 2 همگروهی آینده‌نگر

گزینه 3 مورد شاهدی

گزینه 4 اکولوژیک

نمایش پاسخ

ب / برای بررسی رابطه‌ی زمانی بین مواجهه و پیامد همگروهی آینده‌نگر مناسب‌تر است و برای حالت‌های نادر مورد- شاهدی.

سوال 152

یکی از مشکلات مطالعات همگروهی، کاهش یا حذف موارد از دست رفته در طی پیگیری‌ها در طول مطالعه است. گم شدن افراد در طول مطالعه جزء کدامیک از خطاها است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

گزینه 1 خطای تصادفی (Random Error)

گزینه 2 تورش انتخابی (Selection Bias)

گزینه 3 تورش اطلاعاتی (Information Bias)

گزینه 4 مخدوش شدگی (Confounding)

نمایش پاسخ

ب / گم شدن افراد در طول مطالعه جزء خطای تورش انتخابی و از بین رفتن اطلاعاتی که در مطالعه به دست آمده است تورش اطلاعاتی نام دارد.

سوال 153

کدام استنتاج از تعاریف مختلف اپیدمیولوژی صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 تأکید بر فرد دارد نه گروه

گزینه 2 اپیدمیولوژی علم کمیت‌هاست و با اندازه‌ها و اندازه‌گیری‌ها سر و کار دارد.

گزینه 3 فقط به بیماری و ناتوانی توجه دارد.

گزینه 4 به پیشگیری سطح اول توجه دارد.

نمایش پاسخ

ب / اپیدمیولوژی مطالعه‌ی چگونگی توزیع بیماری در جمعیت‌ها و عوامل مؤثر بر آن است و با اندازه‌ها و اندازه‌گیری‌ها سر و کار دارد.

سوال 154

در کارآزمایی بالینی تصادفی که «هر یک از شرکت کنندگان به کلیه‌ی مداخلات مطالعه را در دوره‌های متوالی دریافت می‌کنند» را چه می‌نامند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 طراحی موازی

گزینه 2 طراحی فاکتوریل

گزینه 3 کارآزمایی باز

گزینه 4 طراحی متقاطع

نمایش پاسخ

د / تعریف طراحی متقاطع: مطالعه‌ای که در آن هر یک از شرکت کنندگان کلیه‌ی مداخلات مطالعه را در دوره‌های متوالی دریافت می‌کنند.

سوال 155

در مطالعه‌ای نسبت فراوانی سابقه‌ی مصرف سیگار در ۲ گروه مبتلا به سرطان ریه و افراد سالم بررسی و مقایسه شده است. در این مطالعه از کدام نوع مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک استفاده شده است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 مورد- شاهد

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 همگروهی

گزینه 4 توصیفی

نمایش پاسخ

الف / مورد- شاهدی برای حالت‌های نادر مفید است و نسبت شانس را بدست می‌دهد. و معمولاً برآورد خوبی از خطر نسبی است.

سوال 156

در رابطه با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک، همه‌ی گزاره‌ها صحیح است، بجز: (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 در مطالعات مقطعی، شیوع قابل ارزیابی است.

گزینه 2 در مطالعات همگروهی، خطر نسبی قابل ارزیابی است.

گزینه 3 در مطالعات همگروهی، بروز قابل ارزیابی است.

گزینه 4 در مطالعات مورد- شاهدهی، بروز قابل ارزیابی است.

نمایش پاسخ

د / مطالعات مورد- شاهدهی شیوع و بروز و خطر افزوده را محاسبه نمی‌کنند.

سوال 157

وقتی نتیجه‌ی مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد بین تأثیر دو روش درمانی تفاوت معنی‌دار آماری وجود ندارد اما در حقیقت این تفاوت وجود دارد. این تفاوت در اپیدمیولوژی اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 خطای نوع اول

گزینه 2 خطای نوع دوم

گزینه 3 درصد اطمینان

گزینه 4 توان آماری آزمون

نمایش پاسخ

ب / خطای نوع دوم زمانی رخ می‌دهد که مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد بین تأثیر دو روش درمانی تفاوت معنی‌دار آماری وجود ندارد اما در حقیقت این تفاوت وجود دارد.

سوال 158

در کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک زیر، همه‌ی افراد تحت مطالعه، بیمار هستند؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 کارآزمایی بالینی

گزینه 2 کارآزمایی پیشگیرانه

گزینه 3 کارآزمایی عوامل خطر

گزینه 4 کارآزمایی ترک کردن

نمایش پاسخ

الف

سوال 159

کدامیک از موارد زیر از مراحل اصلی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدهی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 همسان‌سازی

گزینه 2 طراحی آینده‌نگر

گزینه 3 طراحی گذشته‌نگر

گزینه 4 حرکت از معمول به علت

نمایش پاسخ

الف

سوال 160

در کدامیک از انواع مطالعات اپیدمیولوژیک بررسی از معلول به سمت علت انجام میشود؟(دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 توصیفی

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 هم‌گروهی

گزینه 4 مورد - شاهدهی

نمایش پاسخ

د

سوال 161

اپیدمیولوژی تحلیلی با کدام یک از موارد زیر شناخته می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 آزمون فرضیه‌های سبب‌شناختی و شناسایی عوامل زمینه‌ساز

گزینه 2 اندازه‌گیری فراوانی بیماری، ناتوانی یا مرگ

گزینه 3 بررسی الگوهای پخش یک بیماری در جامعه

گزینه 4 اندازه‌گیری رویدادها و حالت‌های مرتبط با سلامت یک جامعه

نمایش پاسخ

الف

سوال 162

اگر در یک مطالعه به مقایسه میانگین مقدار چربی در رژیم غذایی با بروز سرطان پستان در میان استان های کشور بپردازیم نوع ان مطالعه چه خواهد بود؟(پزشکی شهریور ۹۹_ کشوری)

گزینه 1 اکولوژیک

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 همگروهی گذشته نگر

گزینه 4 مورد-شاهد

نمایش پاسخ

الف / مطالعه ای که روی جامعه و نه فرد باشد را اکولوژیک گویند.

سوال 163

کدام سو گرایي در مطالعات کارازمایی بالینی شایع تر است؟(پزشکی شهریور ۹۹_کشوری)

گزینه 1 Selection

گزینه 2 Response

گزینه 3 Recall

گزینه 4 Publication

نمایش پاسخ

الف / خطای انتخاب در این نوع مطالعه شایع تر است.

سوال 164

کدام مورد زیر در مورد تغییر مخدوش کننده صادق نیست؟(پزشکی شهریور ۹۹_کشوری)

گزینه 1 اگر مورد توجه قرار نگیرد میتواند باعث نتیجه گیری اشتباه از یک تحقیق شود .

گزینه 2 می تواند باعث به وجود آمدن پیامد مورد مطالعه شود .

گزینه 3 میتواند از به وجود آمدن پیامد مورد مطالعه جلوگیری کند .

گزینه 4 متغیری است که با پیامد مورد مطالعه ارتباط نداشته باشد .

نمایش پاسخ

د/ تمامی گزینه ها به غیر از دال صحیح است.

سوال 165

اگر به عنوان یک سیاست گذار بخواهید بر اساس اثر بخشی یک واکسن در مورد به کارگیری ان تصمیم بگیرید نتایج کدام نوع مطالعه را جستجو میکنید؟ (پزشکی شهریور ۹۹_کشوری)

گزینه 1 کارازمایی میدانی

گزینه 2 مرور ساختارمند

گزینه 3 مورد شاهدهی مبتنی بر جامعه

گزینه 4 مورد شاهدهی بیمارستانی

نمایش پاسخ

ب

سوال 166

عدم تشخیص تقدم علت بر معلول از نقاط ضعف کدام مزالعه است؟(پزشکی شهریور ۹۹_کشوری)

گزینه 1 کوهورت آینده نگر

گزینه 2 کوهورت گذشته نگر

گزینه 3 کارازمایی بالینی

گزینه 4 مقطعی

نمایش پاسخ

د/یکی از مشکلات مطالعات مقطعی عدم تقدم علت بر معلول است.

سوال 167

مهمترین مزیت انتخاب چند گروه کنترل در مطالعات مورد شاهدهی کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 کاهش سوگیری انتخابی

گزینه 2 کاهش سوگیری اطلاعات

گزینه 3 کنترل مخدوش کنندگی

گزینه 4 برآورد قوی تر از خطر نسبی

نمایش پاسخ

الف / انتخاب چند گروه در این مطالعه از سوگیری انتخابی میکاهد.

سوال 168

نسبت میرایی ناشی از سرطان ریه در سیگاریهای قهار ۳۰ برابر از غیر سیگاری ها گزارش شده است.این دلالت بر کدامیک از موارد زیر دارد؟(پزشکی شهریور ۹۹_کشوری)

گزینه 1 قدرت همبستگی

گزینه 2 اختصاصی بودن

گزینه 3 پایداری یافته ها

گزینه 4 رابطه مقدار_پاسخ

نمایش پاسخ

الف

سوال 169

مؤثرترین ابزار اندازه‌گیری بروز یک بیماری در جامعه کدام است؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹ – میان دوره)

گزینه 1 مطالعه مورد - شاهد

گزینه 2 مطالعه هم‌گروهی

گزینه 3 مطالعه مقطعی

گزینه 4 مطالعه مداخله‌ای

نمایش پاسخ

ب مطالعه هم‌گروهی، مؤثرترین ابزار اندازه‌گیری بروز یک بیماری در جامعه است.

سوال 170

برای تعیین شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال یک کشور، کدام نوع مطالعه مناسب است؟ (علوم پایه پزشکی دی ۹۹ – میان دوره)

گزینه 1 کار آزمایی میدانی

گزینه 2 مقطعی

گزینه 3 مورد - شاهدی

گزینه 4 هم‌گروهی

نمایش پاسخ

ب / برای تعیین شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال یک کشور، مطالعه مقطعی مناسب است.

سوال 171

بهترین نوع مطالعه برای ارزشیابی تاثیر تست غربالگری PSA در کاهش مرگ ناشی از سرطان پروستات کدام است؟ (علوم پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 مقطعی تحلیلی

گزینه 2 کارآزمایی تصادفی شده

گزینه 3 مورد - شاهدی

گزینه 4 هم گروهی گذشته نگر

نمایش پاسخ

ب / کار آزمایی بالینی برای ارزشیابی تست غربالگری PSA، بهترین نوع مطالعه است.

سوال 172

کدامیک از تکنیک‌های زیر در بهداشت حرفه‌ای به منظور بررسی تداخل بین انسان و ماشین و شناسایی خطاهای بالقوه انسان در انجام وظایف مشاغل از جمله جراحان مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 Failure Mode and effect analysis

گزینه 2 Change analysis

گزینه 3 Critical incidence technique

گزینه 4 Action error analysis

نمایش پاسخ

د تکنیک Action error analysis در بهداشت حرفه‌ای به منظور بررسی تداخل بین انسان و ماشین و شناسایی خطاهای بالقوه انسان در انجام وظایف مشاغل از جمله جراحان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوال 173

یک کارآزمایی تصادفی در زمینه مقایسه تأثیر دو دارو نشان داد که این دو دارو تأثیر متفاوتی دارند. اگر تصور کنیم که در واقعیت این دو دارو تأثیر یکسان دارند این مورد می‌تواند مثالی باشد از: (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 خطای نوع اول α

گزینه 2 خطای نوع دوم β

گزینه 3 $\alpha-1$

گزینه 4 $\beta-1$

نمایش پاسخ

الف خطای نوع اول a مثالی برای این مورد می‌باشد.

سوال 174

برای پاسخ به این سؤال که آیا میزان مواجهه با سرخچه در هنگام شیوع همه‌گیری این بیماری در مادرانی که نوزادان مبتلا به کاتاراکت داشته‌اند بیشتر از مادرانی بوده که نوزادان آن‌ها کاتاراکت نداشته‌اند، چه نوع پژوهشی مناسب است؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 هم‌گروهی هم‌زمان

گزینه 3 مورد شاهی

گزینه 4 هم‌گروهی گذشته‌نگر

نمایش پاسخ

ج / مطالعه مورد شاهی برای این سوال مناسب است. در این نوع از مطالعات افراد به ترتیب برحسب داشتن یا نداشتن یک پیامد معین (همانند یک بیماری یا یک وضعیت خاص) در گروه مورد (Case) و گروه شاهد (Control) قرار می‌گیرند و سپس این دو گروه از نظر سابقه مواجهه مقایسه می‌شوند.

سوال 175

در يك مطالعه بين‌المللی مشخص گردید میزان مرگ حوادث ترافیکي در صد هزار نفر جمعیت با درآمد سرانه کشورها نسبت معکوس دارد. نوع مطالعه کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 مورد شاهی

گزینه 2 هم‌گروهی

گزینه 3 اکولوژیک

گزینه 4 کارآزمایی میدانی

نمایش پاسخ

ج / مطالعه بوم‌شناختی نوعی مطالعه تحلیلی است که در آن واحد تحلیل به جای فرد، جمعیت یا گروه افراد است.

سوال 176

در يك مطالعه مورد - شاهی مربوط به ارتباط تغذیه با سکتۀ مغزی، برای حذف مخدوش کنندگی متغیر «مصرف سیگار»، هر دو گروه مورد و شاهد از بین افراد غیر سیگاری انتخاب شدند. روش به کار رفته برای حذف اثر مخدوش کننده کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 همسان‌سازی

گزینه 2 تصادفی سازی

گزینه 3 محدودسازی

گزینه 4 تحلیل طبقه‌ای

نمایش پاسخ

ج / محدودسازی روش به کار رفته برای حذف اثر مخدوش کننده است.

سوال 177

هدف اصلی از انجام مطالعه کارآزمایی بالینی فاز يك داروها و فرآورده‌های بیولوژیک، ارزیابی کدام مورد است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 کارایی

گزینه 2 اثربخشی

گزینه 3 ایمنی

گزینه 4 کارآمدی

نمایش پاسخ

ج / هدف اصلی از انجام مطالعه کارآزمایی بالینی فاز يك داروها و فرآورده‌های بیولوژیک، ارزیابی ایمنی است.

سوال 178

محققي پژوهش خود را دقیقاً بر اساس یک پژوهش قبلي طراحی و اجرا نموده، با این تفاوت که حجم نمونه را ده برابر نسبت به مطالعه قبلي افزایش داده است. کدام خطا در مطالعه جدید کاهش پیدا می‌کند؟ (علوم‌پایه پزشکی دی ۹۹- میان‌دوره)

گزینه 1 تورش انتخاب

گزینه 2 تورش اطلاعات

گزینه 3 خطای مخدوش‌کنندگی

گزینه 4 خطای تصادفی

نمایش پاسخ

د خطای تصادفی کاهش می‌یابد. این پدیده حاصل تأثیر پدیده شانس بر روی اندازه‌گیری پدیده‌های مختلف ماست.

سوال 179

در مطالعه‌ای نشان داده شد که میزان بروز سالانه بیماری مولتیپل اسکروزیس در کشورها با دور شدن از خط استوا بیشتر می‌شود. نوع مطالعه کدام است؟

گزینه 1 مقطعی

گزینه 2 اکولوژیک

گزینه 3 کارآزمایی اجتماعی

گزینه 4 هم‌گروهی آینده‌نگر

نمایش پاسخ

ب / مطالعه بوم‌شناختی نوعی مطالعه تحلیلی است که در آن واحد تحلیل به جای فرد، جمعیت یا گروه افراد است.

سوال 180

در یک مطالعه هم‌گروهی نشان داده شد که خطر نسبی سکته مغزی در طی ده سال در افرادی که فشارخون سیستولیک متوسط آن‌ها به ترتیب در محدوده (۱۶۰-۱۸۰)، (۱۸۰-۲۰۰) و بیش از ۲۰۰ میلیمتر جیوه بوده است نسبت به افرادی که فشارخون سیستولیک متوسط آن‌ها کمتر از ۱۶۰ میلیمتر جیوه بوده است؛ به ترتیب ۲.۲، ۳.۱ و ۴.۹ بوده است. این یافته موید کدامیک از معیارهای رابطه علیتی است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 تکرارپذیری یافته‌ها

گزینه 2 رابطه مقدار- پاسخ

گزینه 3 توجیه پذیری بیولوژیک

گزینه 4 قطع مواجهه

نمایش پاسخ

ب این یافته موید رابطه مقدار- پاسخ از معیارهای رابطه علیتی می‌باشد.

سوال 181

کدامیک از تکنیک‌های شناسایی خطر در بهداشت حرفه‌ای، در مورد همه حوادث قابل اجرا است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 تجزیه و تحلیل خطاهای کاری

گزینه 2 تجزیه و تحلیل علت - پیامد

گزینه 3 تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی

گزینه 4 ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظ‌ها و موانع

نمایش پاسخ

ج / تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی، برای شناسایی خطر در مورد همه حوادث قابل اجرا است.

نسبت‌ها در مطالعات

تعداد سوال ۴۱:

درجه سختی: آسان

نکات:نحوه محاسبه نسبت شانس و خزر نسبی مهم میباشد.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی عامل خطر برای بیماری مادرزادی X، در ۱۵ نفر از ۱۰۰ مادر مورد و ۱۰ نفر از ۲۰۰ مادر شاهد، مصرف داروی A تشخیص داده شده است. نسبت شانس (Odds Ratio) چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 ۳/۰

گزینه 2 ۱۷۶/۰

گزینه 3 ۵/۸

گزینه 4 ۳۵/۳

نمایش پاسخ

د

سوال 2

سابقه‌ی مصرف سیگار در بیماران مبتلا به سرطان مثانه و افراد سالم در جدول زیر آمده است نسبت شانس (odds ratio) مصرف سیگار در بیماران به افراد سالم چه عددی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

سالم	بیمار	
۶۰	۴۰	مصرف سیگار دارد
۶۰	۲۰	مصرف سیگار ندارد

گزینه 1 ۲

گزینه 2 ۱/۲۵

گزینه 3 ۵/۰

گزینه 4 ۴/۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

در یک مطالعه‌ی مورد– شاهدی مشاهدات زیر به دست آمده است. نسبت شانس (Odds Ratio) مواجهه مورد مطالعه چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

		بیماری	
		مثبت	منفی
مواجهه	مثبت	۵۰	۱۰۰
	منفی	۱۰۰	۵۰

گزینه 1 ۴

گزینه 2 ۲

گزینه 3 ۵/۰

گزینه 4 ۲۵/۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 4

نتایج یک مطالعه‌ی مورد- شاهد در جدول ذیل آمده است. نسبت شانس چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

	سالم	بیمار	
۱۵۰	۵۰	۱۰۰	مواجهه
۳۵۰	۱۵۰	۲۰۰	فاقد مواجهه
۵۰۰	۲۰۰	۳۰۰	

گزینه 1 ۶۶/۰

گزینه 2 ۲۵/۰

گزینه 3 ۵/۱

گزینه 4 ۳۳/۰

نمایش پاسخ

ج

سوال 5

کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 شانس (odds) همواره بین صفر تا مثبت بی‌نهایت است.

گزینه 2 خطر (risk) همواره بین صفر تا مثبت بی‌نهایت است.

گزینه 3 خطر نسبی (relative risk) همواره بین صفر تا یک است.

گزینه 4 نسبت شانس (odds ratio) همواره از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 6

در بررسی فشار خون دو گروه با هم مقایسه شدند گروه اول شامل ۱۵۰۰ نفر افرادی بودند که بیماری را گزارش کرده بودند و گروه دوم شامل ۳۰۰ نفر افراد سالم و بدون بیماری بودند که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. هر دو گروه نیز ۱۵۰ نفر سابقه‌ی فامیلی فشار خون را در بستگان درجه یک خود گزارش کردند نسبت شانس (OR) فشار خون به علت تأثیر سابقه‌ی فامیلی چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 ۲/۱ برابر

گزینه 2 ۱ برابر

گزینه 3 ۵۰ برابر

گزینه 4 ۵/۱ برابر

نمایش پاسخ

الف. هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست

سوال 7

نتایج حاصل از یک مطالعه‌ی مورد- شاهده‌ی در جدول زیر آمده است. نسبت شانس (Odds Ratio) کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

	بیماران	شاهد
مواجهه دارد	۵۰	۲۰
مواجهه ندارد	۱۵۰	۱۸۰

گزینه 1 ۳

گزینه 2 ۳/۰

گزینه 3 ۲۵/۰

گزینه 4 ۴

نمایش پاسخ

الف

سوال 8

در بررسی دیابت، دو گروه با هم مقایسه شدند. گروه اول شامل ۱۵۰۰ نفر افرادی بودند که بیماری را گزارش کرده بودند و گروه دوم شامل ۳۰۰۰ نفر افراد سالم و بدون بیماری بودند که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. هر دو گروه نیز ۱۵۰ نفر سابقه‌ی فامیلی دیابت را در بستگان درجه یک خود گزارش کردند. نسبت شانس دیابت به علت سابقه‌ی فامیلی چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 ۲/۱ برابر

گزینه 2 ۱ درصد

گزینه 3 ۵۰ برابر

گزینه 4 ۱/۵ برابر

نمایش پاسخ

الف

سوال 9

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهده‌ی مشاهده شد که از ۱۱۲ بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد ۵۶ نفر سیگاری بوده‌اند، اما در ۲۲۴ نفر غیر مبتلا، فقط ۲۸ نفر سیگار مصرف می‌کرده‌اند. در این مطالعه نسبت شانس (OR) چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۴

گزینه 2 ۷

گزینه 3 ۸۵

گزینه 4 ۲۷/۵

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

در یک مطالعه‌ی تحقیقاتی مورد- شاهده‌ی، تعداد ۱۰۰ بیمار و ۱۵۰ شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. از ۱۰۰ بیمار مورد مطالعه، ۷۰ نفر مواجهه با یک عامل خطر خاص را ذکر کردند در حالی که از بین افراد شاهد تنها ۲۰ نفر چنین مواجهه‌ای را متذکر شدند. نسبت شانس (OR) مواجهه حدودا چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 ۱۵

گزینه 2 ۱۲/۵

گزینه 3 ۳۵

گزینه 4 ۴۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

در یک مطالعه که به بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و سکنه‌ی قلبی پرداخته است، نسبت شانس از (Odds Ratio) را براساس اطلاعات جدول زیر محاسبه نمایید؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

	سالم	بیمار
دارای فعالیت فیزیکی *	۱۰۰	۶۳
بدون فعالیت فیزیکی	۱۰	۹

گزینه 1 ۱۷۵

گزینه 2 ۱/۴۴

گزینه 3 ۰/۷۰

گزینه 4 ۰/۵۷

نمایش پاسخ

ج. هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست.

سوال 12

محقق‌ی ۱۰ بیمار مبتلا به سکنه‌ی قلبی را با ۱۰ فرد سالم مقایسه نموده است. در گروه مبتلایان به سکنه‌ی قلبی، ۶ نفر سابقه‌ی مصرف سیگار و در گروه افراد سالم، ۳ نفر سابقه‌ی مصرف سیگار دارند. نسبت شانس در این پژوهش مورد- شاهده‌ی چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 ۰/۵

گزینه 2 ۲

گزینه 3 ۳

گزینه 4 ۳/۵

نمایش پاسخ

د

سوال 13

نتایج یک مطالعه‌ی مورد- شاهده‌ی در جدول زیر ارائه شده است. نسبت شانس (OR) در این مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

شاهد	مورد	
۸۰	۶۰	مواجهه ندارد
۲۰	۴۰	مواجهه دارد

گزینه 1 ۰/۳۷

گزینه 2 ۰/۷۸

گزینه 3 ۰/۶۱

گزینه 4 ۲/۶

نمایش پاسخ

د

سوال 14

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهد جهت بررسی ارتباط بین مصرف منظم و طولانی‌مدت قرص ضد بارداری و سرطان پستان، از ۱۲۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان ۳۵ نفر و از ۱۲۰ نفر فرد غیر مبتلا به سرطان پستان ۱۱ نفر سابقه‌ی مصرف قرص ضد بارداری را ذکر می‌نمودند. نسبت شناس در مطالعه‌ی حاضر تقریباً برابر است با: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ۲

گزینه 2 ۳/۶

گزینه 3 ۴

گزینه 4 ۵/۷

نمایش پاسخ

ج

سوال 15

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی مشاهده گردید که از ۱۴۰ بیمار مبتلا به سرطان ریه ۴۰ نفر سابقه‌ی سیگار داشتند. اما در ۲۸۰ فرد غیر مبتلا به سرطان ریه فقط ۲۰ نفر سابقه‌ی مصرف سیگار دارند. در این مطالعه نسبت شانس چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 ۵/۲

گزینه 2 ۴/۷

گزینه 3 ۲/۳

گزینه 4 ۱/۳

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی برای بررسی ارتباط مواجهه با یک عامل و ابتلا به یک بیماری خاص، داده‌های زیر حاصل شده است. مقدار عددی نسبت شانس (odds ratio) کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

	بیمار	سالم
مواجهه	۳۰۰	۵۰
عدم مواجهه	۱۰۰	۱۵۰

گزینه 1 ۲

گزینه 2 ۳

گزینه 3 ۹

گزینه 4 ۱۲

نمایش پاسخ

ج

سوال 17

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی، ۲۰% از موردها و ۱۰% از شاهد‌ها سابقه‌ی مصرف سیگار را ذکر می‌کردند. نسبت شانس در این مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 ۴۴%

گزینه 2 ۲.۲۵

گزینه 3 ۰.۵

گزینه 4 ۲

نمایش پاسخ

ب

سوال 18

برای نشان دادن این که با کاهش مصرف سیگار جامعه از نظر کدامیک از بیماری‌های مرتبط با سیگار بیش‌ترین سود را می‌برد، کدامیک از شاخص‌های زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1Incidence

گزینه 2Odds ratio

گزینه 3Risk ratio

گزینه 4Attributable risk

نمایش پاسخ

د

سوال 19

در چند پژوهش نشان داده شده است که تقریباً ۸۵ درصد از موارد سرطان ریه به دلیل مصرف دخانیات اتفاق می‌افتد. این مطلب مثالی از کدام گزینه‌ی زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1خطر نسبی

گزینه 2میزان بروز

گزینه 3خطر قابل انتساب

گزینه 4نسبت مرگ‌شناسی

نمایش پاسخ

ج

سوال 20

در یک مطالعه‌ی همگروهی، میزان بروز بیماری در گروه مواجهه یافته ۴۰ درصد و در گروه مواجهه نیافته ۱۰ درصد بوده است. خطر منتسب برای گروه مواجهه یافته کدام گزینه است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1۸۰ درصد

گزینه 2۲۵ درصد

گزینه 3۷۵ درصد

گزینه 4۳۰ درصد

نمایش پاسخ

ج

سوال 21

در یک مطالعه برای بررسی ارتباط سیگار کشیدن و سرطان ریه، میزان بروز بیماری در گروه سیگاری ۵۰ در هزار و میزان بروز بیماری در گروه غیر سیگاری ۵ در هزار محاسبه شد. خطر قابل انتساب در گروه سیگاری کدام گزینه است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1۱۰ در هزار

گزینه 2۱۰ در صد

گزینه 3۴۵ در هزار

گزینه 4۹۰ در صد

نمایش پاسخ

ج

سوال 22

فردی سیگاری به شما مراجعه نموده و می‌خواهد بداند در صورت ترک سیگار چقدر احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی در وی کاهش می‌یابد. برای پاسخگویی به وی اطلاع از کدامیک از شاخص‌های زیر به شما کمک می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1خطر نسبی

گزینه 2اختلاف خطر

گزینه 3خطر منتسب

گزینه 4خطر منتسب جمعیت

نمایش پاسخ

ج

سوال 23

محاسبه‌ی کدامیک از شاخص‌ها در پاسخ به سؤال مطرح شده‌ی زیر مناسب‌تر است؟

«اگر اقدام مؤثری برای جلوگیری از برخورد یا مواجهه با عامل بیماری صورت گیرد تا چه اندازه می‌توان از بروز بیماری جلوگیری نمود؟» (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1خطر مطلق

گزینه 2خطر نسبی

گزینه 3نسبت شانس

گزینه 4خطر قابل انتساب

نمایش پاسخ

سوال 24

جدول زیر از روی نتایج حاصل از یک مطالعه‌ی مورد- شاهدهی به دست آمده است. نسبت برتری در این مطالعه چقدر است؟ (oddsRatio) (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

سالم	مبتلا به سرطان مثانه	
۲۵	۲۵	غیرسیگاری
۵۰	۷۵	سیگاری

گزینه 1 ۰/۶۶

گزینه 2 ۰/۸۳

گزینه 3 ۱/۲

گزینه 4 ۱/۵

نمایش پاسخ

سوال 25

تفاضل میزان بروز بیماری در گروه مواجهه یافته از میزان بروز پیامد در گروه مواجهه نیافته، به شرط این که علل دیگری بجز علت تحت بررسی اثرات مشابهی در دو گروه داشته باشد، تعریف کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 نسبت شانس

گزینه 2 خطر منتسب

گزینه 3 خطر نسبی

گزینه 4 بروز تجمعی

نمایش پاسخ

سوال 26

در یک مطالعه، بروز بیماری در افراد سیگاری ۱۰ درصد و در افراد غیر سیگاری ۵ درصد برآورد شده است. میزان بروز بیماری منتسب به مصرف سیگار براساس این مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 ۷/۵ درصد

گزینه 2 ۲/۵ درصد

گزینه 3 ۵ درصد

گزینه 4 ۱۰ درصد

نمایش پاسخ

سوال 27

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدهی ،۱۶ نفر بیمار مبتلا به سرطان مری با ۱۶ نفر گروه شاهد از نظر سطح سلینیوم خون مورد مقایسه قرار گرفتند. از گروه مورد ۱۴ نفر و از گروه شاهد ۴ نفر دارای سطح سلینیوم کم‌تر از حد طبیعی شناسایی شدند. مقدار اثر نسبت شانس (Oddsratio) را برآورد نمایید؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 OR=21 و سلینیوم خون کم‌تر از حد طبیعی عامل پیشگیری از سرطان مری می‌تواند باشد.

گزینه 2 OR=0.05 و سلینیوم خون کم‌تر از حد طبیعی برآورد خطر ابتلا به سرطان مری می‌تواند باشد.

گزینه 3 OR=21 و سلینیوم خون کم‌تر از حد طبیعی برآورد خطر ابتلا به سرطان مری می‌تواند باشد.

گزینه 4 OR=0.05 و سلینیوم خون کم‌تر از حد طبیعی عامل پیشگیری از سرطان مری می‌تواند باشد.

نمایش پاسخ

سوال 28

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص کاربرد «خطر منتسب» صادق است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- مشترک کشوری)

گزینه 1 احتمال رخ داد یک واقعه را نشان می‌دهد

گزینه 2 در تعیین علت بیماری‌ها با ارزش است.

گزینه 3 برای تعیین قدرت ارتباط مواجهه با بیماری استفاده می‌شود.

گزینه 4 برای دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری سلامت عمومی مهم است

نمایش پاسخ

سوال 29

در یک مطالعه‌ی مورد- شاهد جهت بررسی ارتباط بین مصرف منظم و طولانی‌مدت سیگار و سرطان پستان، از ۲۴۰ بیمار مبتلا به سرطان پستان ۷۰ نفر و از ۲۴۰ فرد غیر مبتلا به سرطان پستان ۲۲ نفر سابقه‌ی مصرف سیگار را ذکر نمودند، نسبت شانس در مطالعه‌ی حاضر تقریباً برابر است با: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 ۲

گزینه 2 ۳/۶

گزینه 3 ۴

گزینه 4 ۵/۷

نمایش پاسخ

ج

سوال 30

برای بررسی رابطه‌ی پایین بودن سلیوم خون و سرطان مری مطالعه‌ی زیر انجام شده است. مقدار نسبت شانس Odds Ratio را محاسبه کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۷-
قطب تبریز)

سطح مواجهه با سلیوم	بیماران سرطان مری (مورد)	افراد سالم (شاهد)	جمع
میزان سلیوم خون کمتر از حد طبیعی	۱۴	۴	۱۸
میزان سلیوم خون در حد طبیعی	۲	۱۲	۱۴
جمع	۱۶	۱۶	۳۲

گزینه 1 ۰/۵۰ سلیوم پنج درصد سرطان مری را کاهش می‌دهد

گزینه 2 ۲۱ پایین بودن سلیوم کمتر از حد طبیعی یک عامل پیشگیری برای سرطان مری است

گزینه 3 ۲۱ پایین بودن سلیوم کمتر از حد طبیعی شانس سرطان مری را افزایش می‌دهد

گزینه 4 ۱ سلیوم رابطه‌ای با سرطان مری ندارد

نمایش پاسخ

ج

سوال 31

نتایج یک پژوهش برای بررسی رابطه‌ی بین بیماری و یک مواجهه در جدول زیر درج شده است. odds Ratio را محاسبه کنید. (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

جمع	سالم	بیمار		مواجهه
۱۶۰	۱۰۰	۶۰	ندارد	
۱۴۰	۵۰	۹۰	دارد	
۳۰۰	۱۵۰	۱۵۰	جمع	

گزینه 1 ۰/۳

گزینه 2 ۷/۱

گزینه 3 ۳

گزینه 4 ۴/۱

نمایش پاسخ

ج. نسبت شانس برابر است یا حاصلضرب ۹۰ در ۱۰۰ تقسیم بر حاصلضرب ۶۰ در ۵۰ که جواب ۳ می‌شود.

سوال 32

مطالعات نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از بروز بیماری‌های قلبی در یک جمعیت به دلیل مصرف سیگار است. این عدد کدامیک از گزینه‌های زیر رانشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 خطر منتسب Attributable Fraction

گزینه 2 کسر منتسب به جمعیت Population Attributable Fraction

گزینه 3 خطر نسبی Relative Risk

گزینه 4 نسبت شانس Odds Ratio

نمایش پاسخ

د. نسبت شانس یعنی شانس افراد سیگاری نسبت به افراد غیر سیگاری برای ابتلا به بیماری‌های قلبی چقدر است.

سوال 33

در یک مطالعه‌ی همگروهی جهت بررسی ارتباط بین مصرف استروژن حول و حوش یائسگی و خطر بیماری قلبی عروقی، ۸۰۰ زن دارای سابقه‌ی مصرف استروژن و ۹۰۰ زن بدون سابقه‌ی مصرف استروژن طی ۵ سال برای ایجاد بیماری قلبی عروقی پیگیری شده‌اند ۱۲۵ نفر از مصرف کنندگان در مقایسه با ۵۶ نفر از کسانی که استروژن مصرف نمی‌کردند به سکتی قلبی مبتلا شدند خطر نسبی بروز سکتی قلبی عبارت است از: (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 ۱/۹۸

گزینه 2 ۲/۲۳

گزینه 3 ۱/۰۷

گزینه 4 ۲/۵۱

نمایش پاسخ

د / جواب می‌شود ۸۰۰ * ۱۲۵/۵۶ * ۹۰۰ که برابر با ۲/۵۱ می‌شود.

سوال 34

در یک مطالعه‌ی مورد شاهد جهت بررسی ارتباط بین مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و پپتیک اولسر، مشاهده گردید که از ۱۲۰ بیمار مبتلا به پپتیک اولسر ۲۸ نفر سابقه‌ی مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی را ذکر می‌نمودند و از ۱۴۰ فرد غیر مبتلا، ۱۶ نفر سابقه‌ی مواجهه‌ی مذکور را داشتند. در این مطالعه نسبت

شانس OR مواجهه با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی در بیماران نسبت به افراد غیر بیمار تقریباً چقدر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 ۲/۳۵

گزینه 2 ۲/۸

گزینه 3 ۳/۲

گزینه 4 ۲/۵

Handwritten calculations for Odds Ratio (OR):

$$OR = \frac{28 \times 120}{124 \times 16} = \frac{28}{1} \times \frac{120}{124 \times 16}$$
$$= \frac{28}{1} \times \frac{120}{1984} = \frac{28}{1} \times \frac{15}{248} = \frac{28 \times 15}{248} = \frac{420}{248} = \frac{105}{62} \approx 1.69$$

نمایش پاسخ

الف / جواب می‌شود ۹۲ * ۱۲۴/۱۶ * ۲۸ که برابر با ۲/۳۵ می‌شود.

سوال 35

یک مطالعه‌ی مورد-شاهدی برای تعیین ارتباط بین مصرف الکل و افسردگی طراحی شد. از کدام شاخص می‌توان برای تعیین اندازه‌ی خطر استفاده کرد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 Relative risk

گزینه 2 Risk difference

گزینه 3 Odds ratio

گزینه 4 Incidence rate

نمایش پاسخ

ج / نسبت شانس را در مطالعات مورد شاهدی و همگروهی محاسبه می‌کنیم و برای تعیین اندازه‌ی خطر کاربرد دارد.

سوال 36

کدام شاخص نشانگر امکان پیشگیری در صورت حذف مواجهه است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 خطر نسبی

گزینه 2 خطر مطلق

گزینه 3 خطر منتسب

گزینه 4 نسبت شانس

نمایش پاسخ

ج / خطر منتسب به معنای تفاضل میزان بروز بیماری در گروه مواجهه یافته از میزان بروز پیامد در گروه مواجهه نیافته است و نشانگر امکان پیشگیری در صورت حذف مواجهه است.

سوال 37

نتیجه‌ی یک مطالعه‌ی مورد شاهدی برای بررسی رابطه‌ی بین سابقه‌ی مصرف الکل و سرطان کبد در جدول زیر خلاصه شده است. نسبت شانس (Odds Ratio) این رابطه چقدر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

سالم	بیمار	
۸۰	۱۲۰	سابقه‌ی مصرف الکل
۳۲۰	۸۰	سابقه‌ی عدم مصرف الکل

گزینه 1 ۶۶.۲

گزینه 2 ۴

گزینه 3 ۵.۱

گزینه 4 ۶

نمایش پاسخ

د / $80 \times \frac{120}{80} \times 320$ که برابر با ۶ می‌شود.

سوال 38

در خصوص نسبت شانس و خطر نسبی گزینه‌ی درست را مشخص نمایید. (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد)

گزینه 1 نسبت شانس در مطالعات مورد شاهدی و همگروهی و خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است.

گزینه 2 نسبت شانس در مطالعات مورد شاهدی و خطر نسبی فقط در همگروهی قابل اندازه‌گیری است.

گزینه 3 نسبت شانس در مطالعات همگروهی و خطر نسبی فقط در مورد شاهدی قابل اندازه‌گیری است.

گزینه 4 نسبت شانس در مطالعات مورد شاهدی و خطر نسبی هم در مطالعات مورد شاهدی و همگروهی قابل اندازه‌گیری است.

نمایش پاسخ

الف / نسبت شانس را در مطالعات مورد شاهدی و همگروهی محاسبه می‌کنیم و برای تعیین اندازه‌ی خطر کاربرد دارد اما خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است.

سوال 39

چنانچه در یک مطالعه، خطر نسبی برابر یک به دست آید. کدام جمله در خصوص نتیجه‌گیری مطالعه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 احتمال رخداد بیماری در گروه مواجهه یافته برابر گروه مواجهه نیافته است

گزینه 2 نشان دهنده‌ی افزایش بیش‌تر شانس مواجهه با عامل خطر در گروه مواجهه یافتگان است

گزینه 3 نشان دهنده‌ی اثر محافظتی مواجهه با آن عامل خواهد بود.

گزینه 4 نشان دهنده‌ی افزایش بیش‌تر احتمال بروز بیماری در مواجهه یافتگان است

نمایش پاسخ

الف / خطر نسبی فقط در مطالعات همگروهی قابل اندازه‌گیری است و اگر برابر با یک شود یعنی احتمال رخداد بیماری در گروه مواجهه یافته با گروه مواجهه نیافته برابر است.

سوال 40

محقق‌ی درصدد است رابطه‌ی بین مواجهه‌ی شغلی با آرسنیک و بروز سرطان را در کارگران یک کارخانه بررسی کند. به این منظور طی یک مطالعه‌ی همگروهی ۲۰ ساله، خطر نسبی بروز سرطان را در این جمعیت محاسبه می‌کند. کدام عدد، نمایانگر افزایش خطر سرطان در مواجهه با آرسنیک است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۰/۷۵

گزینه 2 ۱

گزینه 3 ۳.۴

گزینه 4 داده‌های موجود کافی نیست

نمایش پاسخ

ج / خطر نسبی در این‌جا باید بیش‌تر از یک باشد چون مواجهه‌ی شغلی با آرسنیک باعث افزایش بروز سرطان می‌شود.

سوال 41

در یک مطالعه مقطعی تحلیلی، از ۹۰۰۰ فرد مورد بررسی ۴۰۰۰ نفر مرد و ۵۰۰۰ نفر زن بودند. ۴۰۰ نفر از مردان و ۱۰۰۰ نفر از زنان مبتلا به افسردگی تشخیص داده شدند. نسبت شانس رابطه جنس زن با ابتلا به افسردگی کدام است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 ۱.۶۷

گزینه 2 ۱.۸

گزینه 3 ۲.۰

گزینه 4 ۲.۲۵

نمایش پاسخ

د نسبت شانس رابطه زن با ابتلا به افسردگی ۲.۲۵ است.

مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها

تعداد سوال :۵۳

درجه سختی: آسان

نکات:۱- خطر نسبی : نسبت میزان بروز در گروه مواجه یافته به نسبت بروز بیماری در گروه مواجه نیافته

۲-در بیماری های مرتبط با ژن از مدل چرخ استفاده میشود

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

در مطالعات اپیدمیولوژی، برای به دست آوردن علت ابتلا به یک بیماری به کدامیک از عوامل زیر پرداخته نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 شرایط میزبان

گزینه 2 عوامل محیطی

گزینه 3 سیر طبیعی بیماری

گزینه 4 خصوصیات محل

نمایش پاسخ

ج

سوال 2

در جدول زیر کدامیک از معیارهای قضاوت در خصوص وجود ارتباط بین مصرف سیگار و مرگ مشاهده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

مقدار مصرف سیگار در روز	غیر سیگاری	کمتر از نیم پاکت	نیم تا یک پاکت	یک تا دو پاکت	دو پاکت و بیشتر
میزان مرگ در هر ۱۰۰هزار نفر	۳/۴	۵۱/۴	۵۹/۳	۱۴۳/۹	۲۱۷/۳

گزینه 1 قدرت ارتباط

گزینه 2 اختصاصی بودن ارتباط

گزینه 3 رابطه‌ی دوز- پاسخ

گزینه 4 تکرار پذیری یافته‌ها

نمایش پاسخ

ج

سوال 3

براساس ملاحظات هیل (CriteriaHill) همه‌ی موارد ممکن است در زمان استنتاج یک رابطه‌ی علیتی مهم باشد بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 رابطه‌ی زمانی (Temporality)

گزینه 2 دوز پاسخ (Response–Dose)

گزینه 3 ارزش اخباری (predictive value)

گزینه 4 قدرت ارتباط (strength of association)

نمایش پاسخ

ج

سوال 4

کدامیک از معیارهای قضاوت درباره‌ی ارتباط علیتی، ضعیف‌تر و کم اهمیت‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 قدرت ارتباطی

گزینه 2 رابطه‌ی زمانی

گزینه 3 همخوانی زیستی

گزینه 4 ویژگی ارتباط

نمایش پاسخ

د

سوال 5

کدام گزینه معیار ضعیف‌تری برای قضاوت درباره‌ی علیتی بودن یک ارتباط است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 ویژگی ارتباط

گزینه 2 رابطه‌ی زمانی

گزینه 3 قدرت ارتباط

گزینه 4 تکرار پذیری یافته‌ها

نمایش پاسخ

الف

سوال 6

انواع مطالعات در مناطق مختلف دنیا ارتباط مصرف سیگار و ابتلا به سرطان ریه را نشان داده‌اند. این موضوع نشانگر کدامیک از اصول روابط علیتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 قدرت ارتباط

گزینه 2 ثبات ارتباط

گزینه 3 رابطه‌ی زمانی

گزینه 4 رابطه‌ی مقدار– پاسخ

نمایش پاسخ

ب

سوال 7

کدامیک از معیارهای اثبات رابطه‌ی علیتی بین یک عامل خطر و بیماری از اهمیت کم‌تری نسبت به سایر معیارها برخوردار است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 رابطه‌ی دوز- پاسخ

گزینه 2 ویژگی ارتباط

گزینه 3 رابطه‌ی درمانی

گزینه 4 اثر توقف مواجهه

نمایش پاسخ

ب

سوال 8

در مدل اکولوژیک چرخ، در کدامیک از بیماری‌های زیر هسته‌ی چرخ بزرگ‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 بیماری‌های اسهالی

گزینه 2 سوانح و حوادث

گزینه 3 فنیل کتونوریا

گزینه 4 بیماری‌های قلبی و عروقی

نمایش پاسخ

سوال 9

همه‌ی موارد زیر مثال‌هایی از اجزاء مدل مثلث اپیدمیولوژی می‌باشند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- مشترک کشوری)

گزینه 1 شخص

گزینه 2 زمان

گزینه 3 باکتری

گزینه 4 آب آلوده

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

عبارت معلول‌ها (effects) همیشه نتیجه‌ی یک علت مشخص نیستند بلکه مجموعه‌ای از علل (causes) یا عوامل که به هم اتصال دارند باعث ایجاد معلول می‌شوند
بیانگر کدام مدل زیر در ارتباط با علت بیماری‌ها است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 مدل استخوان ماهی

گزینه 2 مدل شبکه‌ی علیت

گزینه 3 مدل چرخ

گزینه 4 مدل مثلث اپیدمیولوژی

نمایش پاسخ

ب

سوال 11

در مثلث اپیدمیولوژیک کدام عامل وجود ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- مشترک کشوری)

گزینه 1 محیط

گزینه 2 میکروارگانیسم

گزینه 3 زمان

گزینه 4 میزبان

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

در خصوص علیت بیماری‌ها، در مدل چرخ، مرکزیت با کدام عامل زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 اجتماعی

گزینه 2 میزبان

گزینه 3 محیط

گزینه 4 بیولوژیک

نمایش پاسخ

ب

سوال 13

در خصوص تعیین رابطه‌ی علیت مصرف سیگار با سرطان ریه کدامیک از ضوابط علیتی زیر ضعیف‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 قدرت رابطه

گزینه 2 ثبات رابطه

گزینه 3 اختصاصی بودن رابطه


گزینه 4 ارتباط زمانی

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

شکل مقابل بیانگر کدام رابطه‌ی علت- معلولی است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)



گزینه 1 Factor A is necessary, but not sufficient

گزینه 2 Factor A is neither sufficient nor necessary

گزینه 3 Factor A is both necessary and sufficient

گزینه 4 Factor A is sufficient , but not necessary

نمایش پاسخ

ج

سوال 15

در مدل چرخ از مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها کدام مورد زیر، در مرکزیت مدل قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 عوامل ژنتیک میزبان

گزینه 2 عوامل اجتماعی

گزینه 3 عوامل فیزیکی شیمیایی

گزینه 4 عوامل بیولوژیک

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

خطر نسبی عبارت است از: (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 نسبت میزان بروز در گروه مواجهه نیافته به نسبت بروز بیماری در گروه مواجهه یافته.

گزینه 2 نسبت میزان بروز در گروه مواجهه یافته به نسبت بروز بیماری در گروه مواجهه نیافته.

گزینه 3 نسبت میزان شیوع در گروه مواجهه یافته به نسبت شیوع بیماری در گروه مواجهه نیافته.

گزینه 4 نسبت میزان شیوع در گروه مواجهه نیافته به نسبت شیوع بیماری در گروه مواجهه یافته.

نمایش پاسخ

ب

سوال 17

در یک مطالعه‌ی کوهورت مشاهدات ذیل به دست آمده است. خطر نسبی ابتلا به بیماری به دنبال مواجهه مورد مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

		بیماری	
		مثبت	منفی
مواجهه	مثبت	۵۰	۹۹۵۰
	منفی	۱۰۰	۴۹۰۰

گزینه 1 ۲

گزینه 2 ۰/۵۰

گزینه 3 ۰/۲۵

گزینه 4 ۴

نمایش پاسخ

ج

سوال 18

برای مطالعه‌ی بیماری تالاسمی و مالاریا به ترتیب کدامیک از مدل‌های اپیدمیولوژی زیر مناسب‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 چرخ- چرخ

گزینه 2 چرخ- مثلث

گزینه 3 شبکه‌ی علیت- چرخ

گزینه 4 چرخ- شبکه‌ی علیت

نمایش پاسخ

ب

سوال 19

در یک مطالعه مشاهده گردید که از مجموع ۱۰۰۰ نفر بیمار که خون دریافت نکرده بودند ۱۰۰ نفر و از ۲۰۰۰ نفر بیماری که خون دریافت کرده بودند ۵۰۰ نفر به هپاتیت C مبتلا شده‌اند، خطر نسبی در این مطالعه چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 ۰/۲۵.

گزینه 2 ۲/۵

گزینه 3 ۰/۴.

گزینه 4 ۴

نمایش پاسخ

ب

سوال 20

در یک مطالعه‌ی بیست ساله مشاهده شده که از جمع ۷۲۰۰ خانمی که قرص پیشگیری از بارداری دریافت می‌کردند ۷۲ نفر، و از ۱۰ هزار خانمی که قرص پیشگیری از بارداری مصرف نمی‌کردند، ۱۰ نفر مبتلا به سرطان پستان شدند. خطر نسبی در این مطالعه چقدر خواهد بود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

الف)	$\frac{72 \times 10000}{7200 \times 10}$
ب)	$\frac{7200 \times 10}{7200 \times 10000}$
ج)	$\frac{72 \times 9900}{10 \times 7128}$
د)	$\frac{10 \times 7128}{72 \times 9900}$

نمایش پاسخ

الف

سوال 21

وقتی می‌گوییم خطر نسبی (RR) ورزش برای سکت‌ه‌ی قلبی ۹/۰ است معنی آن چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 خطر سکت‌ه‌ی قلبی در افرادی که ورزش می‌کنند ۹۰ درصد افرادی است که ورزش نمی‌کنند.

گزینه 2 خطر سکت‌ه‌ی قلبی در افرادی که ورزش می‌کنند ۹۰ درصد کم‌تر از افرادی است که ورزش نمی‌کنند

گزینه 3 خطر سکت‌ه‌ی قلبی در افرادی که ورزش می‌کنند به احتمال ۹۰ درصد کم‌تر از افرادی است که ورزش نمی‌کنند

گزینه 4 با دانستن خطر نسبی نمی‌توان چنین احتمالی را تعیین کرد

نمایش پاسخ

الف

سوال 22

اگر مقدار خطر نسبی (Relative Risk) کم‌تر از یک شود، نشان دهنده‌ی چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 احتمال بروز بیماری در گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته‌ها برابر است.

گزینه 2 احتمال بروز بیماری در گروه مواجهه یافته بیش‌تر از گروه مواجهه نیافته است.

گزینه 3 نشان دهنده‌ی اثر محافظتی مواجهه با آن عامل در بروز بیماری است.

گزینه 4 خطر نسبی همواره از یک بزرگ‌تر است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 23

در مطالعه‌ای از ۵۰۰ نفر سیگاری طی بیست سال ۲۵۰ نفر مبتلا به سرطان ریه شده‌اند و از ۸۰۰ نفر غیر سیگاری ۲۰۰ نفر مبتلا به سرطان ریه شده‌اند، خطر نسبی کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 ۵/۰

گزینه 2 ۱

گزینه 3 ۲

گزینه 4 ۴

نمایش پاسخ

ج

سوال 24

انجام چندین بار آزمایش یا مطالعه‌ی مشابه، دقیقاً همان نتایج را به دست می‌دهد. کدام فاکتور عوامل مؤثر بر علیت مطرح است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 استحکام

گزینه 2 معقول بودن

گزینه 3 ارتباط موقت

گزینه 4 ثبات

نمایش پاسخ

د

سوال 25

نسبت میزان بروز (تجمعی) در گروه مواجهه یافته به نسبت بروز (تجمعی) بیماری در گروه مواجهه نیافته را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری و شهریور ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 خطر نسبی

گزینه 2 نسبت شانس

گزینه 3 خطر منتسب

گزینه 4 خطر منتسب جمعیت

نمایش پاسخ

الف

سوال 26

در یک جمعیت ۲۰۰ نفری که ۶۰ درصد افراد سیگاری بوده‌اند ۵۰ نفر از سیگاری‌ها و ۱۰ نفر از غیر سیگاری‌ها دچار سرطان ریه شده‌اند. سیگار کشیدن خطر ابتلا به سرطان ریه را چند برابر می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 ۳/۳

گزینه 2 ۴/۳

گزینه 3 ۱/۳

گزینه 4 ۲/۳

نمایش پاسخ

الف

سوال 27

بهترین مدل اپیدمیولوژی برای مطالعه‌ی بیماری تالاسمی‌کدام مدل اپیدمیولوژی زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 مدل مثلث

گزینه 2 مدل چرخ

گزینه 3 مدل شبکه‌ی علیت

گزینه 4 مدل استخوان ماهی

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

جدول زیر در مورد رابطه‌ی فعالیت فیزیکی و ابتلا به دیابت از یک مطالعه‌ی همگروهی روی ۲۰۰۰ نفر به دست آمده است. بر این اساس نسبت شانس و نسبت خطر به ترتیب چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

دیابت ندارد	دیابت دارد	
۳۶۰	۴۰	فعالیت زیاد
۱۲۰۰	۴۰۰	فعالیت کم

گزینه 1 ۰/۴ ، ۰/۳۳

گزینه 2 ۰/۵ ، ۰/۳۳

گزینه 3 ۰/۴ ، ۰/۴

گزینه 4 ۰/۵ ، ۰/۴

نمایش پاسخ

الف

سوال 29

خطر نسبی کدام مشخصه در رابطه‌ی علیتی را نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 دوام

گزینه 2 تقدم زمانی

گزینه 3 وبژگی

گزینه 4 قدرت

نمایش پاسخ

د

سوال 30

در مطالعه روی یک گروه ۱۰۰۰ نفری که شیوع بیماری X در آن‌ها ۶۰% بود در مورد مصرف ماده‌ی غذایی A در طول زندگی از دو گروه بیمار و سالم سؤال شد. در هر دو گروه ۳۰۰ نفر سابقه‌ی مصرف این ماده را داشتند. برآورد خطر نسبی کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ۶

گزینه 2 ۰/۶

گزینه 3 ۰/۳

گزینه 4 ۳

نمایش پاسخ

ج

سوال 31

چنانچه در یک مطالعه‌ی همگروهی (کوهورت)، خطر نسبی (RR) محاسبه شده بیش‌تر از عدد یک باشد (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 همبستگی منفی است و احتمالاً عامل پیشگیری است.

گزینه 2 همبستگی وجود ندارد.

گزینه 3 در مورد همبستگی نمی‌توان قضاوت کرد.

گزینه 4 همبستگی مثبت است و احتمال دارد علیتی باشد.

نمایش پاسخ

د

سوال 32

برای محاسبه‌ی خطر نسبی (RR) در مخرج کسر کدامیک از موارد زیر قرار داده می‌شود؟ (پزشکی شهرپور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 گروه بدون مواجهه

گزینه 2 گروه مواجهه یافته

گزینه 3 میزان بروز در گروه مواجهه یافته

گزینه 4 میزان بروز در گروه بدون مواجهه

نمایش پاسخ

د

سوال 33

کدامیک از عبارات زیر در مورد نسبت خطر (Relative risk) درست است؟ (پزشکی شهرپور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 اگر نسبت خطر کوچک‌تر از یک باشد عامل مواجهه به معنای عامل محافظت کننده است.

گزینه 2 اگر نسبت خطر مساوی یک باشد عامل مواجهه به معنای عامل حفاظت کننده است.

گزینه 3 اگر نسبت خطر کوچک‌تر از یک باشد عامل مواجهه به معنای عامل خطر است.

گزینه 4 اگر نسبت خطر بزرگ‌تر از یک باشد عامل مواجهه به معنای عامل محافظت کننده است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 34

استحکام یک رابطه‌ی علیتی به وسیله‌ی کدامیک از موارد زیر مشخص می‌شود؟ (پزشکی شهرپور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 خطر منتسب جمعیت

گزینه 2 خطر منتسب

گزینه 3 خطر نسبی

گزینه 4 هیچکدام

نمایش پاسخ

ج

سوال 35

بروز بیماری قلبی در افراد دیابتی و غیر دیابتی در یک دوره‌ی ۵ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس جدول زیر مشخص نمایید خطر نسبی (Relative Risk) چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

بیماری قلبی		بیماری غیر قلبی	
دارد	ندارد	دارد	ندارد
۷۰	۹۰	۳۰	۱۰
۱۰۰	۱۶۰	۴۰	۱۰۰

گزینه 1 ۳

گزینه 2 ۳/۸

گزینه 3 ۲

گزینه 4 ۵/۳

نمایش پاسخ

الف

سوال 36

در یک مطالعه‌ی همگروهی کوهورت از ۱۰۰۰ نفر کارگری که با آزیست مواجهه داشتند تعداد ۱۰۰ نفر به سرطان ریه مبتلا شدند. در بین ۲۰۰۰ نفر کارگر بدون مواجهه با آزیست نیز تعداد ۱۰۰ نفر مبتلا به سرطان ریه وجود داشت. نسبت خطر (risk ratio) آزیست در بروز سرطان ریه چقدر است؟ (پزشکی شهرپور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 ۱

گزینه 2 ۲

گزینه 3 ۱۰

گزینه 4 ۲۰

نمایش پاسخ

ب. هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست.

سوال 37

در یک مطالعه‌ی همگروهی، از ده هزار نفر که در مواجهه با یک عامل شیمیایی بودند، در طول پیگیری‌های انجام شده، ۲۰۰ نفر مبتلا به سرطان مثانه شدند و از ده هزار نفر گروهی که آن مواجهه را نداشتند. ۱۰۰ نفر مبتلا به همان سرطان گردیدند. خطر نسبی در این مطالعه چقدر بوده است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 ۲%

گزینه 2 ۳%

گزینه 3 ۲

گزینه 4 ۵

نمایش پاسخ

الف. هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست.

گزینه ۲ درست ؟

سوال 38

جهت محاسبه‌ی خطر نسبی (Relative Risk) کدامیک از میزان‌های زیر بر دیگری تقسیم می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 شیوع در گروه عدم مواجهه بر شیوع در گروه مواجهه یافته

گزینه 2 بروز در گروه عدم مواجهه بر بروز در گروه مواجهه یافته

گزینه 3 شیوع در گروه مواجهه یافته بر شیوع در گروه عدم مواجهه

گزینه 4 بروز در گروه مواجهه یافته بر بروز در گروه عدم مواجهه

نمایش پاسخ

د

سوال 39

هنگامی که چندین بار آزمایش یا مطالعات مشابه دقیقاً به یک نتیجه‌ی واحد منتهی شود کدامیک از شروط ارتباط علیتی محقق شده است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 شدت ارتباط

گزینه 2 دوز- پاسخ

گزینه 3 ثبات

گزینه 4 استحکام

نمایش پاسخ

ج

سوال 40

در خصوص عوامل مؤثر بر علیت در مدل‌های اکولوژیک همه‌ی موارد زیر درست است، بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 استحکام Strength

گزینه 2 ثبات consistency

گزینه 3 معقول بودن plausibility

گزینه 4 ارتباط دائم permanet relationship

نمایش پاسخ

د

سوال 41

در مطالعه‌ای از ۵۰۰ نفر کارگری که با بنزین مواجهه‌ی مستمر دارند. تعداد ۲۰ نفر و از ۲۰۰۰ نفر کارگری که با بنزین مواجهه‌ی مستمر ندارند، تعداد ۳۰ نفر مبتلا به اختلالات کلیوی شدند. خطر نسبی مواجهه با بنزین در ابتلا به این بیماری چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 ۳۷

گزینه 2 ۳۸

گزینه 3 ۲/۶۷

گزینه 4 ۲/۷۴

نمایش پاسخ

ج

سوال 42

در کدامیک از مدل‌های اکولوژیک مرتبط با علیت بیماری‌ها برجسته‌ی ژنتیک تأکید شده است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 مدل مثلث اپیدمیولوژیک

گزینه 2 مدل چرخ

گزینه 3 مدل استخوان ماهی

گزینه 4 مدل شبکه‌ی عنکبوتی

نمایش پاسخ

ب

کدامیک از جملات زیر درباره‌ی خطر نسبی (RR) و نسبت شانس (OR) درست است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 مقدار OR همواره از RR کوچک‌تر است.

گزینه 2 مقدار OR همواره از RR بزرگ‌تر است.

گزینه 3 مقدار OR همواره نسبت به RR در فاصله‌ی دورتری از یک قرار دارد.

گزینه 4 هیچ رابطه‌ای بین RR و OR وجود ندارد.

نمایش پاسخ

ج

در یک جمعیت، خطر ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس در زنان مبتلا به میگرن مورد بررسی قرار گرفت. در زنان مبتلا به میگرن خطر ابتلا به MS در یک دوره‌ی پیشگیری ۱۵ساله، ۴۷% بود. در زنان بدون میگرن خطر ۳۲% بود. اختلاف خطر و نسبت خطر برای رابطه‌ی میگرن با MS را محاسبه نمایید. (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 The risk difference is 0.15% and the risk ratio is 1.47

گزینه 2 The risk difference is 0.15% and the risk ratio is 0.65

گزینه 3 The risk difference is 0.47% and the risk ratio is 0.68

گزینه 4 The risk difference is 0.47% and the risk ratio is 1.47

نمایش پاسخ

الف

مصرف سیگار ۲ برابر سکت‌ه‌ی قلبی و ۴ برابر خطر بروز سرطان ریه را افزایش می‌دهد مربوط به کدامیک از عوامل مؤثر بر علیت قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۷ _قطب مشهد)

گزینه 1 استحکام رابطه (Strength)

گزینه 2 ثبات رابطه (Consistency)

گزینه 3 ارتباط زمانی (Temporality)

گزینه 4 معقول بودن رابطه (Plausibility)

نمایش پاسخ

الف. قدرت یا استحکام رابطه یعنی هر چقدر بیش‌تر سیگار بخشی احتمال سرطان بالاتره.

همه‌ی موارد زیر به عنوان عوامل مؤثر بر علیت درست است بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 استحکام Sterength

گزینه 2 ثبات Cossistency

گزینه 3 ارتباط موقت Temporal Relationship

گزینه 4 عدم ثبات Non Cossistency

نمایش پاسخ

د. ثبات جزء عوامل مؤثر بر علیت است پس عدم ثبات در آن جای نمی‌گیرد.

کدام مدل اپیدمیولوژیک بیش‌تر بر هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط تأکید دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز / دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 چرخ

گزینه 2 استخوان ماهی

گزینه 3 مثلث

گزینه 4 شبکه‌ی علیت

نمایش پاسخ

الف. مدل چرخ بر هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط تأکید دارد و مثلث به تعامل محیط و میزبان و عامل بیماریزا می‌پردازد.

در یک مطالعه‌ی هم‌گروهی در زمینه‌ی ارتباط مصرف نمک و ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی با توجه به نتایج جدول زیر خطر نسبی (Relative Risk) کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

عدم ابتلا به CHD	ابتلا به CHD	
۲۰	۸۰	مصرف نمک زیاد
۶۰	۴۰	مصرف نمک کم

گزینه 1 ۵/۰

گزینه 2 ۱

گزینه 3 ۲

گزینه 4 ۳

نمایش پاسخ

ج. خطر نسبی برابر است با نسیت ۸۰ تقسیم بر ۱۰۰ به ۴۰ تقسیم بر ۱۰۰ که جواب ۲ می‌شود.

سوال 49

در یک مطالعه‌ی کوهورت، برای بررسی ارتباط بین سیروز کبدی و خطر رخداد انسفالوپاتی کبدی، ۱۰۰۰ فرد بالغ پیگیری شدند. از ۵۰۰ بیمار با سیروز، ۳۰۰ و از ۵۰۰ فرد بدون سیروز (کنترل)، ۱۰۰ مورد انسفالوپاتی کبدی رخداد. مقدار خطر نسبی (RR) چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 ۳

گزینه 2 ۵

گزینه 3 ۳.۷۵

گزینه 4 ۲.۵

نمایش پاسخ

الف. خطر نسبی برابر است با نسبت ۳۰۰ به ۱۰۰ که برابر با ۱ است.

سوال 50

در مدل‌های اکولوژیک در ارتباط با علیت بیماری‌ها کدام مدل بر «هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط» تأکید دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 مدل استخوان ماهی

گزینه 2 مدل اعتقاد به سلامتی

گزینه 3 مدل چرخ

گزینه 4 مدل شبکه‌ی علیت

نمایش پاسخ

ج / مدل چرخ به بر هماهنگی و تعامل ژن‌ها و میزبان با محیط تأکید دارد و مثلث به تعامل محیط و میزبان و عامل بیماریزا می‌پردازد.

سوال 51

در خصوص عوامل مؤثر بر علیت، جمله‌ی زیر به کدام مورد اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد)

«مواجهه باید مدت زمان معینی وجود داشته باشد تا معلول بروز کند»

گزینه 1 ارتباط موقت Temporal Relationship

گزینه 2 استحکام Strength

گزینه 3 معقول بودن Plausibility

گزینه 4 ثبات Consistency

نمایش پاسخ

الف

سوال 52

کدام‌یک از موارد زیر از وجوه مشخصه‌ی مدل زیست‌پزشکی (biomedical) است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 رویکرد ماشینی به طرح درمان

گزینه 2 رویکرد پایین به بالا

گزینه 3 متمرکز بر نگرش جامعه در مورد بیماری است.

گزینه 4 تمرکز بر عوامل بیولوژیک در سطح جامعه

نمایش پاسخ

الف

سوال 53

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد شبکه علیت بیماری‌ها صحیح است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 کلیه عوامل موجود در شبکه علیت بیماری‌های چند عاملی از وزن و اهمیت یکسان برخوردارند.

گزینه 2 عوامل موجود در شبکه علیت بیماری‌ها دارای اهمیت نسبی یا "خطر نسبی" نیستند.

گزینه 3 حذف یکی از عوامل موجود در شبکه علیت در مواقعی برای مبارزه با بیماری کافی است.

گزینه 4 بر اساس فرضیه شبکه علیت، کنترل بیماری، مستلزم برطرف کردن عوامل متعدد موجود در شبکه مرتبط با یک بیماری است.

نمایش پاسخ

ج / حذف یکی از عوامل موجود در شبکه علیت در مواقعی برای مبارزه با بیماری کافی است.

سطوح پیشگیری

تعداد سوال : ۱۳۲

نکات:۱- واکسیناسیون جز سطح اول پیشگیری است و غربالگری برای سطح دوم است.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کاهش آلودگی‌های شهرها از طریق محدود کردن دود اتومبیل‌ها، صنایع و وسایل گرم کننده‌ی خانگی، کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 2

استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید چه نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 3

افزایش مالیات بر روغن‌های جامد نسبت به روغن‌های مایع کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

الف

سوال 4

آقای ۶۵ ساله‌ای با شکایت از بیماری گوارشی به پزشک مراجعه می‌کند. پس از معاینه مشخص می‌شود که بیمار تمامی دندان‌های خود را از دست داده و دچار سوءتغذیه گردیده. پزشک بیمار را به دندان‌پزشک جهت درمان و ساخت دندان مصنوعی ارجاع می‌دهد. کدام سطح از پیشگیری در این مورد اتفاق خواهد افتاد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 پیشگیری نخستین

گزینه 2 پیشگیری سطح اول

گزینه 3 پیشگیری سطح دوم

گزینه 4 پیشگیری سطح سوم

نمایش پاسخ

د

سوال 5

آزمون‌های غربالگری در کدام سطح پیشگیری قرار دارند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان/پزشکی اسفند ۹۳ _ قطب دانشگاه آزاد/ دندان پزشکی اسفند۹۴_ قطب دانشگاه آزاد / پزشکی اسفند ۹۴ _ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 سطح اول

گزینه 2 سطح دوم

گزینه 3 سطح سوم

گزینه 4 سطح نخستین

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

آزمایش زوجین قبل از ازدواج برای پیشگیری از تولد کودک مبتلا به تالاسمی، کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

- گزینه 1 مقدماتی
- گزینه 2 اولیه
- گزینه 3 ثانویه
- گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 7

کاستن از دامنه‌ی ناتوانی ناشی از بیماری‌ها و آسیب‌ها کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

- گزینه 1 مقدماتی
- گزینه 2 اول
- گزینه 3 دوم
- گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

د

سوال 8

در کدامیک از سطوح پیشگیری، مهم‌ترین اقدام مداخله‌ای، آموزش بهداشت فردی و همگانی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

- گزینه 1 سطح اول
- گزینه 2 سطح دوم
- گزینه 3 سطح سوم
- گزینه 4 سطح نخستین یا ابتدایی

نمایش پاسخ

د

سوال 9

آموزش اصول خود مراقبتی به فرد مبتلا به سکت‌ی مغزی چه نوع پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

- گزینه 1 بدوی
- گزینه 2 اول
- گزینه 3 دوم
- گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 10

کدامیک از سطوح پیشگیری در مورد حذف یا تغییرات عوامل خطرزای بیماری‌ها صدق می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران/پزشکی شهریور ۹۴_قطب تبریز)

- گزینه 1 پیشگیری سطح اول
- گزینه 2 پیشگیری نخستین
- گزینه 3 پیشگیری سطح دوم
- گزینه 4 پیشگیری سطح سوم

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

پیشگیری سطح نخستین یا ابتدایی primordial کدامیک از موارد ذیل است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

- گزینه 1 جلوگیری از پیدایش و برقراری عوامل خطرزای بیماری است.
- گزینه 2 به پیشگیری از بروز بیماری در اشخاص سالم توجه دارد.
- گزینه 3 کاهش ناتوانی معلول بیماری و کوشش‌هایی که برای برگرداندن اعمال اعضاء و دستگاه‌ها به حالت مؤثر به کار گرفته می‌شود.
- گزینه 4 کشف به موقع و درمان بیماری‌ها، قبل از ایجاد علائم و نشانه‌های واضح بالینی

نمایش پاسخ

ب

سوال 12

نمونه‌گیری خون از پاشنه‌ی پای نوزادان در روزهای اول پس از تولد به منظور تشخیص بیماری کم‌کاری مادرزادی تیروئید، چه سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟
(پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان/پزشکی اسفند۹۳ _قطب شمال)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 13

کدامیک از سطوح پیشگیری به طور خاص به مرحله‌ی قبل از بروز علائم بالینی بیماری مربوط است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ابتدایی

گزینه 2 سطح اول

گزینه 3 سطح دوم

گزینه 4 سطح سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

در برنامه‌ی پیشگیری از بیماری سل، بیماریابی به منظور جلوگیری از «انتشار» بیماری در کدام سطح قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 15

آقای ایروانی نوجوانی است که در یک تصادف دچار له شدگی استخوان فک شده است. جراح کارگزاری پروتز را توصیه می‌کند. این توصیه در کدام سطح پیشگیری جای می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 سوم

گزینه 2 دوم

گزینه 3 اول

گزینه 4 نخستین

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

تشخیص فشار خون بالا در فرزند یک بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و اقدام جهت جلوگیری از پیشرفت آن کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 اول

گزینه 2 دوم

گزینه 3 سوم

گزینه 4 نخستین (ابتدایی)

نمایش پاسخ

ب

سوال 17

آموزش بهداشت فردی، مبارزه با آلودگی آب و تشخیص مقدماتی یک بیماری به ترتیب مثال‌هایی هستند از: (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 پیشگیری نخستین، پیشگیری سطح اول، پیشگیری سطح دوم

گزینه 2 پیشگیری نخستین، پیشگیری نخستین، پیشگیری سطح اول

گزینه 3 پیشگیری سطح اول، پیشگیری سطح اول، پیشگیری سطح دوم

گزینه 4 پیشگیری سطح اول، پیشگیری سطح دوم، پیشگیری سطح دوم

نمایش پاسخ

الف

تغییر الگوی تغذیه در جامعه منطبق با کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 اولیه

گزینه 2 مقدماتی یا نخستین

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

کارشناس علوم بهداشتی در پایگاه بهداشت به کودکان زیر یک سال واکسن تلقیح می‌کند. این اقدام در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

کدامیک از موارد زیر مصداق «راهبرد جمعیتی» در پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 استفاده از محافظ گوش در کارگران

گزینه 2 آهن یاری دختران دانش‌آموز

گزینه 3 بستن کمر بند ایمنی در اتومبیل

گزینه 4 غنی‌سازی آرد نان مصرفی با روی

نمایش پاسخ

د

کاهش آلودگی هوای شهر کدامیک از انواع راهبردهای پیشگیری و در چه سطحی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 راهبرد گروه‌های پر مخاطره از پیشگیری سطح نخستین

گزینه 2 راهبرد گروه‌های پر مخاطره از پیشگیری سطح اول

گزینه 3 راهبرد جمعیتی از پیشگیری سطح اول

گزینه 4 راهبرد جمعیتی از پیشگیری سطح نخستین

نمایش پاسخ

ج

بینایی‌سنجی در بدو ورود به مدرسه کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ابتدایی

گزینه 2 دوم

گزینه 3 اول

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

انجام ماموگرافی برای تشخیص زودرس سرطان پستان و انجام فیزیوتراپی اندام‌ها به دنبال ابتلا به سکت‌های مغزی به ترتیب کدام سطوح پیشگیرانه را تشکیل می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 سطح دوم- سطح سوم

گزینه 2 سطح اول- سطح سوم

گزینه 3 سطح دوم- سط حاول

گزینه 4 سطح دوم- سطح دوم

نمایش پاسخ

الف

شناخت نوزادان مبتلا به فنیل کتونوریا در موقع تولد چه نام دارد و در کدامیک از سطوح پیشگیری مطرح است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 آزمایشات دوره‌ای – اول

گزینه 2 غربالگری – اول

گزینه 3 آزمایشات دوره‌ای – دوم

گزینه 4 غربالگری – دوم

نمایش پاسخ

د

سوال 25

پیشگیری نخستین بیش‌تر بر کدام دسته از بیماری‌ها و گروه سنی تأکید دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 حاد، کودکان

گزینه 2 مزمن، کودکان

گزینه 3 مزمن، جوانان

گزینه 4 حاد، جوانان

نمایش پاسخ

ب

سوال 26

کنترل چاقی در سنین جوانی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 27

انجام برنامه‌ی واکسیناسیون در جامعه مربوط به کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

در کدامیک از سطوح پیشگیری هدف، جلوگیری از پیدایش و برقراری آن دسته از الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی است. که نقش آن‌ها در افزایش خطر بیماری شناخته شده است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال / دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 اول

گزینه 2 نخستین

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 29

انجام واکسیناسیون هپاتیت B در جامعه جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 30

تزریق واکسن کزاز در طی بارداری برای پیشگیری از کزاز بندناف، کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 31

سیاست دولت مبنی بر تولید بنزین با استاندارد یورو ۴ (Euro4) در سطح کشور جهت جلوگیری از آلودگی هوا، جزء کدامیک از سطوح پیشگیری محسوب می‌شود؟
(پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

معاینات چشمی در بدو ورود به مدرسه جهت یافتن موارد تنبلی چشم در کودکان، کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- مشترک کشوری)

گزینه 1 سوم

گزینه 2 چهارم

گزینه 3 اول

گزینه 4 دوم

نمایش پاسخ

د

سوال 33

مواجهه‌ی افراد با دود سیگار افراد سیگاری (Second hand smoker) مخاطرات سلامتی متعددی مانند افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی دارد. نشان داده شده که وضع قوانینی مبنی بر جلوگیری از مصرف دخانیات در اماکن عمومی، خطر ابتلای سایر افراد جامعه به بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش می‌دهد. این مداخله چه سطحی از پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 Primordial

گزینه 2 Primary

گزینه 3 Secondary

گزینه 4 Tertiary

نمایش پاسخ

ب

سوال 34

کدامیک از موارد زیر در مورد پیشگیری نخستین صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 پیشگیری از بیماری با کنترل عوارض است

گزینه 2 بیش‌تر کوشش‌ها معطوف به کودکان است

گزینه 3 کشف زودهنگام بیماری قبل از بروز علائم است

گزینه 4 بیش‌تر متکی بر کاهش پیشرفت بیماری است

نمایش پاسخ

ب

سوال 35

مهم‌ترین اقدام در سطح دوم پیشگیری از بیماری‌ها کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 تشخیص زودرس در مراحل اولیه‌ی بیماری

گزینه 2 جلوگیری از عوامل خطر از طریق آموزش فردی یا همگانی

گزینه 3 کاهش یا حذف عوامل خطرزا در افراد پر خطر

گزینه 4 مداخله در جهت کاهش عوارض بیماری

نمایش پاسخ

الف

سوال 36

غربالگری بیماری دیابت در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/پزشکی شهریور ۹۷_قطب مشهد)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 37

درمان به موقع یک بیماری عفونی (مثل بیماری مقاربتی) به ترتیب از راست به چپ، برای افراد مبتلا و موارد تماس در چه سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 سطح اول – ابتدایی

گزینه 2 سطح اول – سطح دوم

گزینه 3 سطح دوم – ابتدایی

گزینه 4 سطح دوم – سطح اول

نمایش پاسخ

د

سوال 38

«جلوگیری از پیدایش و برقراری آن دسته از الگوهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی، که نقش آن‌ها در افزایش خطر بیماری‌ها شناخته شده است» جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/دندان پزشکی شهریور ۹۷ _ مشترک کشوری/ پزشکی شهریور ۹۳ _قطب تهران)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

الف

سوال 39

کدامیک از موارد زیر «پیشگیری از نوع اول» است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 اندازه‌گیری، میزان سرب خون در کارگران

گزینه 2 بیماریابی برای انگل در مدارس

گزینه 3 اضافه کردن فلوراید به آب

گزینه 4 پاپ‌اسمیر سالیانه در زنان

نمایش پاسخ

ج

سوال 40

برای بیماری پس از نجات از انفارکتوس قلبی جهت کاهش خطر مرگ داروی بتابلاکر تجویز شده است. تجویز این دارو مصداق کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۸ _قطب شمال و زنجان/ پزشکی اسفند ۹۵ _قطب مشهد)

گزینه 1 سطح ثانویه

گزینه 2 سطح اولیه

گزینه 3 سطح ثالثیه

گزینه 4 سطح نخستین

نمایش پاسخ

ج

سوال 41

این عبارت «پیشگیری مانع از ایجاد و گسترش عوامل خطر در کشور و یا گروه‌های جمعیتی خواهد شد» تعریف کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 اولیه

گزینه 2 نخستین

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

سوال 42

سیاست و برنامه‌ریزی بهداشتی باید متوجه تقویت کدام سطح مراقبتی باشد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 سطح مقدماتی

گزینه 2 سطح اول پیشگیری

گزینه 3 سطح دوم پیشگیری

گزینه 4 سطح سوم پیشگیری

نمایش پاسخ

سوال 43

بیمار ۵۰ ساله‌ای دچار انفارکتوس میوکارد شده و بهبود یافته است. پس از ترخیص برای بیمار داروی بتا بلوکر تجویز می‌شود. این اقدام به چه منظور است و مصداق کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 کاهش خطر مرگ- سطح اول

گزینه 2 افزایش فشار خون بیمار- سطح اول

گزینه 3 کاهش خطر مرگ- سطح سوم

گزینه 4 بهبود کیفیت زندگی بیمار- سطح دوم

نمایش پاسخ

سوال 44

اجرای برنامه‌ی غربالگری کم‌کاری تیروئید در ایران کدامیک از سطوح پیشگیری به شمار می‌رود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران/پزشکی اسفند ۹۵_ قطب کرمان)

گزینه 1 دوم

گزینه 2 نخستین

گزینه 3 اول

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

سوال 45

درمان یک فرد مبتلا به بیماری مقاربتی سوزاک چه نوع پیشگیری برای موارد تماسی محسوب می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

سوال 46

تشخیص و درمان گلودرد استرپتوکوکی در دانش‌آموزان یک منطقه برای جلوگیری از تب روماتیسمی کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 اول

گزینه 2 ابتدایی

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

سوال 47

به عنوان پزشک شاغل در بهداری زندان برای هر زندانی جدید بیماریابی فعال سل انجام می‌دهید. این اقدام چه سطحی از پیشگیری برای سایر زندانیان است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال/پزشکی شمال۹۷_قطب شمال)

گزینه 1 مقدماتی (Primordial)

گزینه 2 اول (Primary)

گزینه 3 دوم (Secondary)

گزینه 4 سوم (Tertiary)

سوال 48

شناسایی و ختم حاملگی‌های دچار اختلال در چه سطحی از پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 سطح اول

گزینه 2 سطح دوم

گزینه 3 سطح سوم

گزینه 4 سطح چهارم

سوال 49

تشخیص زودرس بیماری سل ریوی در زمان ورود زندانیان به زندان، به ترتیب چه نوع پیشگیری برای فرد مبتلا و برای زندانیان دیگر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ثانویه – اولیه

گزینه 2 اولیه – اولیه

گزینه 3 ثانویه – ثانویه

گزینه 4 اولیه – ثانویه

سوال 50

کدامیک از موارد زیر پیشگیری نوع دوم محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد/پزشکی اسفند ۹۷ _قطب زنجان/ پزشکی شهریور ۹۳_ قطب دانشگاه شهید بهشتی/ دندان پزشکی اسفند ۹۶_قطب شیراز، همدان، زنجان)

گزینه 1 کاهش میزان کلسترول خون

گزینه 2 کاهش آلودگی هوای تهران

گزینه 3 نوتوانی در مبتلایان به فلج اطفال

گزینه 4 غربالگری برای تشخیص فنیل کتونوری در نوزادان

سوال 51

پزشکی به منظور پیشگیری از سکت‌های قلبی مجدد اقدام به تجویز داروی بتابلوکر به بیمار خود نموده است. اقدام پزشک در چهارچوب کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۳ – قطب تبریز)

گزینه 1 ابتدایی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

سوال 52

کدامیک از موارد زیر به عنوان پیشگیری نوع اول محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 بیماریابی برای انگل در مدارس

گزینه 2 اضافه کردن فلور به آب

گزینه 3 پاپ‌اسمیر سالیانه‌ی زنان

گزینه 4 اندازه‌گیری میزان سرب خون در کارگران

سوال 53

مسئولین یک فروشگاه زنجیره‌ای اقدام به نصب دستگاه کنترل فشار خون در همه‌ی فروشگاه‌های تحت پوشش نموده‌اند. این اقدام با کدامیک از سطوح پیشگیری بیش‌تر تطابق دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 دوم

گزینه 2 نخستین

گزینه 3 سوم

گزینه 4 اول

نمایش پاسخ

الف

سوال 54

تجویز عینک به منظور اصلاح دید، کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- مشترک کشوری)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

د

سوال 55

کدامیک از موارد زیر پیشگیری ثانویه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 آزمایش هورمون تیروئید در نوزادان در بدو تولد

گزینه 2 اندازه‌گیری منظم فشار خون در افراد بالای سی سال

گزینه 3 آزمایش منظم قند خون در بیماران دیابتی

گزینه 4 انجام ماموگرافی سالیانه در خانم‌های یائسه

نمایش پاسخ

ج

سوال 56

کدامیک از موارد ذیل از معایب راهبرد جمعیتی پیشگیری سطح اول است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 عدم انگیزه‌ی پزشکی

گزینه 2 فایده‌ی کم برای افراد

گزینه 3 از نظر نسبت خطر ممکن است کم فایده باشد.

گزینه 4 همه‌ی موارد فوق

نمایش پاسخ

د

سوال 57

وقتی پزشک خانواده‌ای برای مادران باردار منطقه‌ی تحت پوشش خود آزمایشات قند خون، شمارش گلبولی خون و سایر آزمایشات خاص دیگر را درخواست می‌کند.

فعالیت ایشان در کدام سطح پیشگیری مصداق پیدا می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 Tertiary level

گزینه 2 Primary level

گزینه 3 Primordial level

گزینه 4 Secondary level

نمایش پاسخ

د

سوال 58

پیشگیری از پیدایش و برقراری عوامل خطرزایی بیماری، کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- مشترک کشوری/پزشکی اسفند۹۷ _ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

الف

سوال 59

کامل‌ترین تعریف برای پزشکی پیشگیری چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 علم ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری و بازتوانی

گزینه 2 علم و هنر ارتقای سلامت، پیشگیری از بیماری، بازتوانی و محدود کردن بیماری

گزینه 3 آموزش پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر

گزینه 4 آموزش ارتقای سلامت، جلوگیری از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر و بازتوانی

نمایش پاسخ

ب

سوال 60

در مورد سطوح پیشگیری کدام مورد از موارد زیر صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 پیشگیری سطح اول، پیشگیری از بیماری با کنترل علل و عوامل خطرزا است

گزینه 2 پیشگیری سطح دوم، کشف و درمان بیماری‌ها قبل از ایجاد علائم و نشانه‌های بالینی است.

گزینه 3 پیشگیری سطح سوم، جلوگیری از ایجاد و گسترش عامل خطر در جمعیتی است که هنوز خطر در آن بروز نکرده است.

گزینه 4 پیشگیری نخستین، کاهش پیشرفت یا عوارض بیماری‌ها است.

نمایش پاسخ

الف و ب

سوال 61

ایجاد کمربند سبز (درختکاری در سطح وسیع)، به منظور کاهش آلودگی هوا در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 پیشگیری سطح نخستین (ابتدایی)

گزینه 2 پیشگیری سطح اول

گزینه 3 پیشگیری سطح دوم

گزینه 4 پیشگیری سطح سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 62

انجام تست فنیل کتونوری در نوزادان و پاپ‌اسمیر در زنان ۶۰-۲۰ سال به ترتیب چه سطحی از پیشگیری تلقی می‌شوند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 اول- دوم

گزینه 2 اول- دوم

گزینه 3 دوم- اول

گزینه 4 دوم- دوم

نمایش پاسخ

د

سوال 63

تشخیص مقدماتی یک بیماری با عارضه‌ی نامشهود با استفاده از آزمون‌های معاینه‌ی (غربالگری) در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 پیشگیری سطح اول

گزینه 2 پیشگیری سطح دوم

گزینه 3 پیشگیری سطح سوم

گزینه 4 پیشگیری سطح چهارم

نمایش پاسخ

ب

سوال 64

در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر، شناسایی افراد در معرض خطر بالا با استفاده از روش‌های بالینی مناسب و محافظت آنان جزء کدامیک از انواع پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 65

معاینات دوره‌ای دهان و دندان دانش‌آموزان کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان/دندانپزشکی اسفند ۹۶_ قطب شمال و اصفهان و کرمان)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 66

سنجش فشار خون عابران در یک مرکز تجاری، کدام سطح از پیشگیری است؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 اول

گزینه 2 دوم

گزینه 3 نخستین

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 67

این عبارت «پیشگیری مانع از ایجاد و گسترش عوامل خطر در کشور و یا گروه‌های جمعیتی خواهد شد» تعریف کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

الف

سوال 68

یک آقای ۴۵ ساله به طور مرتب هر شش ماه یک بار برای معاینات دوره‌ای به دندان‌پزشک مراجعه می‌کند. اقدام ایشان در راستای کدامیک از مراحل پیشگیری قرار دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شهیدبهرشتی)

گزینه 1 ابتدایی

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 69

نوتوانی در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

د

سوال 70

انجام غربالگری برای بیماری سل ریوی در زمان ورود زندانیان جدید زندان به ترتیب از راست به چپ چه نوع پیشگیری برای فرد و سایر زندانیان است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 اولیه- اولیه

گزینه 2 اولیه- ثانویه

گزینه 3 ثانویه- اولیه

گزینه 4 ثانویه- ثانویه

نمایش پاسخ

ج

سوال 71

ممنوعیت مصرف چپیس و پفک در بوفه‌ی مدارس مربوط به کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

الف

سوال 72

انجام پاپ اسمیر (Pap-Smear) از کدامیک از سطوح پیشگیری به شمار می‌رود؟ (پزشکی شهریور ۹۶ – قطب آزاد / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد/پزشکی اسفند۹۶_قطب شمال و اصفهان و کرمان پزشکی اسفند ۹۶ _قطب شمال و اصفهان و کرمان)

گزینه 1 سطح نخستین

گزینه 2 سطح اول

گزینه 3 سطح دوم

گزینه 4 سطح سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 73

پیشگیری نخستین در بیماری عروق کرونر قلب کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۶ – هشت قطب مشترک)

گزینه 1 غربالگری افراد با خطر بالا (High risk)

گزینه 2 کنترل مرتب فشار خون

گزینه 3 آزمایشات و معاینات دوره‌ای

گزینه 4 تغییر شیوه‌ی زندگی

نمایش پاسخ

د

سوال 74

کدامیک از اقدامات زیر، پیشگیری «سطح سوم» برای بیماری‌ها منظور می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- مشترک کشوری)

گزینه 1 فعالیت ورزشی

گزینه 2 غربالگری

گزینه 3 توانبخشی

گزینه 4 کاهش وزن

نمایش پاسخ

ج

سوال 75

فرد چاقی که برای کاهش وزن خود به مطب پزشک تغذیه مراجعه می‌کند چه سطحی از پیشگیری را در برابر ابتلا به برخی از سرطان‌ها انجام داده است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 پیشگیری نخستین

گزینه 2 پیشگیری اولیه

گزینه 3 پیشگیری ثانویه

گزینه 4 پیشگیری ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 76

کدامیک از اقدامات زیر نمونه‌ای از پیشگیری ثانویه است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 واکسن پنوموکوک در بیمارانی که طحال آن‌ها برداشته شده است.

گزینه 2 درمان با هورمون جایگزین برای یائسگی

گزینه 3 لخته‌زدایی برای انفارکتوس میوکارد حاد

گزینه 4 کاهش کلسترول در بیماران عروق کرونر بدون علامت

نمایش پاسخ

د

سوال 77

این عبارت که پیشگیری ممکن است برای جامعه منفعت زیاد داشته باشد، اما منفعت ظاهری آن برای فرد اندک باشد، تعریف کدام عبارت است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 اختصاصی بودن

گزینه 2 هزینه‌ی اثربخشی

گزینه 3 پیشگیری مغایر

گزینه 4 پیشگیری همگانی

نمایش پاسخ

ج

سوال 78

درمان موارد سل با خلط مثبت برای سایر افراد جامعه کدامیک از سطوح پیشگیری به حساب می‌آید؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 79

«کاهش آلودگی هوای شهر از طریق محدود کردن دود اتومبیل‌ها»، «درمان به موقع بیماری‌های مقاربتی» به ترتیب از راست به چپ جزء کدام سطح از پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 اول، اول

گزینه 2 اول، دوم

گزینه 3 دوم، دوم

گزینه 4 دوم، اول

نمایش پاسخ

ب

سوال 80

برای کنترل آسیب‌های ناشی از حوادث رانندگی همه‌ی موارد، پیشگیری اولیه محسوب می‌شود،_بی‌چیز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 بستن کمربند ایمنی

گزینه 2 نصب علائم راهنمایی

گزینه 3 شن پاشی در برف

گزینه 4 امدادرسانی سریع

نمایش پاسخ

د

سوال 81

در یک مطالعه در منطقه‌ای ۱۰ درصد مردم افزایش فشار خون داشتند. پیدا کردن این افراد کدام سطح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- مشترک کشوری)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 82

پیشگیری در مراحل اولیه‌ی بیماری کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 سطح دوم

گزینه 2 سطح اول

گزینه 3 سطح ابتدایی

گزینه 4 سطح سوم

نمایش پاسخ

الف

سوال 83

کدامیک از اقدامات زیر اقدامات بهداشتی برای ارتقای سلامت است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 واکسیناسیون

گزینه 2 جداسازی سالمندان در معرض خطر

گزینه 3 توزیع دهانشویه حاوی فلوراید

گزینه 4 ترمیم دندان پوسیده

نمایش پاسخ

ج

سوال 84

پیشگیری از ایجاد عوامل خطر، چه نوع پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۷- قطب دانشگاه آزاد / پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز/ پزشکی کلاسیک شهریور۹۸- قطب کرمان/ دندان پزشکی شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 Primary

گزینه 2 Secondary

گزینه 3 Tertiary

گزینه 4 Primordial

نمایش پاسخ

د

سوال 85

کدامیک از اقدامات زیر، پیشگیری سطح اول از بیماری‌ها تلقی می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 استفاده از کاندوم جهت جلوگیری از ابتلا به عفونت‌های آمیزشی

گزینه 2 تغییر وضعیت بیمار فلج نخاعی به منظور جلوگیری از ایجاد زخم فشاری

گزینه 3 تشخیص فنیل کتونوری در نوزادان و حذف فنیل‌آلانین از رژیم غذایی

گزینه 4 آموزش کودکان دبستانی به منظور عدم گرایش به مصرف دخانیات

نمایش پاسخ

الف

سوال 86

تشخیص به موقع بیماری و درمان آن در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 پیشگیری ثانویه

گزینه 2 پیشگیری اولیه

گزینه 3 پیشگیری نخستین

گزینه 4 پیشگیری ثالثیه

نمایش پاسخ

الف

سوال 87

درمان به موقع و سریع بیماری‌های مقاربتی مثل سوزاک و سیفلیس در یک جامعه در راستای کدام سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 نخستین و اول

گزینه 2 اول و دوم

گزینه 3 دوم و سوم

گزینه 4 نخستین

نمایش پاسخ

ب

سوال 88

«غربالگری فنیل کتونوریا در نوزادان» و «آموزش بهداشت همگانی در یک مدرسه‌ی ابتدایی»، به ترتیب از راست به چپ، در کدامیک از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 ثانویه- اولیه

گزینه 2 ثانویه- نخستین

گزینه 3 اولیه- نخستین

گزینه 4 اولیه- اولیه

نمایش پاسخ

ب

سوال 89

در مورد سطوح پیشگیری عبارات زیر صحیح است، بجز (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 جلوگیری از پیدایش الگوهای اجتماعی پرخطر پوسیدگی دندان، پیشگیری نخستین است

گزینه 2 پیشگیری سطح دوم در مبارزه با انتقال بیماری‌های واگیر، ابزاری کارآمد است

گزینه 3 کنترل علل و عوامل خطر پوسیدگی دندان، یک نوع پیشگیری اولیه است

گزینه 4 ارزش پیشگیری سطح دوم، در کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان دهان از طریق غربالگری است

نمایش پاسخ

ب

سوال 90

کدام گزینه در رابطه با پیشگیری مقدماتی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 در پیشگیری از بیماری‌های حاد اهمیت بالایی دارد

گزینه 2 در واقع همان مرحله‌ی اول پیشگیری است

گزینه 3 از خو گرفتن بزرگسالان به عادات مضر جلوگیری می‌کند

گزینه 4 به معنی پیشگیری از ظهور عوامل خطر در گروه‌هایی است که عامل خطر در آن‌ها مشاهده شده است

نمایش پاسخ

ب

سوال 91

استفاده از فیشورسیلنت برای متوقف کردن یک ضایعه‌ی اکلوزال کدام نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی شهریور و اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 اولیه

گزینه 2 ثانویه

گزینه 3 ثالثیه

گزینه 4 نخستین

نمایش پاسخ

ب

سوال 92

بیماری بدون علائم درد دندانی جهت معاینه به کلینیک دندان‌پزشکی مراجعه نموده است. پس از معاینه‌ی تعدادی از دندان‌های پوسیده بیمار ترمیم می‌گردد با انجام

این کار کدام سطح پیشگیری را اعمال نموده‌ایم؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 پیشگیری مقدماتی

گزینه 2 پیشگیری سطح اول

گزینه 3 پیشگیری سطح دوم

گزینه 4 پیشگیری سطح سوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 93

در پیشگیری از بیماری قلبی، «ترویج فعالیت بدنی منظم» و «درمان پرفشاری خون» به ترتیب چه نوع پیشگیری محسوب می‌شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب

اصفهان)

گزینه 1 نخستین- اولیه

گزینه 2 نخستین- ثانویه

گزینه 3 اولیه- ثانویه

گزینه 4 ثانویه- ثالثیه

نمایش پاسخ

الف

سوال 94

غربالگری سرطان روده‌ی بزرگ جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 ابتدایی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ج

سطح اول - واکسن

سوال 95

بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی (به عنوان مثال حمل و نقل ریلی) در یک کشور، کدام سطح پیشگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 مقدماتی (نخستین)

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

الف. کلیدواژه‌ی ارتقاء مخصوص سطح نخستین است.

سوال 96

پیشگیری از آلودگی هوای شهری جزء کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب. کلیدواژه‌ی سطح اولیه‌ی پیشگیری است. و در کل حذف یا تغییر عوامل خطرزای بیماری مربوط به این سطح است.

سوال 97

کدامیک از موارد ذیل به عنوان پیشگیری سطح اول محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب کرمان، تهران و اصفهان)

گزینه 1 اقدامات حفاظتی اختصاصی

گزینه 2 کنترل بیماری دیابت در افراد مبتلا

گزینه 3 آموزش شیوه‌ی زندگی سالم به کودکان

گزینه 4 غربالگری فنیل کتونوری در نوزادان

نمایش پاسخ

الف. کلیدواژه‌ی سطح اولیه‌ی پیشگیری است. و در کل حذف یا تغییر عوامل خطرزای بیماری مربوط به این سطح است.

سوال 98

انجام واکسیناسیون عمومی و درمان مالاریا به ترتیب مربوط به کدام سطح پیشگیری می‌باشند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 دوم- اول

گزینه 2 مقدماتی- اول

گزینه 3 اول- دوم

گزینه 4 سوم- دوم

نمایش پاسخ

ج. کلیدواژه‌ی سطح اولیه‌ی پیشگیری است مانند واکسیناسیون و کلیدواژه‌ی سطح ثانویه‌ی درمان و غربالگری است.

سوال 99

کدام جمله در مورد روش‌های پیشگیری نادرست است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 عیب اصلی راهبرد جمعیتی در پیشگیری سطح اول، این است که برای هر فرد فایده‌ی کمی دارد.

گزینه 2 پیشگیری سطح دوم عمدتاً در حیطه‌ی وظایف پزشکانی است که در درمانگاه‌ها انجام وظیفه می‌کنند.

گزینه 3 در مبارزه با انتقال بیماری، پیشگیری سطح دوم ابزاری نسبتاً کارآمد است.

گزینه 4 هدف پیشگیری سطح سوم کاهش پیشرفت کاهش پیشرفت یا عوارض بیماری است.

نمایش پاسخ

ج. کلیدواژه‌ی سطح اولیه‌ی پیشگیری است مانند واکسیناسیون و کلیدواژه‌ی سطح ثانویه‌ی درمان و غربالگری است. در سطح سوم هم به دنبال بازتوانی می‌باشیم.

سوال 100

برای کاهش عوارض و شدت بیماری کدام سطح پیشگیری (از راست به چپ) مناسب‌تر است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 دوم- دوم

گزینه 2 دوم- سوم

گزینه 3 سوم- دوم

گزینه 4 سوم- سوم

نمایش پاسخ

ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه‌ی درمان و غربالگری است. برای بازتوانی هم سطح سوم کاربرد دارد.

سوال 101

کدامیک از سطوح پیشگیری بیش‌تر در سلامت و رفاه کل جامعه سهم هستند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 نخستین و ثانویه

گزینه 2 اولیه و ثانویه

گزینه 3 نخستین و اولیه

گزینه 4 ثانویه و ثالثیه

نمایش پاسخ

ج / سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و از ایجاد و گسترش عوامل خطر در جامعه جلوگیری می‌کند و در سطح اولیه هم واکسیناسیون را داریم که هر دوی این سطح‌ها در سلامت و رفاه کل جامعه سهیم هستند.

سوال 102

نصب توری روی پنجره‌ها برای پیشگیری از بیماری سالک، کدام سطح پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 نخستین

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ب / حذف یا تغییر عوامل خطرزای یک بیماری مربوط به سطح اول پیشگیری است.

سوال 103

الزام به انجام معاینات فنی دوره‌ای خودروها، با هدف کاهش بیماری‌های تنفسی، چه نوع پیشگیری محسوب می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 نخستین Primordial

گزینه 2 اولیه Primary

گزینه 3 ثانویه Secondary

گزینه 4 ثالثیه Tertiary

نمایش پاسخ

ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است. در واقع معاینه‌ی فنی خودرو هم نوعی غربالگری است.

سوال 104

اصلاح شیوه‌ی زندگی مثل تغذیه و فعالیت بدنی جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 پیشگیری سطح نخستین Primordial

گزینه 2 پیشگیری سطح اول Primary

گزینه 3 پیشگیری سطح دوم Secondary

گزینه 4 پیشگیری سطح سوم Tertiary

نمایش پاسخ

الف / سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و از ایجاد و گسترش عوامل خطر در جامعه جلوگیری می‌کند.

سوال 105

غربالگری برای سرطان، در کدام سطح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 اساسی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است.

سوال 106

غربالگری دانشجویان پزشکی از نظر ابتلا به بیماری افسردگی، کدامیک از سطوح پیشگیری محسوب می‌گردد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است.

سوال 107

حذف آلاینده از هوای محیط کار برای کارگران، درمان فرد مبتلا به سل جهت عدم ابتلای سایر افراد خانوادگی بیمار به ترتیب از راست به چپ، چه سطحی از پیشگیری محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 اول، اول

گزینه 2 نخستین، اول

گزینه 3 اول، دوم

گزینه 4 نخستین، دوم

نمایش پاسخ

ب / حذف آلاینده از هوای محیط کار برای کارگران، برای خود آن‌ها سطح نخستین و درمان کسی که سل دارد برای اینکه دیگری مبتلا نشود سطح اولیه است.

سوال 108

در نیمه‌ی اول سال ۹۸، طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور انجام گرفت. کدام نوع پیشگیری هدف اصلی بود؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 Primordial

گزینه 2 Tertiary

گزینه 3 Primary

گزینه 4 Secondary

نمایش پاسخ

د / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است.

سوال 109

پیشگیری نخستین در بیماری عروق کرونر کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 معاینات دوره‌ای

گزینه 2 اصلاح شیوه‌ی زندگی

گزینه 3 غربالگری افراد در معرض خطر

گزینه 4 کنترل فشار خون

نمایش پاسخ

ب / سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و باعث اصلاح شیوه‌ی زندگی می‌شود و از ایجاد و گسترش عوامل خطر در جامعه جلوگیری می‌کند.

سوال 110

جهت کنترل سرطان کولورکتال در یک منطقه، توصیه به انجام کولونوسکوپی در افراد بالای ۵۰ سال جهت تشخیص زودرس و درمان موارد می‌گردد. این اقدام جزء کدام دسته از سطوح پیشگیری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

ج / کلیدواژه‌ی سطح ثانویه درمان و غربالگری است. در سوال منظور غربالگری است.

سوال 111

استفاده از کیسه‌ی هوا در اتومبیل‌ها جهت پیشگیری از حوادث جاده‌ای بیانگر کدام سطح از پیشگیری است؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

نمایش پاسخ

ب / حذف یا تغییر عوامل خطرزای یک بیماری مربوط به سطح اول پیشگیری است.

سوال 112

کدامیک جزء مزایای راهبرد جمعیتی در پیشگیری سطح اول نیست؟ (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 فایده‌اش از نظر نسبت خطر مطلوب است.

گزینه 2 کاری اساسی و ریشه‌ای است.

گزینه 3 از نظر رفتاری مناسب است.

گزینه 4 برای افراد مناسب است.

نمایش پاسخ

د. راهبرد جمعیتی برای افراد به شکل جداگانه مناسب نیست.

سوال 113

کدام یک از موارد زیر از انواع پیشگیری سطح اولیه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 بازسازی دندان برای زیبایی شکل

گزینه 2 استفاده از فیشور سیلانت برای متوقف کردن ضایعه‌ی اکلوزال

گزینه 3 استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی

گزینه 4 استفاده از برچسب نیکوتین برای ترك سیگار

نمایش پاسخ

ج

سوال 114

کدام یک از موارد زیر مثالی برای پیشگیری ثانویه به شمار می‌رود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 استفاده از فلوراید برای متوقف کردن یک ضایعه‌ی پوسیدگی اولیه

گزینه 2 کنترل رژیم غذایی

گزینه 3 استفاده از خمیردندان حاوی فلوراید

گزینه 4 بازسازی دندان برای زیبایی شکل و کارکرد آن

نمایش پاسخ

الف

سوال 115

بازسازی دندان برای زیبایی شکل و کارکرد آن» به کدام سطح پیشگیری اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 پیشگیری نخستین

گزینه 2 پیشگیری اولیه

گزینه 3 پیشگیری ثانویه

گزینه 4 پیشگیری ثالثیه

نمایش پاسخ

د

سوال 116

ترویج مصرف دهان‌شویه‌ی سدیم فلوراید در سطح مدارس ابتدائی، جزء کدامیک از سطوح پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 اول Primary Prevention

گزینه 2 مقدماتی Primordial. P

گزینه 3 دوم Secondary. P

گزینه 4 سوم Tertiary.P

نمایش پاسخ

الف

سوال 117

کدام یک در خصوص سطوح پیشگیری صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 پیشگیری نخستین به عوامل علیتی خاص توجه دارد.

گزینه 2 مقصود از پیشگیری سطح اول، پیشگیری از بیماری با کنترل علل و عوامل خطرزا است.

گزینه 3 پیشگیری سطح دوم به شرایط اصلی علیتی توجه دارد.

گزینه 4 پیشگیری سطح اول و دوم بیش‌تر در سلامت و رفاه کل جامعه سهیم‌اند.

نمایش پاسخ

ب. کلید واژه‌های پیشگیری سطح اول، پیشگیری و حذف عوامل خطر ساز است.

سوال 118

آموزش نحوه‌ی صحیح «مسواک زدن» کدام نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 سطح اول

گزینه 2 سطح دوم

گزینه 3 سطح سوم

گزینه 4 سطح نخستین

نمایش پاسخ

د

سوال 119

در آموزش شخص برای در پیش گرفتن شیوه‌ی زندگی مناسب، کدام نوع پیشگیری انجام شده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 پیشگیری نخستین

گزینه 2 پیشگیری اولیه

گزینه 3 پیشگیری ثانویه

گزینه 4 پیشگیری ثالثیه

نمایش پاسخ

الف. سطح نخستین آموزش و تربیت می‌دهد و از ایجاد و گسترش عوامل خطر در جامعه جلوگیری می‌کند.

سوال 120

در اکثر کشورها بالغ بر ۳۰ درصد بودجه بهداشت عمومی صرف هزینه‌های سلامت صرفاً برای ۱ تا ۵ درصد جمعیت می‌شود. با توجه به محدود بودن منابع مالی و افزایش روزافزون هزینه ی خدمات سلامت، توصیه‌ی شما تمرکز بر کدام سطح از اقدامات پیشگیرانه است؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 سطح یک

گزینه 2 سطح دو

گزینه 3 سطح سوم

گزینه 4 غیرحرفه‌ای

نمایش پاسخ

الف

سوال 121

وقتی به عنوان دندان‌پزشک در یک مدرسه به معاینات دندان دانش‌آموزان می‌پردازید و موارد مشکوک یا مشکل را به کلینیک دندان‌پزشکی ارجاع می‌دهید، کدام سطوح پیشگیری را انجام داده‌اید؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 پیشگیری نخستین

گزینه 2 پیشگیری سطح اول

گزینه 3 پیشگیری سطح دوم

گزینه 4 پیشگیری سطح سوم

نمایش پاسخ

ج. کار شما یه نوع غربالگریه که سطح دوم پیشگیری محسوب میشه.

سوال 122

فیزیوتراپی برای برگرداندن حرکت به یک عضو عارضه دیده به کدام سطح پیشگیری اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 سطح اول

گزینه 2 سطح دوم

گزینه 3 سطح سوم

گزینه 4 نخستین

نمایش پاسخ

ج. بازتوانی میشه سطح سوم

سوال 123

استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند (ماسک، دستکش) توسط دندان‌پزشکان مربوط به کدام نوع پیشگیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 پیشگیری نخستین

گزینه 2 پیشگیری اولیه

گزینه 3 پیشگیری ثانویه

گزینه 4 پیشگیری نوع سوم (ثالثیه)

نمایش پاسخ

ب. دست و ماسکش برای پیشگیری از عوامل خطر ساز انجام میشه. سطح اول پیشگیری

سوال 124

در مورد پیشگیری سطح اول از تروماهای دندانی، کدام گزینه ی زیر صحیح نیست؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 دانش‌افزایی پزشکان

گزینه 2 استفاده از محافظ‌های دندانی

گزینه 3 ایمن‌سازی زمین‌های بازی

گزینه 4 درمان‌های ارتودنسی پیشگیرانه

نمایش پاسخ

الف

سوال 125

در مورد سطوح پیشگیری، کدام گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان)

گزینه 1 از اقدامات خاص پیشگیری ثانویه، تشخیص زودرس (مانند غربالگری) و درمان کافی بیماری‌ها است.

گزینه 2 اقداماتی که از عوارض بیماری جلوگیری کرده و احتمال ناتوانی را کاهش می‌دهد، پیشگیری نخستین نامیده می‌شود.

گزینه 3 پیشگیری از وجود یا ایجاد عوامل خطر در گروه‌های جمعیتی که هنوز عوامل خطر آن‌ها بروز نکرده را پیشگیری اولیه می‌گویند.

گزینه 4 پیشگیری ثانویه در مبارزه با انتقال بیماری یک ابزار کامل و مقرون به صرفه است.

سوال 126

کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با سطوح پیشگیری از بیماری ها صحیح است؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 پیشگیری ثانویه، روش کاملی برای کنترل بیماری های قابل انتقال است.

گزینه 2 پیشگیری اولیه رویکردی جامع است و اساساً بر معیارهای تعیین شده برای ارتقاء سطح سلامتی استناد دارد.

گزینه 3 پیشگیری ثانویه، به عنوان آموزش بهداشت و مفهوم مسئولیت فردی و اجتماعی در مقابل سلامتی شناخته می شود.

گزینه 4 آزمون های غربالگری از اقدامات مداخله ای خاص پیشگیری اولیه است.

سوال 127

فلوریداسیون نمک برای پیشگیری از پوسیدگی دهان جزء کدامیک از روش های پیشگیری است؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 روش مبتنی بر خود مراقبتی

گزینه 2 روش مبتنی بر عملکرد شاغلان حرفه ای دندان پزشکی

گزینه 3 روش مبتنی بر سلامت جامعه

گزینه 4 روش مبتنی بر پرخطری

ج. اسمش رو پیچوندن. اضافه کردن فلوئور به نمک که توی کل جامعه مصرف میشه همیشه راهبرد جمعیتی و همون روش مبتنی بر سلامت جامعه

سوال 128

معاینه بالینی پستان و بستن کمربند ایمنی در خودرو به ترتیب چه سطحی از پیشگیری محسوب میشود(پزشکی و دندان پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 ثانویه –اولیه

گزینه 2 ثانویه – ثانویه

گزینه 3 اولیه – ثانویه

گزینه 4 اولیه – اولیه

الف / معاینه پستان سطح دوم و بستن کمربند سطح اول پیشگیری است.

سوال 129

اقداماتی که میتواند بیماری را در مرحل پنهان ان متوقف و از بروز ان جلوگیری کند چه نوع پیشگیری نامیده میشود؟(دندان پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اولیه

گزینه 3 ثانویه

گزینه 4 ثالثیه

ج/متوقف کردن بیماری در مرحل پنهان ان جز پیشگیری ثانویه است.

سوال 130

کدام یک از تعاریف زیر مطابقت بیشتری با آموزش بهداشت دارد؟(پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 انتقال دانش بهداشتی به افرادی که آگاهی محدودی درباره پیشگیری از بیماریها دارند

گزینه 2 سلسله فعالیت هایی است که برای بهبود وضع بهداشت جامعه برنامه ربطی شده است

گزینه 3 فرایند تغییر رفتاری است که بین دانش بهداشتی و به کار بستن ان جهت سلامت ارتباط برقرار می کند.

گزینه 4 آموزشی است که در افراد آگاهی لازم نسبت به سبک زنتپی سالم را ایجاد میکند

ج آموزش بهداشتی: به دانش بهداشتی و به کار بستن آن از ارتباط برآوردن.

سوال 131

انجام تست پاپ اسمیر برای پی بردن به بیماری سرطان دهانه رحم چه نوع پیشگیريست؟(پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 اول

گزینه 2 دوم

گزینه 3 مقدماتی

گزینه 4 سوم

ب/ تست پاپ اسمیر جز پیشگری سطح دوم است.

سوال 132

کدام یک از موارد زیر، «پیشگیری ثالثیه» محسوب می‌شود؟ (علوم پایه پزشکی دی۹۹-میان دوره کشوری)

گزینه 1 ارتقا سلامت

گزینه 2 غربالگری

گزینه 3 جلوگیری از ناتوانی

گزینه 4 تشخیص و درمان زودرس

نمایش پاسخ

ج/ واکسیناسیون، سطح یک و غربالگری و درمان بیماری سطح دوم و جلوگیری از ناتوانی پیشگیری ثالثیه است.

جمعیت‌شناسی پزشکی

تعداد سوال: ۶۰

درجه سختی: اسان

نکات: ۱-فرمول وابستگی را حتما بلد باشید

۲-شکل هرم سنی به ازدواج وابسته نیست

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

موضوع اساسی جمعیت‌شناسی مطالعه کدامیک از پدیده‌های جمعیتی است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز/پزشکی شهریور ۹۷_قطب همدان)

گزینه 1 باروری- مرگ و میر- مهاجرت

گزینه 2 ساخت جعیت- کاهش یا افزایش و توزیع مکانی

گزینه 3 ازدواج- طلاق- مرگ و میر- موالید

گزینه 4 توزیع مکانی- ازدواج- طلاق

نمایش پاسخ

الف

سوال 2

سرشماری جمعیت بر مبنای روش دو فاکتو (Defacto) کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 کلیه‌ی جمعیت حاضر در یک منطقه با کشور شمارش شوند (صرف نظر از تابعیت)

گزینه 2 کلیه‌ی جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه (صرف نظر از محل سکونت)

گزینه 3 هر دو روش فوق

گزینه 4 هیچکدام

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

در همه‌ی موارد زیر استفاده از سرشماری توصیه می‌گردد، بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان/پزشکی اسفند ۹۷_قطب شمال)

گزینه 1 اطلاعات مورد نیاز برای تک‌تک افراد جامعه خواسته شده باشد.

گزینه 2 افراد جامعه از حیث صفت مورد اندازه‌گیری با هم اختلاف زیادی داشته باشند.

گزینه 3 جمع‌آوری داده‌ها برای دوره‌های کوتاه‌مدت لازم باشد.

گزینه 4 جامعه‌ی مورد مطالعه کوچک باشد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 4

کدامیک از وقایع جمعیت صرفاً بر ترکیب جمعیت اثر می‌گذارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان/پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸_قطب شمال)

گزینه 1 ولادت

گزینه 2 مرگ و میر

گزینه 3 ازدواج

گزینه 4 مهاجرت

نمایش پاسخ

سوال 5

در جمعیتی معادل ۹ هزار نفر تعداد افراد ۱۵ تا ۴۹ سال (واقع در سن فعالیت)، پنج هزار نفر است. کدام جمله‌ی زیر در مورد این جمعیت صحیح است؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 در مقابل هر ۱۰۰ نفر فعال ۸۰ نفر غیر فعال وجود دارد

گزینه 2 در این جمعیت ۸۰ نفر تولید و ۱۸۰ نفر مصرف می‌کنند

گزینه 3 نسبت وابستگی این جمعیت ۱/۲ و یک جمعیت جوان است

گزینه 4 نسبت وابستگی در این جمعیت ۴۰ درصد است

نمایش پاسخ

د

سوال 6

در یک کشور با جمعیت ۲۰ میلیونی، دو میلیون نفر بالا یا مساوی ۶۵ سال بوده و شش میلیون نفر ۱۴ سال یا کم‌تر هستند. نسبت وابستگی (سرباری) در این کشور به کدامیک از اعداد زیر نزدیک‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۰/۶۷

گزینه 2 ۰/۸۵

گزینه 3 ۰/۶۰

گزینه 4 ۰/۴۷

نمایش پاسخ

الف

سوال 7

اگر نسبت وابستگی در یک جامعه ۲ باشد کدام گزینه در خصوص تفسیر این نسبت صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 به ازای هر ۱۰ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) ۱۲ نفر فرد فعال در جامعه وجود دارد.

گزینه 2 به ازای هر ۱۰ نفر فرد فعال ۲۰ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) در جامعه وجود دارد.

گزینه 3 به ازای هر ۱ نفر فرد فعال ۱/۲ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) در جامعه وجود دارد.

گزینه 4 به ازای هر ۱ نفر فرد غیر فعال (از نظر سنی) ۲ نفر فرد فعال در جامعه وجود دارد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 8

براساس نتایج سرشماری، نسبت وابستگی در یک جمعیت ۰/۴ است کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 به ازای هر یک نفر از افراد فعال ۰/۴ نفر غیر واقع در سن فعالیت هستند.

گزینه 2 به ازای هر یک نفر از افراد شاغل ۰/۴ نفر غیر واقع در سن فعالیت هستند.

گزینه 3 به ازای هر یک نفر از افراد فعال ۰/۴ نفر بیکار در جستجوی کار هستند.

گزینه 4 به ازای هر یک نفر از افراد شاغل ۰/۴ نفر بیکار در جستجوی کار هستند.

نمایش پاسخ

الف

سوال 9

اگر نسبت وابستگی در یک منطقه‌ی جغرافیایی ۰/۷ باشد ترتیب میزان تولید کننده به مصرف کننده از راست به چپ چگونه خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 ۷ به ۱۰

گزینه 2 ۱۰ به ۷

گزینه 3 ۳ به ۷

گزینه 4 ۱۰ به ۱۷

نمایش پاسخ

د

سوال 10

اگر نسبت وابستگی در یک منطقه‌ی جغرافیایی ۰/۸ باشد به ترتیب از راست به چپ چند نفر تولید کننده و چند نفر مصرف کننده هستند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ۸ و ۱۰

گزینه 2 ۱۰ و ۸

گزینه 3 ۱۰ و ۱۸

نمایش پاسخ

ج

سوال 11

در کشوری با جمعیت ۱۰۰ میلیون نفر، ۳۰ میلیون نفر بیکار می‌باشند که ۲۰ میلیون نفر از آن‌ها جویای کار هستند. درصد جمعیت فعال در این کشور چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۷۰

گزینه 2 ۸۰

گزینه 3 ۹۵

گزینه 4 ۹۰

نمایش پاسخ

د

سوال 12

تراکم حسابی جمعیت به چه معنایی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 رابطه‌ی بین وسعت کمی منطقه و جمعیت آن یا به عبارتی نسبت تعداد جمعیت به واحد خاک

گزینه 2 رابطه‌ی میان وسعت زمین‌های زیر کشت یا قابل کشت یک منطقه یا جمعیت آن و به عبارت دیگر نسبت تعداد جمعیت در واحد زمین زراعی

گزینه 3 رابطه‌ی میان تعداد جمعیت یک منطقه یا منابع اقتصادی یا مجموع وسایلی که انسان‌ها برای ادامه‌ی زندگی از آن برخوردارند.

گزینه 4 همه‌ی موارد فوق

نمایش پاسخ

الف

سوال 13

در تراکم زیستی نسبت جمعیت را با چه مساحتی نشان می‌دهند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 کل مساحت برحسب هکتار

گزینه 2 کل مساحت منطقه

گزینه 3 مساحت برحسب مناطق قابل زیست حیوانی

گزینه 4 مساحت کل زمین‌های قابل کشت

نمایش پاسخ

د

سوال 14

رابطه‌ی بین وسعت کمی منطقه و جمعیت آن، کدامیک از انواع تراکم جمعیت را محاسبه می‌نماید؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 حسابی

گزینه 2 زیستی

گزینه 3 اقتصادی

گزینه 4 شهری

نمایش پاسخ

الف

سوال 15

اگر تعداد جمعیت ایران حدود ۸۰ میلیون نفر و مساحت آن در حدود یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع و مساحت قابل کشت آن حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع و تعداد مهاجرین ۳ میلیون نفر باشند، میزان تراکم حسابی جمعیت ایران به چه عددی نزدیک‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 ۵۰

گزینه 2 ۵۲

گزینه 3 ۴۰۰

گزینه 4 ۴۱۵

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های هرم جمعیت در کشورهای رو به توسعه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 جمعیت افراد مسن نسبت به سایر جوامع بیش‌تر است.

گزینه 2 تعداد موالید در سال بیش‌تر از مرگ است.

گزینه 3 هر پله‌ی هرم با پله‌ی قبلی خود از لحاظ فراوانی جمعیتی تفاوت چندانی ندارد.

گزینه 4 قاعده‌ی هرم باریک و نوک آن پهن است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 17

کدامیک از گزینه‌های زیر نشانه‌ی ویژگی هرم جمعیت در کشورهای در حال توسعه است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 هر پله‌ی هرم با پله‌ی قبلی خود تفاوت زیادی دارد.

گزینه 2 تعداد تولد بالا و نسبت مرگ و میر در کودکان بالاست.

گزینه 3 جمعیت افراد مسن به سایر جوامع بیش‌تر است.

گزینه 4 تعداد تولد و مرگ بالاست.

نمایش پاسخ

ب

سوال 18

حد لازم برای جایگزینی طبیعی جمعیت چند کودک به ازای هر زن است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ۱/۹

گزینه 2 ۲/۱

گزینه 3 ۲/۵

گزینه 4 ۲/۶

نمایش پاسخ

ب

سوال 19

اگر نسبت جنسی در یک جامعه $۵۲/۴۸ \times ۱۰۰$ نسبت دخترزایی چند درصد است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 ۵۲

گزینه 2 ۴۸

گزینه 3 ۵۰

گزینه 4 با این اطلاعات قابل محاسبه نیست.

نمایش پاسخ

ب

سوال 20

در شهر X در ماه گذشته ۲۰ مورد مرگ به علت تصادفات جاده‌ای داشته‌ایم در این گزارش از چه ابزاری استفاده شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 شمارش (سرشماری) Census

گزینه 2 میزان Rate

گزینه 3 نسبت Ratio

گزینه 4 سهم Proportion

نمایش پاسخ

الف

سوال 21

در کشوری با جمعیت زنان ۵ میلیون، جمعیت مردان ۴ میلیون و هشتصد هزار نفر و جمعیت شهری ۷ میلیون نفر و وسعت کل ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع میزان تراکم حسابی جمعیت چقدر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 ۲۴

گزینه 2 ۴۹

گزینه 3 ۳۵

گزینه 4 ۸۴

نمایش پاسخ

ب

سوال 22

در جامعه‌ای با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر، تعداد افراد زیر ۱۵ سال ۳۰ هزار و افراد بالای ۶۵ سال ۱۰ هزار نفر است. در مورد نسبت وابستگی کدام جمله صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 به ازای هر ۱۰۰ نفر تولیدکننده ۴۰ نفر مصرف کننده وجود دارد.

گزینه 2 به ازای هر ۱۰۰ نفر تولیدکننده ۱۴۰ نفر مصرف کننده وجود دارد.

گزینه 3 به ازای هر ۱۰۰ نفر تولیدکننده ۶۶ نفر مصرف کننده وجود دارد.

گزینه 4 به ازای هر ۱۰۰ نفر تولیدکننده ۱۶۶ نفر مصرف کننده وجود دارد.

نمایش پاسخ

د

سوال 23

در محاسبه‌ی «نسبت وابستگی» در مخرج کسر چه جمعیتی لحاظ می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 جمعیت زیر ۱۵سال

گزینه 2 جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال

گزینه 3 جمعیت بالای ۶۴ سال

گزینه 4 جمعیت زیر ۱۵ و بالای ۶۴ سال

نمایش پاسخ

ب

سوال 24

کدامیک از میزان‌ها از اجزای رشد جمعیت به شمار نمی‌آید؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 ازدواج و طلاق

گزینه 2 باروری

گزینه 3 مرگ و میر

گزینه 4 مهاجرت

نمایش پاسخ

الف

سوال 25

«هرم جمعیتی رو به نقصان» در جوامعی دیده می‌شود که در آن‌ها: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 تعداد مرگ و میر و زاد و ولد هر دو بسیار کم است

گزینه 2 تعداد مرگ و میر در سال کم‌تر از زاد و ولد است

گزینه 3 تعداد زاد و ولد در سال کم‌تر از مرگ و میر است

گزینه 4 تعداد جمعیت افراد مسن در جامعه کم‌تر از جوانان است

نمایش پاسخ

ج

سوال 26

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص نسبت جنسی (Sex Ratio) صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 این نسبت تقریباً در بیش‌تر کشورهای جهان در هنگام تولد حدود ۱۰۵ مولود دختر در مقابل ۱۰۰ مولود پسر است.

گزینه 2 جمعیت‌هایی که مردان سهم بیش‌تری از مهاجرین را دارند از نسبت جنسی بالاتری برخوردارند.

گزینه 3 اگر مهاجرت قابل ملاحظه‌ای صورت نگیرد، نسبت جنسی با افزایش سن افزایش می‌یابد.

گزینه 4 این نسبت در یک جمعیت به مرگ و میر نسبی مردان و زنان بستگی ندارد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 27

در جامعه‌ای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر، تعداد افراد زیر ۱۵ سال، ۷۰ هزار نفر و افراد بالای ۶۵ سال، ۳۰ هزار نفر است. به ازای هر ۱۰۰ نفر تولید کننده چند نفر مصرف کننده وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 ۱۲۵

گزینه 2 ۲۵

گزینه 3 ۶۶

گزینه 4 ۱۶۶

نمایش پاسخ

الف

سوال 28

در محاسبه «نسبت وابستگی» در صورت کسر چه جمعیتی لحاظ می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 جمعیت زیر ۱۵ سال

گزینه 2 جمعیت ۱۵-۶۴ سال

گزینه 3 جمعیت بالای ۶۴ سال

گزینه 4 جمعیت زیر ۱۵ و بالای ۶۴ سال

نمایش پاسخ

د

سوال 29

اگر نسبت وابستگی در یک منطقه‌ی جغرافیایی ۸۰ درصد باشد، مفهوم آن چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال/پزشکی شمال ۹۷_قطب شمال)

گزینه 1 ۱۰۰ نفر تولیدکننده و ۱۸۰ نفر مصرف کننده هستند.

گزینه 2 ۸۰ نفر تولیدکننده و ۱۰۰ نفر مصرف کننده هستند.

گزینه 3 ۱۰۰ نفر تولیدکننده و ۸۰ نفر مصرف کننده هستند.

گزینه 4 ۲۰۰ نفر تولیدکننده و ۸۰ نفر مصرف کننده هستند.

نمایش پاسخ

الف

سوال 30

در همه‌ی موارد زیر، استفاده از سرشماری جمعیت توصیه می‌شود، بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- مشترک کشوری)

گزینه 1 جمعیت مورد مطالعه، کوچک باشد.

گزینه 2 داده‌هایی با دقت و اطمینان بسیار زیاد، مورد نیاز باشد

گزینه 3 داده‌هایی مربوط به تک‌تک افراد جامعه، مورد نیاز باشد.

گزینه 4 افراد جامعه از حیث صفت مورد بررسی، اختلاف زیادی با هم داشته باشند.

نمایش پاسخ

ب

سوال 31

اگر جمعیت زیر ۱۵ سال و بالای ۶۴ سال کشوری به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد از جمعیت کل آن کشور را تشکیل دهند. نسبت وابستگی (سرباری) در آن کشور کدامیک از اعداد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 ۲

گزینه 2 ۱/۵

گزینه 3 ۵/۰

گزینه 4 ۱

نمایش پاسخ

د

سوال 32

کدامیک از مهم‌ترین ملاک ارزیابی نسبت جمعیت با محیط جغرافیایی مسکون محسوب می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 میزان تراکم اقتصادی

گزینه 2 میزان تراکم زیستی

گزینه 3 میزان تراکم حسابی

گزینه 4 میزان تراکم شهری

نمایش پاسخ

الف

سوال 33

کدام شاخص جمعیتی رابطه‌ی بین وسعت منطقه و تعداد جمعیت را معین می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 تراکم دموگرافیک

گزینه 2 توزیع جغرافیایی

گزینه 3 تراکم مهاجرتی

گزینه 4 تراکم جمعیت

نمایش پاسخ

د

سوال 34

کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 معیار وردهایم برای نشان دادن وضعیت نسبت سرباری در جامعه است

گزینه 2 طبق معیار وردهایم جمعیت زیر ۱۵ سال کشورهای در حال توسعه‌ی بالای ۴۰% است.

گزینه 3 هرم‌های سنی- جنسی کشورهای کاملاً عقب نگذاشته شده، از نوع رو به نقصان است

گزینه 4 هرم‌های سنی- جنسی ساکن، زاد و ولد نسبتاً زیاد و نسبت مرگ در کودکان هم بالاست.

نمایش پاسخ

سوال 35

کدامیک از موارد ذیل از وقایع دموگرافیک یا حرکات جمعیت نیست؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 مرگ و میر

گزینه 2 ازدواج و طلاق

گزینه 3 بروز اپیدمی

گزینه 4 مهاجرت

نمایش پاسخ

سوال 36

در مورد هرم‌های سنی جمعیت کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 سمت راست هرم متعلق به زنان است.

گزینه 2 تقسیمات سن در محور افقی لحاظ می‌شود.

گزینه 3 طول محور عمودی معادل یک سوم طول محور افقی است.

گزینه 4 دقت نمایش هرم به تقسیمات فراوانی افراد در محور افقی وابسته است.

نمایش پاسخ

سوال 37

کدام گزینه در مورد هرم سنی صحیح است؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 هرم سنی نموداری است که از دو محور عمودی (برای تعداد نفرات) و محور افقی (برای سن) تشکیل شده است.

گزینه 2 برای نشان دادن ساختمان سنی جمعیت در یک لحظه‌ی معین از نموداری به نام هرم سنی استفاده می‌شود.

گزینه 3 دقت نمایش هرم سنی به تقسیمات محور افقی بستگی دارد.

گزینه 4 در هرم سنی فراوانی افراد برحسب جنس به صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود.

نمایش پاسخ

سوال 38

هرم سنی کشورهای توسعه نیافته، غالباً به چه شکل است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 ناقوسی شکل

گزینه 2 یکنواخت

گزینه 3 مخروطی

گزینه 4 مثلثی شکل

نمایش پاسخ

سوال 39

کدامیک از موارد زیر، در مورد جنسیت به عنوان یک عامل مؤثر بر سلامتی صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 گزارش بیماری و مرگ در زنان بیش از مردان است

گزینه 2 گزارش بیماری و مرگ در مردان بیش از مردان است

گزینه 3 گزارش بیماری در مردان کم‌تر از زنان است ولی مرگ در مردان بیش‌تر است

گزینه 4 گزارش بیماری در زنان کم‌تر از زنان است ولی مرگ در زنان بیش‌تر است

نمایش پاسخ

سوال 40

کدام گروه سنی در محاسبه‌ی نسبت وابستگی در یک جمعیت در مخرج کسر قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 زیر ۱۵ سال

گزینه 2 ۶۴-۱۵ ساله

گزینه 3 ۷۰-۱۸ساله

گزینه 4 ۶۴ ساله و بالاتر

نمایش پاسخ

سوال 41

شکل هرم سنی یک کشور به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 تعداد موارد ازدواج در سال

گزینه 2 تعداد موالید در هر یک از نسل‌ها

گزینه 3 تقلیل افراد در اثر مرگ و میر

گزینه 4 مهاجرت به داخل یا خارج از کشور

نمایش پاسخ

الف

سوال 42

در مورد ترکیب جنسی جمعیت‌ها کدام عبارت زیر صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 جنگ‌های بزرگ معمولاً نسبت جنسی جمعیت را طی دهه‌ی بعد پایین می‌آورد

گزینه 2 در کشورهای دارای جمعیت پیر، نسبت جنسی جمعیت همیشه بیش از یک است

گزینه 3 تسهیل قوانین مهاجرپذیری در کشورها، نسبت جنسی جمعیت را کاهش می‌دهد

گزینه 4 نسبت پسرزایی حاصل تقسیم تعداد تولد پسران و دختران در جمیعت طی یک سال است

نمایش پاسخ

الف

سوال 43

بیش‌ترین نوع خانواده که در همه‌ی جوامع دیده می‌شود کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 خانوادہ‌ی گسترده

گزینه 2 خانوادہ‌ی چندنسلی

گزینه 3 خانوادہ‌ی هسته‌ای

گزینه 4 خانوادہ‌ی تک والدی

نمایش پاسخ

ج. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 44

اولین علت مرگ نوجوانان کدام مورد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 نئوپلاسم

گزینه 2 خودکشی

گزینه 3 تصادفات

گزینه 4 بیماری‌های قلبی عروقی

نمایش پاسخ

ج

سوال 45

کمیسیون جمعیتی سازمان ملل متحد چه روش سرشماری را توصیه می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 دوژور (Dejure)

گزینه 2 دو فاکتور (Defacto)

گزینه 3 سرشماری نفوس و مسکن

گزینه 4 سرشماری سالیانه

نمایش پاسخ

ب. کمیسیون جمعیتی سازمان ملل متحد روش دو فاکتو را برای سرشماری توصیه می‌کند.

سوال 46

در یک شهر دو میلیون نفری، توزیع سنی جمعیت به صورت زیر است، نسبت وابستگی چند درصد است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

جمعیت زیر ۱۴ سال: ۲۰ درصد

جمعیت ۳۰-۱۴ سال: ۲۰ درصد

جمعیت ۴۹-۳۱ سال: ۲۵ درصد

جمعیت بالای ۶۵ سال: ۲۰ درصد

گزینه 1 ۴۰

گزینه 2 ۵۰

گزینه 3 ۶۶

گزینه 4 ۸۰

نمایش پاسخ

ج. در صورت کسر جمعیت مصرف کننده (۲۰+۲۰) و در مخرج جمعیت تولید کننده (۴۰-۱۰۰) قرار دارد. که در این جا می شود ۴۰ تقسیم بر ۶۰ یا ۶۶ درصد.

سوال 47

هرم سنی جنسی جمعیت های جوان چگونه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۷_قطب زنجان)

گزینه 1 استوانه ای

گزینه 2 چند ضلعی

گزینه 3 مکعبی

گزینه 4 مثلثی

نمایش پاسخ

د. هرم سنی جنسی جمعیت های جوان مثلثی با قاعده ی پهن است که هر پله با پله ی قبلی خود تفاوت چندانی ندارد.

سوال 48

اگر جمعیت بالای ۶۵ سال یک جامعه ۱۰% و جمعیت زیر ۱۵ سال آن ۴۰% آن جامعه باشد نسبت سرباری (وابستگی) کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 ۰.۱

گزینه 2 ۰/۴

گزینه 3 ۱

گزینه 4 ۴

نمایش پاسخ

ج

سوال 49

کدام گزینه علل مرگ نوجوانان را به ترتیب اهمیت نشان می دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 ناهنجاری های مادرزادی، نئوپلاسم، خودکشی و قتل

گزینه 2 خودکشی و قتل، ناهنجاری های مادرزادی، جراحات و تصادفات

گزینه 3 نئوپلاسم، خودکشی و قتل، ناهنجاری های مادرزادی

گزینه 4 جراحات و تصادفات، خودکشی و قتل، نئوپلاسم

نمایش پاسخ

د. علل مرگ نوجوانان بیش تر به دلایل جراحات و تصادفات، خودکشی و قتل، نئوپلاسم است.

سردارن !

سوال 50

همه ی عوامل زیر روی شکل هرم نسبی یک کشور اثر دارند، بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 تعداد موالید در هر یک از نسل ها

گزینه 2 افزایش تعداد ازدواج و کاهش تعداد طلاق

گزینه 3 تقلیل تعداد افراد در اثر مرگ و میر

گزینه 4 مهاجرت به کشور یا مهاجرت از کشور

نمایش پاسخ

ب. در هرم سنی موالید و مرگ و مهاجرت اثر دارد و ازدواج در آن بی تأثیر است.

سوال 51

هرم سنی در جمعیت های جوان به چه شکلی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۷_قطب اهواز)

گزینه 1 زنگوله ای

گزینه 2 مثلثی

گزینه 3 مربعی

گزینه 4 مستطیلی

نمایش پاسخ

ب / هرم سنی جنسی جمعیت های جوان مثلثی با قاعده ی پهن است که هر پله با پله ی قبلی خود تفاوت چندانی ندارد.

سوال 52

در علم جمعیت شناسی مهم ترین ملاک ارزیابی نسبت جمعیت با محیط جغرافیایی مسکون کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 تراکم اقتصادی

گزینه 2 تراکم شهری

گزینه 3 تراکم زیستی

گزینه 4 تراکم حسابی

نمایش پاسخ

الف / تراکم حسابی به معنای رابطه‌ی بین وسعت کمی منطقه و جمعیت آن است و تراکم اقتصادی ملاک ارزیابی نسبت جمعیت با محیط جغرافیایی مسکون است.

نیز به کت در

سوال 53

همه‌ی موارد زیر باعث تغییر حجم جمعیت می‌شوند، بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 مهاجرت

گزینه 2 ازدواج

گزینه 3 ولادت

گزینه 4 مرگ

نمایش پاسخ

ب / عواملی که باعث تغییر حجم جمعیت می‌شوند عبارت‌اند از: مهاجرت- ولادت و مرگ

سوال 54

اگر نسبت وابستگی Dependent Rate در یک کشور ۶/۰ باشد، انتظار می‌رود کشور مذکور دارای چه سطحی از توسعه یافتگی و چه ویژگی از نظر ساختار جمعیتی باشد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 در حال توسعه با جمعیتی سالخورده

گزینه 2 در حال توسعه با جمعیتی جوان

گزینه 3 توسعه یافته با جمعیتی جوان

گزینه 4 توسعه یافته با جمعیتی سالخورده

نمایش پاسخ

د / در صورت کسر وابستگی جمعیت مصرف کننده و در مخرج جمعیت تولید کننده قرار دارد. کشوری که نسبت وابستگی آن ۶/۰ باشد توسعه یافته با جمعیتی سالخورده است.

سوال 55

شکل هرمی سنی جمعیت به همه‌ی موارد زیر بستگی دارد، بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 تقلیل تعداد افراد در اثر مرگ و میر

گزینه 2 نحوه‌ی توزیع جغرافیایی جمعیت

گزینه 3 مهاجرت به کشور یا از کشور

گزینه 4 تعداد موالید در هر یک از نسل‌ها

نمایش پاسخ

ب / شکل هرم سنی ربطی به نحوه‌ی توزیع جغرافیایی جمعیت و مهاجرت ندارد. برای مثال هرم سنی جنسی جمعیت‌های جوان مثلی با قاعده‌ی پهن است که هر پله با پله‌ی قبلی خود تفاوت چندانی ندارد.

سوال 56

با توجه به الگوی آماری و تقسیم جمعیت به دو گروه طبیعی و غیر طبیعی، همواره با چه انحراف معیاری از میانگین، افراد جامعه، سالم و طبیعی محسوب می‌شوند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 ۱

گزینه 2 ۲

گزینه 3 ۳

گزینه 4 ۴

نمایش پاسخ

ب / همواره با ۲ انحراف معیاری از میانگین، افراد جامعه، سالم و طبیعی محسوب می‌شوند.

سوال 57

در سرشماری جمعیت یک کشور بر مبنای روش دوژور (dejure) شمارش جمعیت، کدام مورد صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 شمارش کلیه‌ی جمعیت حاضر در یک منطقه یا کشور، صرف نظر از تابعیت آن‌ها، روش مورد توصیه‌ی سازمان ملل

گزینه 2 شمارش جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه صرف نظر از محل سکونت، کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه 3 شمارش کلیه‌ی جمعیت حاضر در یک منطقه یا کشور، صرف نظر از تابعیت آن‌ها، بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه 4 شمارش جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه صرف نظر از محل سکونت، روش مورد توصیه‌ی سازمان ملل

نمایش پاسخ

ب / کمیسیون جمعیتی سازمان ملل متحد روش دو فاکتو را برای سرشماری توصیه می‌کند اما در روش دوژور شمارش جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه صرف نظر از محل سکونت، کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوال 58

جمعیتی که هرم آن در قاعده،..... و در رأس،..... باشد معمولاً میزان باروری بالایی دارند. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 باریک، پهن

گزینه 2 پهن، باریک

گزینه 3 پهن، پهن

گزینه 4 باریک، باریک

نمایش پاسخ

ب / هرم سنی جنسی جمعیت‌های جوان مثلی با قاعده‌ی پهن است که هر پله با پله‌ی قبلی خود تفاوت چندانی ندارد و میزان باروری بالایی دارند.

سوال 59

شکل هرمی سنی یک کشور به کدام مورد زیر بستگی ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 تعداد موالید در هر یک از نسل‌ها

گزینه 2 تعداد موارد ازدواج ثبت شده

گزینه 3 کاهش تعداد افراد در اثر مرگ و میر

گزینه 4 مهاجرت به کشور یا مهاجرت از کشور

نمایش پاسخ

ب

سوال 60

بر اساس استراتژی کشوری همکاری بین سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران کدام‌یک از موارد زیر از مهم‌ترین جهات راهبردی همکاری این سازمان با کشور است؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 ریشه‌کنی فلج اطفال

گزینه 2 مقابله با پیامدهای گذر دموگرافیک و گذر اپیدمیولوژیک

گزینه 3 اصلاحات در نظام اطلاع‌رسانی سلامت

گزینه 4 کمک به انجام پژوهش‌های کاربردی

نمایش پاسخ

ب / بر اساس استراتژی کشوری همکاری بین سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران مقابله با پیامدهای گذر دموگرافیک و گذر اپیدمیولوژیک کدام‌یک از موارد زیر از مهم‌ترین جهات راهبردی همکاری این سازمان با کشور است.

بهداشت برای همه و مراقبت‌های بهداشتی اولیه

تعدا سوال : ۱۱۴

درجه سختی:متوسط

نکات:۱-اصول مراقبتهای بهداشت اولیه بسیار پرتکرار است

۲-آموزش بهداشت جز اصول بهداشت اولیه نیست

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

هدف سازمان جهانی بهداشت برای استراتژی سلامتی برای همه‌ی (HFA)، دستیابی همه‌ی مردم جهان به چه سطحی از سلامتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 داشتن زندگی مولد و مؤثر

گزینه 2 بیمار نبودن

گزینه 3 نداشتن ناتوانی

گزینه 4 رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی

نمایش پاسخ

الف و د

سوال 2

کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های جهانی ارزیابی خدمات بهداشتی برای همه‌ی (HFA) است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 امید به زندگی بالای ۷۰ سال

گزینه 2 مرگ و میر کودکان زیر یک سال کم‌تر از ۵۰ در هزار

گزینه 3 میزان باسواد‌ی در دو جنس بالای ۵۰ درصد

گزینه 4 صرف ۲ درصد سهم تولید ناخالص ملی

نمایش پاسخ

ب

سوال 3

تمام شاخص‌های جهانی زیر به منظور پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در کشورها به درستی تعریف شده‌اند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 توزیع برابر منابع و امکانات بهداشتی برای مناطق شهری و روستایی

گزینه 2 کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال به کم‌تر از ۵۰ در هزار

گزینه 3 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۶۰ سال

گزینه 4 رسانیدن میزان باسوادی برای زنان و مردان به بیش از ۷۰ درصد کل افراد جامعه

نمایش پاسخ

الف

سوال 4

کدام گزینه در مورد شاخص‌های جهانی پایش و ارزشیابی سلامت در کشورها، صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 اختصاص حداقل ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی برای بهداشت

گزینه 2 رساندن باسوادی برای بزرگسالان به بیش از ۷۰درصد

گزینه 3 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۸۰ سال

گزینه 4 برخورداری حداقل ۵۰ درصد کودکان از وزن مناسب برای سن

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

برای رسیدن به شاخص‌های جهانی، حداقل چند درصد از تولید ناخالص ملی باید برای بهداشت جامعه مصرف شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز/پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ _قطب شمال)

گزینه 1 ۵%

گزینه 2 ۱۵%

گزینه 3 ۲۵%

گزینه 4 ۲۰%

نمایش پاسخ

الف

سوال 6

کدامیک از موارد زیر درباره‌ی شاخص‌های جهانی 2000HFA صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 حداقل ۹۰ درصد کودکان وزن مناسب برای سن داشته باشند.

گزینه 2 حداقل ۲۰ قلم دارویی اساسی در محل مرکز بهداشتی درمانی موجود باشد.

گزینه 3 حداقل ۳ درصد تولید ناخالص ملی صرف بهداشت شود.

گزینه 4 امید به زندگی به بیش از ۶۰ سال برسد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 7

کدامیک جزء شاخص‌های جهانی به منظور پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در کشورها است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 حداقل ۳ درصد تولید ناخالص ملی برای بهداشت صرف شود.

گزینه 2 حداقل ۹۵ درصد نوزادان وزن بالای ۲۰۰۰ گرم در هنگام تولد داشته باشند.

گزینه 3 رسانیدن امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۷۰ سال

گزینه 4 رسانیدن میزان باسوادی به بیش از ۷۰ درصد کل افراد جامعه در زنان و مردان

نمایش پاسخ

د

سوال 8

ارتباط HFA (Health for all) PHC (Primary heath care) چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 PHC روش دستیابی به HFA است.

گزینه 2 HFA با PHC قابل دستیابی نیست.

گزینه 3 HFA روش دستیابی به PHC است.

گزینه 4 PHC با HFA قابل دستیابی نیست.

نمایش پاسخ

الف

سوال 9

شاخص‌های ارزش‌یابی و مقایسه‌ی کشورها از نظر میزان دستیابی به 2000HFA کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 درصد منطقی از بودجه ملی سلامت به مراقبت‌های بهداشتی سطح اول در هر منطقه (Local health care) اختصاص یافته باشد.

گزینه 2 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۷۰ سال

گزینه 3 وزن ۷۰ درصد نوزادان در بدو تولد بیش‌تر از ۲۵۰۰ گرم باشد.

گزینه 4 رسانیدن میزان باسوادی برای زنان و مردان به بیش از ۵۰ درصد کل افراد جامع

نمایش پاسخ

الف

سوال 10

دسترسی به آب سالم در منزل یا در فاصله‌ای که با ۱۵ دقیقه پیاده‌روی به آن رسیده در کدام محیط از HFA (بهداشت برای همه) جای دارد؟ (پزشکی شهرپور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 اهداف

گزینه 2 شاخص‌ها

گزینه 3 رویکرد مراقبت

گزینه 4 اصول استراتژیک

نمایش پاسخ

ب

سوال 11

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه نادرست است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 مراقبت‌های بهداشتی اولیه متکی بر مشارکت مردم است

گزینه 2 فلسفه‌ی اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه توزیع عادلانه منابع بهداشتی است.

گزینه 3 مراقبت‌های بهداشتی اولیه توسط تیم‌های تخصصی پزشکی در بیمارستان‌ها ارائه می‌گردد.

گزینه 4 ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه هزینه‌ی اثربخش است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

برای اطمینان از دسترسی برابر، توزیع و پوشش مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی بر چه اساسی باید باشد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 براساس نیاز و تقاضای منطقه

گزینه 2 براساس شرایط آب و هوایی هر منطقه

گزینه 3 براساس میزان سرمایه در گردش آن منطقه

گزینه 4 براساس موقعیت استراتژیک منطقه

نمایش پاسخ

الف

سوال 13

از گزینه‌های زیر کدامیک به عنوان اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهرپور ۹۴- قطب زنجان/پزشکی شهرپور ۹۳- قطب دانشگاه آزاد/ پزشکی اسفند۹۴_ قطب دانشگاه آزاد / پزشکی شهرپور ۹۳_ قطب شیراز/پزشکی اسفند ۹۷_قطب همدان)

گزینه 1 مشارکت مردمی

گزینه 2 آموزش بهداشت

گزینه 3 عدالت

گزینه 4 روش‌های (فناوری) مناسب

نمایش پاسخ

ب

سوال 14

کدامیک از گزینه‌های زیر جزء اصول مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان/پزشکی اسفند ۹۳_قطب دانشگاه آزاد / پزشکی شهرپور ۹۷ _قطب همدان/ سیب-پزشکی ریفرم شهرپور ۹۸_ قطب دانشگاه آزاد / پزشکی اسفند ۹۷_ قطب زنجان)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 بهداشت محیط

گزینه 3 مشارکت عمومی

گزینه 4 دسترسی به داروهای اساسی

نمایش پاسخ

ج

سوال 15

پذیرش بومی بهورز منطبق بر کدامیک از اصول PHC است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 مشارکت همگانی

گزینه 2 هماهنگی بین بخشی

گزینه 3 روش یا تکنولوژی مناسب

گزینه 4 عدالت

نمایش پاسخ

ج

سوال 16

کدامیک از گزینه‌های زیر از اصول مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 بهبود تغذیه

گزینه 2 مشارکت مردم و اتکا به خود

گزینه 3 آموزش بهداشت

گزینه 4 واکسیناسیون علیه بیماری‌های عفونی قابل انتقال در دوران کودکی

نمایش پاسخ

ب

سوال 17

مردم با نیازهای یکسان باید دسترسی برابر به قیمت‌های بهداشتی داشته باشند. نشان دهنده‌ی کدام اصل از مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز / دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 هماهنگی بین بخش

گزینه 2 مشارکت مردمی

گزینه 3 روش‌های مناسب

گزینه 4 عدالت

نمایش پاسخ

د. صورت سؤال تعریف عدالت‌ه اصلا

سوال 18

کدام مورد از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 تدارک داروهای اساسی

گزینه 2 استفاده از تکنولوژی مناسب

گزینه 3 آموزش بهداشت

گزینه 4 واکسیناسیون

نمایش پاسخ

ب

سوال 19

کدامیک جزء اصول خدمات بهداشتی اولیه است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸_قطب زنجان)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 عدالت اجتماعی

گزینه 3 بهسازی محیط

گزینه 4 سلامت مادر و کودک

نمایش پاسخ

ب

سوال 20

کدامیک از موارد زیر از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 حمایت بین‌المللی

گزینه 2 مشارکت مردمی

گزینه 3 فناوری مناسب

گزینه 4 هماهنگی بخش‌های توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی

نمایش پاسخ

الف

سوال 21

تأمین آب سالم به منظور کنترل بیماری اسهالی در جامعه به عنوان کدام مداخله‌ی بهداشتی تلقی می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد/پزشکی شهریور ۹۷-قطب مشهد/ پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸_ قطب مشهد)

گزینه 1 مداخله‌ی باز توانی

گزینه 2 مداخله‌ی پیشگیری

گزینه 3 مداخله‌ی درمانی

گزینه 4 مداخله‌ی ارتقایی

نمایش پاسخ

د

سوال 22

از جمله راه کارهای مورد استفاده در درمان بیماری سل، بهبود وضعیت تغذیه‌ای است. این مداخله مطابق با کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 مداخله‌ی درمانی

گزینه 2 مداخله‌ی بازتوانی

گزینه 3 مداخله‌ی پیشگیری

گزینه 4 مداخله‌ی ارتقایی

نمایش پاسخ

الف

سوال 23

در برخورد با بیماری سل کدامیک از فعالیت‌های زیر به عنوان مداخلات ارتقای سلامت قلمداد نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز/پزشکی اسفند ۹۴_قطب شمال/ پزشکی کلاسیک شهریور۹۸ _ قطب مشهد)

گزینه 1 واکسیناسیون

گزینه 2 تغذیه‌ی مناسب

گزینه 3 آموزش سلامت

گزینه 4 تهویه‌ی مناسب منزل

نمایش پاسخ

الف

سوال 24

کدامیک از اصول PHC با پذیرش «سلامت به عنوان محور توسعه‌ی پایدار» در جامعه ارتباط بیش‌تری دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 تکنولوژی مناسب

گزینه 2 مشارکت مردم

گزینه 3 هماهنگی بین بخشی

گزینه 4 جامعیت خدمات

نمایش پاسخ

ج

سوال 25

کدامیک از اصول PHC متضمن ارائه‌ی خدمات در انجام پیشگیری، درمان، بازتوانی و ارتقایی است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 جامعیت

گزینه 2 عدالت

گزینه 3 مشارکت مردم

گزینه 4 استفاده از روش‌های مناسب

نمایش پاسخ

الف

سوال 26

این اصل که افراد با نیازهای یکسان باید دسترسی برابر به مراقبت‌های بهداشتی داشته باشند مبین کدامیک از اصول PHC است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز/ پزشکی شهریور ۹۶_قطب مشهد/ پزشکی اسفند۹۶_ قطب شمال اصفهان و کرمان/ پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب مشهد)

گزینه 1 جامعیت خدمات

گزینه 2 مشارکت مردم در توسعه‌ی خدمات

گزینه 3 عدالت در سلامت

گزینه 4 استفاده از روش‌های مناسب در ارائه‌ی خدمات

نمایش پاسخ

سوال 27

بهداشت به وسیله‌ی مردم به کدام اصل از مراقبت‌های بهداشتی اولیه اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 مشارکت مردمی

گزینه 2 روش‌های مناسب

گزینه 3 جامعیت خدمات

گزینه 4 هماهنگی بین بخشی

نمایش پاسخ

الف

سوال 28

همه‌ی موارد زیر رویکرد کاهش آسیب (Harm reduction) هستند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 درمان نگهدارنده با متادون

گزینه 2 توزیع سرنگ و سوزن

گزینه 3 سم‌زدایی

گزینه 4 توزیع کاندوم

نمایش پاسخ

الف

سوال 29

مرحله‌ی اول برنامه‌ریزی و مداخله در برنامه‌های بهداشتی کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 تعیین اولویت‌ها

گزینه 2 ارزیابی وضعیت موجود

گزینه 3 پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

گزینه 4 ایجاد زمینه برای انجام تحقیق

نمایش پاسخ

ب

سوال 30

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مراقبت‌های بهداشتی اولیه‌ی پوشش خدمات در سه سطح پیشگیری است. این ویژگی مطابق با کدامیک از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 جامعیت خدمات

گزینه 2 هماهنگی بین بخشی

گزینه 3 روش مناسب

گزینه 4 عدالت و برابری

نمایش پاسخ

الف

سوال 31

اگر یک بسته مراقبت بهداشتی صرفاً خدمات را در سطح خانهِ بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی شهر و روستایی پیش‌بینی کرده باشد ولی خدمات تخصصی مورد نیاز را در سطح شهرستان فراهم نکرده باشد فاقد کدام ویژگی مراقبت‌های بهداشتی است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 کفایت خدمات

گزینه 2 جامعیت خدمات

گزینه 3 دسترسی به خدمات

گزینه 4 مناسبت خدمات

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

مبارزه با پشه‌ی آنوفل جهت کنترل بیماری مالاریا در یک منطقه چه نوع مداخله‌ای محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 ارتقایی

گزینه 2 پیشگیری

گزینه 3 درمانی

گزینه 4 بازتوانی

نمایش پاسخ

سوال 33

توصیه به استفاده از «آب سالم» جزء کدامیک از مداخلات طبقه‌بندی می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 ارتقایی

گزینه 2 پیشگیری

گزینه 3 درمانی

گزینه 4 بازتوانی

نمایش پاسخ

سوال 34

فلسفه‌ی اصلی مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی، کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 مشارکت مردم و اتکا به خود

گزینه 2 هماهنگی بخش‌های توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی

گزینه 3 توزیع عادلانه‌ی منابع بهداشتی

گزینه 4 روش‌ها و فناوری‌های مناسب

نمایش پاسخ

سوال 35

کدامیک از موارد زیر جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 عدالت اجتماعی

گزینه 2 همکاری بین بخشی

گزینه 3 مشارکت مردمی

گزینه 4 تکنولوژی پیشرفته

نمایش پاسخ

سوال 36

کدامیک جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 همکاری بین بخشی

گزینه 2 آموزش بهداشت

گزینه 3 واکسیناسیون

گزینه 4 مراقبت از بیماری‌های غیر واگیر

نمایش پاسخ

سوال 37

کدامیک از گزینه‌های زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی

گزینه 2 مشارکت مردم و اتکا به خود

گزینه 3 هماهنگی بخش‌های توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی

گزینه 4 جامعیت خدمات

نمایش پاسخ

سوال 38

«توزیع مناسب و پوشش مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی بیش‌تر در مناطق با نیاز بالاتر» جزء کدامیک از اصول تأمین مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 جامعیت خدمات

گزینه 2 هماهنگی توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی

گزینه 3 عدالت (برابری)

گزینه 4 روش‌های مناسب

نمایش پاسخ

تمام موارد زیر از اصول مراقبت‌های بهداشتی به شمار می‌رود بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

- گزینه 1 هماهنگی بخش‌های توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی
- گزینه 2 بهداشت مادر و کودک و آموزش بهداشت
- گزینه 3 مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت
- گزینه 4 جامعیت خدمات ارتقاء، پیشگیری و بازتوانی

نمایش پاسخ

ب

کدامیک از موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

- گزینه 1 بهبود تغذیه
- گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی
- گزینه 3 مشارکت مردم
- گزینه 4 کنترل بیماری‌های عفونی محلی

نمایش پاسخ

ج

کدامیک از موارد زیر جزء هشت رکن اصلی ذکر شده در مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی (PHC) در کنفرانس بین‌المللی آلماتا نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

- گزینه 1 دسترسی به داروهای اساسی
- گزینه 2 دسترسی به آب آشامیدنی سالم
- گزینه 3 مراقبت از سلامت مادران
- گزینه 4 بهداشت دهان و دندان

نمایش پاسخ

د

کدامیک از موارد زیر از اجزای هشت‌گانه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

- گزینه 1 درمان بیماری‌های روان
- گزینه 2 آموزش بهداشت
- گزینه 3 بهداشت مادر و کودک
- گزینه 4 دسترسی به داروهای اساسی

نمایش پاسخ

الف

کدامیک از گزینه‌های زیر از اجزاء PHC نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

- گزینه 1 آموزش بهداشت
- گزینه 2 جامعیت خدمات
- گزینه 3 بهداشت دهان و دندان
- گزینه 4 کنترل بیماری‌های عفونی

نمایش پاسخ

ب

کدام مورد زیر از اجزای PHC است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

- گزینه 1 استفاده از تکنولوژی مناسب
- گزینه 2 توزیع عادلانه‌ی امکانات
- گزینه 3 همکاری‌های درون بخشی و برون بخشی
- گزینه 4 مبارزه با بیماری‌های شایع و بومی منطقه

نمایش پاسخ

د

کدامیک از موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان/پزشکی شهریور ۹۴ _ قطب کرمان)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 مشارکت جامعه

گزینه 3 هماهنگی بین‌بخشی

گزینه 4 فناوری مناسب

نمایش پاسخ

الف

سوال 46

کدامیک از اجزای زیر در ایران به طور اولیه در ۸ جزء اصلی PHC وجود داشت؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 مراقبت‌های بهداشت روان

گزینه 2 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان

گزینه 3 مراقبت‌های بهداشت سالمندان

گزینه 4 مراقبت‌های بهبود وضع تغذیه

نمایش پاسخ

د

سوال 47

اجزای مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی (PHC) عبارتند از: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 مشارکت مردم- کنترل بیماری‌ها

گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی- درمان بیماری‌های معمول و جراحی‌ها

گزینه 3 آموزش بهداشت- جامعیت خدمات بهداشتی

گزینه 4 پیشگیری از بیماری‌ها- برقراری عدالت در ارائه‌ی خدمات

نمایش پاسخ

ب

سوال 48

کدامیک از موارد زیر از اجزای ۸ گانه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه محسوب می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 درمان بیماری‌های معمولی و جراحی‌ها

گزینه 2 مقابله با حوادث و بلایای طبیعی

گزینه 3 مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان

گزینه 4 مراقبت‌های بهداشت روان

نمایش پاسخ

الف

سوال 49

کاربرد ملاحظات پیشگیرانه و ارتقایی در سطح جامع مطابق با کدامیک از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 اصل هماهنگی بخش‌های توسعه‌ی اجتماعی اقتصادی

گزینه 2 عدالت

گزینه 3 روش مناسب

گزینه 4 جامعیت خدمات

نمایش پاسخ

ج

سوال 50

کدامیک از موارد زیر از ۸رکن اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 دسترسی به آب آشامیدنی سالم

گزینه 3 ایمن‌سازی در برابر بیماری‌های عفونی

گزینه 4 دسترسی به بیمارستان

نمایش پاسخ

د

سوال 51

کدامیک از اصول PHC متضمن ارائه‌ی خدمات در ابعاد پیشگیری، درمان، بازتوانی و ارتقایی است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 وزن برای قد

گزینه 2 وزن برای سن

گزینه 3 قد برای سن

گزینه 4 شاخص توده‌ی بدنی

نمایش پاسخ

ب

سوال 52

براساس چارچوب خدمات مراقبت‌های اولیه در برخورد با کم‌خونی، «کرم‌زدایی» جزء کدام دسته از مداخلات در بیماری قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 مداخله‌ی ارتقایی

گزینه 2 مداخله‌ی پیشگیری

گزینه 3 مداخله‌ی درمانی

گزینه 4 مداخله‌ی بازتوانی

نمایش پاسخ

ب

سوال 53

در رویکرد اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC)، مداخلاتی که سبب کاهش شیوع بیماری به وسیله‌ی توقف پیشرفت بیماری در بیمار می‌گردد، چه نوع مداخله‌ای است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 مداخلات ارتقایی

گزینه 2 مداخلات پیشگیری کننده

گزینه 3 مداخلات درمانی

گزینه 4 مداخلات بازتوانی

نمایش پاسخ

ج

سوال 54

کدامیک جزء شاخص‌های جهانی پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در کشورها است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به بیش از ۶۰ سال

گزینه 2 رسانیدن میزان باسوادى زمان مردان به بیش از ۹۰ درصد

گزینه 3 حداقل ۱۰% تولید ناخالص ملی برای بهداشت صرف شود

گزینه 4 حداقل ۷۰% نوزادان وزنی بالای ۲۵۰۰ گرم در بدو تولد داشته باشند

نمایش پاسخ

الف

سوال 55

تمام موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶. قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 بهبود تغذیه

گزینه 2 آموزش بهداشت

گزینه 3 هماهنگی بین بخشی

گزینه 4 واکسیناسیون کودکان

نمایش پاسخ

ج

سوال 56

کدامیک از موارد زیر از اجزای اولیه PHC نبوده و بعداً در ایران اضافه شده است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸_قطب شمال)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 بهداشت مادر و کودک

گزینه 3 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 4 سلامت روان

نمایش پاسخ

د

سوال 57

کدامیک از گزینه‌های زیر بر اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) تطبیق نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 در ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی روش‌ها، ابزار و سیستم اداری باید منطبق با شرایط و فرهنگ جامعه طراحی شوند

گزینه 2 بهداشت به صورت مجرد وجود ندارد و تحت تأثیر ترکیبی از عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی است

گزینه 3 بهداشت پدیده‌ای خودجوش است و بدون همکاری و علاقه‌ی مردم و ایجاد انگیزه هیچ‌گونه موفقیت چشم‌گیری حاصل نمی‌شود

گزینه 4 خدمات بهداشتی باید به صورت برابر در اختیار افراد جامعه قرار گیرد و افراد با نیازهای متفاوت سلامت باید دسترسی یکسان به خدمات داشته باشند

نمایش پاسخ

د

سوال 58

در چارچوب خدمات مراقبت‌های اولیه در برخورد با مشکلات مرتبط با سلامت کدامیک جزء مداخلات ارتقایی است؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 تغذیه با شیر مادر برای ذات‌الریه

گزینه 2 آموزش بهداشت برای سرخک

گزینه 3 غربالگری بیماران برای کم‌خونی

گزینه 4 پیشگیری دارویی در مالاریا

نمایش پاسخ

ب

سوال 59

دستیابی به کدام سطح سلامتی هدف استراتژی سلامتی برای همه (HFA) است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 داشتن زندگی مولد اقتصادی و اجتماعی

گزینه 2 سلامت و رفاه کامل جسمی- روانی- اجتماعی

گزینه 3 فقدان بیماری و معلولیت

گزینه 4 ارتقای سطح سلامت معنوی و روحی

نمایش پاسخ

ب

سوال 60

در ارزیابی نظام مراقبت بیماری‌ها در کشورمان کدامیک از خصوصیات زیر را مدنظر قرار نمی‌دهید؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 حساسیت و ارزش اخباری مثبت

گزینه 2 قابلیت پذیرش

گزینه 3 انعطاف‌پذیری

گزینه 4 ویژگی (اختصاصی بودن)

نمایش پاسخ

د

سوال 61

مقرر گردیده است که در نظام مراقبت بیماری دیابت در استان کرمان، تمامی گروه‌های سنی و جنسی جامعه و همچنین کلیه‌ی ساکنین شهرها و روستاها تحت پوشش قرار گیرند. این موضوع نشان دهنده‌ی کدام ویژگی نظام مراقبت است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 زمان انتظار (Timelines)

گزینه 2 انعطاف‌پذیری (flexibility)

گزینه 3 قابلیت پذیرش (Acceptability)

گزینه 4 معرف بودن (Representativeness)

نمایش پاسخ

د

سوال 62

فلسفه‌ی اصلی مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز/پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان/ سبب_پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان/ سبب_دندان پزشکی و پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان/ پزشکی ریفرم و شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 درمان بیماری‌های معمول و شایع

گزینه 2 توزیع عادلانه منابع بهداشتی

گزینه 3 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 4 واکسیناسیون برعلیه بیماری‌های عفونی

نمایش پاسخ

ب

سوال 63

پایه و اساس راهبرد «بهداشت برای همه» چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 تعهد دولت

گزینه 2 توزیع عادلانه

گزینه 3 مشارکت مردم

نمایش پاسخ

ب

سوال 64

کدامیک از موارد زیر جزء اجزای PHC است؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 بهسازی محیط

گزینه 2 همکاری بین بخشی

گزینه 3 عدالت اجتماعی

گزینه 4 مشارکت مردم

نمایش پاسخ

الف

سوال 65

در اصل جامعیت ارائه‌ی خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) «دادن رژیم غذایی پر آهن» و «کنترل ناقلین» به ترتیب جزء کدامیک از مداخلات مربوط به بیماری کم‌خونی محسوب می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 ارتقای- پیشگیری

گزینه 2 درمانی- بازتوانی

گزینه 3 بازتوانی- ارتقای

گزینه 4 پیشگیری- درمانی

نمایش پاسخ

ج

سوال 66

در مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC مداخلات ارتقای، پیشگیری، درمانی و بازتوانی پیش‌بینی شده‌اند. این اقدامات مربوط به کدامیک از اصول PHC است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز/پزشکی ریفرم شهریور ۹۸_ قطب همدان و مشهد / پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸ _ قطب همدان)

گزینه 1 هماهنگی بین بخشی (Inter-sectoral approach)

گزینه 2 عدالت و برابری (Equity)

گزینه 3 روش‌های مناسب (Appropriate methods)

گزینه 4 جامعیت خدمات (Comprehensiveness)

نمایش پاسخ

د

سوال 67

هدف «بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ میلادی» به چه معنی بوده است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 افزایش دسترسی به مراقبت‌های اساسی بهداشت

گزینه 2 از بین رفتن فاصله‌ی بین فقیر و غنی

گزینه 3 سالم بودن همه‌ی افراد و کنترل بیماری‌ها

گزینه 4 تلاش همه برای بهبود سلامت جهان

نمایش پاسخ

الف

سوال 68

کدامیک از گزینه‌های زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 بهداشت مادر و کودک

گزینه 3 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 4 مشارکت مردم و اتکاء به خود

نمایش پاسخ

د

سوال 69

میزان «امید به زندگی» در کدامیک از دوره‌های زندگی، بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 بدو تولد

گزینه 2 نوجوانی

گزینه 3 جوانی

نمایش پاسخ

الف

سوال 70

هدف نهایی سیستم بهداشت و درمان چیست؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 کاهش بیماری

گزینه 2 افزایش خدمت تخصصی

گزینه 3 بهبود دسترسی به خدمات

گزینه 4 افزایش کیفیت زندگی

نمایش پاسخ

د

سوال 71

معیار «رسانیدن با سواد برای مردان و زنان به بالای ۷۰ درجه درصد جامعه» برای ارزیابی کدام شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 وضعیت تغذیه‌ی کودک

گزینه 2 وضعیت سواد جامعه

گزینه 3 وضعیت مرگ و میر مادران

گزینه 4 میزان مرگ و میر در جامعه

نمایش پاسخ

ب

سوال 72

در زمینه‌ی کنترل بیماری‌های روده‌ای، کدامیک از موارد زیر نقش آموزش بهداشت است؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 شناسایی منبع آلودگی

گزینه 2 شناسایی تعداد موارد ابتلا

گزینه 3 ارائه‌ی راه حل در خصوص کنترل بیماری

گزینه 4 درمان ابتلا به بیماری

نمایش پاسخ

ج

سوال 73

کدامیک از ملاحظات زیر لزوماً برای بکارگیری روش‌های مناسب در مراقبت‌های بهداشتی اولیه کاربرد ندارد؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 مدرن و پیشرفته بودن

گزینه 2 هزینه‌ی مناسب

گزینه 3 برخورداری از کارایی

گزینه 4 قابل پذیرش بودن

نمایش پاسخ

الف

سوال 74

کدام مورد زیر جزء اصول مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی PHC نیست؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 استفاده از تکنولوژی مناسب

گزینه 2 توزیع عادلانه‌ی امکانات

گزینه 3 هماهنگی بین بخشی

گزینه 4 مبارزه با بیماری‌های شایع و بومی منطقه

نمایش پاسخ

د

سوال 75

کدامیک جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC نیست؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 اثر بخشی

گزینه 2 روش‌های مناسب

گزینه 3 هماهنگی با بخش‌های توسعه

گزینه 4 جامعیت خدمات

سوال 76

کدام مورد از موارد زیر جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی (P. H. C) است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز/پزشکی اسفند ۹۷_ قطب کرمان و تهران و اصفهان)

گزینه 1 بهسازی محیط

گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 3 جامعیت خدمات

گزینه 4 بهبود تغذیه

ج. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل اصل هماهنگی مشارکت مردم روش‌های مناسب عدالت و جامعیت خدمات است.

سوال 77

کدامیک از موارد زیر جزء اصلی خدمات بهداشتی اولیه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 آموزش سلامت

گزینه 2 واکسیناسیون

گزینه 3 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 4 بهداشت مادر و کودک

الف. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل اصل هماهنگی مشارکت مردم روش‌های مناسب عدالت و جامعیت خدمات (مداخلات ارتقایی و پیشگیری کننده) است.

سوال 78

همه‌ی موارد زیر از اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) می‌باشند، بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 فاصله‌گذاری بین موالید

گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 3 بهداشت حرفه‌ای

گزینه 4 تغذیه‌ی سالم

ج. اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است.

سوال 79

کدامیک از گزینه‌های زیر جزء اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 2 دسترسی به آب آشامیدنی سالم

گزینه 3 عدالت در دسترس به خدمات

گزینه 4 پیشگیری و کنترل بیماری‌ها

ج. اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است.

سوال 80

کدامیک از موارد زیر از اجزاء PHC نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 واکسیناسیون

گزینه 3 دسترسی به آب آشامیدنی سالم

گزینه 4 عدالت

د / اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است.

سوال 81

کدامیک از خدمات زیر علاوه‌بر اجزاء اصلی PHC به عنوان جزء مکمل در ایران اجراء می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 درمان بیماری‌های معمول و جراحات

گزینه 2 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 3 بهبود تغذیه

گزینه 4 بهداشت دهان و دندان

د / اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است. در ایران بهداشت دهان و دندان و بهداشت روان هم اجراء می‌شود.

سوال 82

کدام مورد جزء اجزای PHC است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 مشارکت مردم

گزینه 2 عدالت اجتماعی

گزینه 3 همکاری بین بخشی

گزینه 4 بهداشت مادر و کودک

نمایش پاسخ

د / اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید (بهداشت مادر و کودک) دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است.

سوال 83

کدامیک از موارد زیر جزء شاخص‌های جهانی برای پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در تمام کشورها نیست؟ (پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 حداقل ۵٪ تولید ناخالص ملی GNP برای بهداشت صرف شود.

گزینه 2 دسترسی آحاد جامعه به مراقبت‌های بهداشتی درمانی شامل حداقل دسترسی به ۲۰ قلم داروی اساسی

گزینه 3 تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی

گزینه 4 کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال به کم‌تر از ۵۰ در هزار

نمایش پاسخ

ج / تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و رساندن میزان باسوادی زنان و مردان به بیش از ۹۰٪ کل افراد جامعه جزء شاخص‌های جهانی برای پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در تمام کشورها نیست.

سوال 84

کدامیک از موارد زیر جزء اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه در همه‌ی جوامع نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 بهبود تغذیه

گزینه 2 آموزش بهداشت

گزینه 3 پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی

گزینه 4 بهداشت روان

نمایش پاسخ

د / اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است. در ایران بهداشت دهان و دندان و بهداشت روان هم اجراء می‌شود.

سوال 85

کدامیک از شاخص‌های مربوط به سلامت بیش از همه نشانگر وضعیت عدالت اجتماعی است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 امید به زندگی

گزینه 2 مرگ کودکان زیر ۵ سال

گزینه 3 دسترسی مردم به خدمات اولیه‌ی بهداشتی

گزینه 4 کنترل فلج اطفال

نمایش پاسخ

ج / عدالت اجتماعی که فلسفه‌ی اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه است به معنای دسترسی مردم به خدمات اولیه‌ی بهداشتی است.

سوال 86

همه‌ی موارد زیر از شاخص‌های جهانی پایش برنامه‌ی بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ است، یچیز: (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 فراهم کردن دسترسی به آب سالم

گزینه 2 کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال

گزینه 3 افزایش میزان باسوادی در زنان و مردان

گزینه 4 افزایش امید به زندگی در بدو تولد

نمایش پاسخ

ب / تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال جزء شاخص‌های جهانی برای پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در تمام کشورها نیست.

سوال 87

کدامیک جزء اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه معرفی شده از طرف سازمان بهداشت جهانی نیست؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 دسترسی به داروهای اساسی

گزینه 2 درمان بیماری‌های معمول و جراحی‌ها

گزینه 3 مراقبت‌های بهداشت روان

گزینه 4 کنترل بیماری‌های عفونی بومی

نمایش پاسخ

ج / اجزای مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل آموزش بهداشت تغذیه‌ی مناسب آب کافی فاصله‌گذاری بین موالید دسترسی به داروهای اساسی و واکسیناسیون است. در ایران بهداشت دهان و دندان و بهداشت روان هم اجراء می‌شود.

سوال 88

قرار دادن منابع خطر ساز در محدوده‌ی بسته‌ای که تعداد افراد در معرض را به حداقل ممکن رسانده و یا حذف نماید، تعریف کدام اقدام کنترلی در حوزه‌ی بهداشت حرفه‌ای است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 جایگزینی

گزینه 2 محصور کردن

گزینه 3 ترمیم و بهبود

گزینه 4 تهویه

نمایش پاسخ

ب / محصور کردن به معنای قرار دادن منابع خطر ساز در محدوده‌ی بسته‌ای که تعداد افراد در معرض را به حداقل ممکن رسانده و یا حذف نماید است.

سوال 89

مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) شامل خدمات ارتقایی، پیشگیری و درمانی پایه در کدام سطح از سیستم سلامت ارائه می‌گردد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 مراکز بهداشتی درمانی

گزینه 2 سطح جامعه

گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی

گزینه 4 همه‌ی سطوح سیستم سلامت

نمایش پاسخ

الف / مراقبت‌های بهداشتی اولیه در پایین‌ترین سطح نظام بهداشتی یعنی مراکز بهداشتی درمانی اجراء می‌شود.

سوال 90

تمام موارد از شاخصه‌های جهانی پایش بهداشت برای همه است، بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 رساندن میزان باسوادی زنان و مردان به بیش از ۹۰% کل افراد جامعه

گزینه 2 کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال به کم‌تر از ۵۰ در هزار

گزینه 3 صرف حداقل ۵% از تولید ناخالص ملی برای بهبود بهداشت جامعه

گزینه 4 برخورداری حداقل ۹۰% کودکان از وزن مناسب برای سن

نمایش پاسخ

الف / تأمین و پوشش بیمه‌ی همگانی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و رساندن میزان با سوادی زنان و مردان به بیش از ۹۰% کل افراد جامعه جزء شاخص‌های جهانی برای پایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در تمام کشورها نیست.

باسوادی ← 70 درصد.

سوال 91

کدامیک از موارد زیر جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 هماهنگی بین بخشی

گزینه 2 مشارکت مردم

گزینه 3 جامعیت خدمات

گزینه 4 بهبود تغذیه

نمایش پاسخ

الف. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: اصل هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات.

دال دشت تغذیه ← جزء اجزاست

سوال 92

کدامیک از اجزای بیانیه‌ی آلماتا است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 رویکرد مبتنی بر شواهد

گزینه 2 فناوری مناسب

گزینه 3 تمرکز بر غربالگری

گزینه 4 پیشگیری در سطح فردی

نمایش پاسخ

ب

سوال 93

همه‌ی موارد زیر از اصول مراقبت بهداشتی اولیه است، بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال / دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 برابری توزیع

گزینه 2 مشارکت جامعه

گزینه 3 تأمین آب کافی و سالم و بهسازی‌های اساسی

گزینه 4 هماهنگی بین بخشی

نمایش پاسخ

ج. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات.

سوال 94

کدام‌یک از عبارات زیر توضیح مناسب‌تری برای قانون مراقبت معکوس (inverse care Lav) است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 تنوع فرهنگی واضحی در نحوه‌ی تفسیر نتایج بیماری وجود دارد

گزینه 2 بیماری‌هایی که به طور ناگهانی ظهور پیدا می‌کنند اغلب نیاز فوری به خدمات دارند

گزینه 3 افرادی که نیاز بیشتری به کمک درمانی دارند اغلب دسترسی به خدمات بهداشتی پایین‌تر است.

گزینه 4 تصمیم افراد به دسترسی به خدمات به درک آن‌ها از بیماری مربوط می‌شود.

نمایش پاسخ

ج. قانون مراقبت معکوس می‌گه: توزیع نامناسب خدمات و امکانات سبب نابرابری شده و افرادی که نیاز بیشتری به کمک درمانی دارند اغلب دسترسی پایین‌تری به خدمات بهداشتی دارند.

بسته در مورد افراد بی‌خانمان و افراد با مشکل یادگیری صحبت است

سوال 95

قانون مراقبت معکوس (Inverse law care) در مورد کدام گروه افراد حاکم است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 افراد بی‌خانمان- افراد مبتلا به ایدز

گزینه 2 افراد دارای درد و ناراحتی- افراد معلول

گزینه 3 افراد معلول- مبتلایان به هیپاتیت

گزینه 4 افراد دارای مشکل یادگیری- افراد بی‌خانمان

نمایش پاسخ

د. قانون مراقبت معکوس بیشتر در مورد افراد بی‌خانمان و افراد با مشکل یادگیری صادق است.

سوال 96

مفهوم «بدون همکاری و علاقه‌ی مردم به تأمین و توسعه‌ی خدمات هیچ‌گونه موفقیتی برای آن حاصل نمی‌شود»، به کدام اصل مراقبت‌های بهداشتی اشاره کرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 توزیع عادلانه

گزینه 2 مشارکت جامعه

گزینه 3 جامعیت خدمات

گزینه 4 نیازسنجی

نمایش پاسخ

ب. فارسی بلد باشی جواب دادی!

سوال 97

معادل مرحله‌ی «معاینه‌ی بالینی» خدمات بالینی، در فعالیت‌های سلامت دهان در سطح جامعه چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 نیازسنجی

گزینه 2 تحلیل داده‌ها

گزینه 3 برنامه ریزی

گزینه 4 نقد و بازنگری

نمایش پاسخ

الف. سؤالای قطب تبریز توی این مبحث زیاده و کاملاً متفاوته با همه‌ی قطب‌ها و کشوری‌ها

سوال 98

ارائه‌ی خدمات» و «پاسخگویی» به ترتیب جزء کدامیک از مشخصه‌های نظام سلامت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 اهداف- اهداف

گزینه 2 کارکردها- اهداف

گزینه 3 اهداف- کارکردها

گزینه 4 کارکردها- کارکردها

نمایش پاسخ

ب. بازم یه سوال متفاوت از قطب تبریز که احتمالا دیگه تکرار هم نمیشه.

سوال 99

کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های ارزشیابی روند پیشرفت به سوی بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 اختصاص حداقل ۳ درصد از تولید ناخالص ملی هر کشور برای مراقبت‌های بهداشتی

گزینه 2 داشتن حداقل ۶۰ سال امید به زندگی در بدو تولد

گزینه 3 رسیدن مرگ و میر شیرخواران به کم‌تر از ۲۰ مرگ از هر ۱۰۰۰ تولد زنده

گزینه 4 ۹۰ درصد از نوزادان در هنگام تولد وزن حدود ۱.۵ کیلوگرم داشته باشند.

نمایش پاسخ

ب. بقیه گزینه‌ها اینجوری درست میشه: حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص ملی / کاهش مرگ‌ومیر کودکان زیر یک سال به کمتر از ۵۰ در هزار تولد / حداقل ۹۰ درصد نوزادان وزن بالای ۲.۵ کیلوگرم داشته باشند.

۷۰ درصد بار در بزرگسالان

سوال 100

کدامیک جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 ایمن‌سازی

گزینه 3 مراقبت سلامت روان

گزینه 4 تدارک داروهای اساسی

نمایش پاسخ

ج. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات.

گزینه های دیگر: اجزای مهم مراقبت های اولیه است؛ (PHC) Primary Health Care

سوال 101

کدامیک از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه (Primary Health Care) به کارآیی فناوری و قابل پذیرش بودن رویکرد هم برای جامعه‌ی هدف و هم ارائه کنندگان خدمات بهداشتی اشاره دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 عدالت (برابری) Equity

گزینه 2 جامعیت خدمات

گزینه 3 کاربرد روش‌های مناسب Appropriate Methods

گزینه 4 مشارکت مردم و اتکاء به خود Community Participation

نمایش پاسخ

ج.

سوال 102

کدام گزینه جزء اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 ایمن‌سازی در برابر بیماری‌های عفونی و غیره

گزینه 2 تدارک داروهای اساسی

گزینه 3 برابری یا عادلانه بودن توزیع خدمات بهداشتی

گزینه 4 تأمین آب سالم و کافی

نمایش پاسخ

ج. اصول مراقبت‌های بهداشتی شامل ایناست: هماهنگی بخش‌های مختلف / مشارکت مردم / تکنولوژی و روش‌های مناسب / عدالت / جامعیت خدمات.

سوال 103

مشارکت جامعه و آموزش بهداشت به ترتیب جزء کدام‌یک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 اصول / سطوح PHC

گزینه 2 اصول / اجزاء PHC

گزینه 3 سطوح / منابع PHC

گزینه 4 سطوح / اصول PHC

نمایش پاسخ

ب. مشارکت جامعه یکی از اصول PHC و آموزش بهداشت اولین جزء آن است.

سوال 104

در خصوص نابرابری و بی‌عدالتی در سلامت کدام گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 هر نابرابری در سلامت به معنای وجود بی‌عدالتی است

گزینه 2 پوشش کم‌تر واکسیناسیون در دختران نسبت به پسران، هم نابرابری و هم بی‌عدالتی است

گزینه 3 اختلاف در سطح سلامت مردم قابل پیشگیری نیست

گزینه 4 تفاوت‌های سلامت مربوط به عوامل اقتصادی- اجتماعی غیر قابل اجتناب هستند.

نمایش پاسخ

ب. هر نابرابری به معنی بی‌عدالتی نیست. مثلاً برای زنان خدمات مامایی داریم ولی مردان نه! پوشش نابرابر واکسیناسیون هم نابرابری و هم بی‌عدالتی است.

سوال 105

کدام گزینه در فعالیت‌های اجتماعی سلامت دهان معادل تشخیص در کار فردی کلینیکی است؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 طراحی برنامه

گزینه 2 ارزیابی نیاز

گزینه 3 تحلیل داده‌ها

گزینه 4 اجرای برنامه

نمایش پاسخ

ج

سوال 106

کدامیک از موارد زیر جزء شاخص‌های جهانی پایش بهداشت برای همه است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 افزایش امید به زندگی در بدو تولد به پیش از ۸۰ سال

گزینه 2 درصد قابل قبولی از بودجه بهداشتی کشور برای ارائه‌ی مراقبت‌ها در اولین سطح با جامعه استفاده شود.

گزینه 3 آب سالم در منزل یا در فاصله‌ای با نیم ساعت راهپیمایی در دسترس باشد.

گزینه 4 تمامی کودکان از وزن مناسب با سن خود برخوردار باشند.

نمایش پاسخ

ب. شاخص‌ها رو بلدی دیگه؟ امید به زندگی بدو تولد حداقل ۶۰ سال، آب سالم با فاصله‌ی ۱۵ دقیقه‌ای، ۹۰ درصد کودکان با وزن مناسب سن و...

سوال 107

با توجه به مرحله ارزیابی آموزشی و بوم شناختی الگوی پریسید کدام یک از گزینه های زیر بیان کننده مفهوم عوامل زمینه ساز است؟(دندان پزشکی شهریور ۹۹-
کشوری)

گزینه 1 عواملی که سبب دلسردی و دلگرمی افراد برای ادامه رفتار میشوند

گزینه 2 باورها ارزش ها و برداشت هایی که می توانند انگیزه فرد را برای انجام رفتار تقویت کنند

گزینه 3 تشویق ها و پسخوراند هایی که پس از انجام رفتار جدید از دیگران دریافت می شود

گزینه 4 منابع مهارت ها و عواملی که انجام رفتار را تسهیل می کنند

نمایش پاسخ

ب
ب-عدکنده و منطق را انگیزه را فراهم می کند
قابلیت کنده و موجب انگیزه مردم برای ادامه رفتار می شوند.
اجازه می دهد انگیزه تحقق پیدا کند.

سوال 108

با در نظر گرفتن چارچوب خدمات مراقبتهای اولیه در بر خورد با مشکلات مرتبط با سلامت در کاهش شیوع و توقف پیشرفت بیماری کم خونی فقر آهن مبارزه با
بیماریهای انگلی جز کدام دسته از اقدامات قرار میگیرد؟(پزشکی شهریور ۹۹-کشوری)

گزینه 1 مداخلات ارتقایی

گزینه 2 مداخلات باز توانی

گزینه 3 مداخلات درمانی

گزینه 4 مداخلات پیشگیری

نمایش پاسخ

د/مبارزه با بیماری انگلی مداخلات پیشگیری میباشد

سوال 109

کدامیک از عبارات زیر شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت مناسب تغذیه کودکان جامعه می باشد؟(پزشکی شهریور ۹۹ _ کشوری)

گزینه 1 تولد حداقل ۹۰% نوزادان بیش از ۲۵۰۰ گرم

گزینه 2 تولد بیش از۵۰% نوزادان بیش از ۳۰۰۰ گرم

گزینه 3 کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال به کمتر از ۵۰ در هزار

گزینه 4 برخورداری از وزن متناسب با قد در همه دوره های زندگی

نمایش پاسخ

الف/حداقل ۹۰% نوزادان باید به هنگام تولد وزن بالای ۲۵۰۰داشته باشند

سوال 110

کدامیک از موارد زیر از اجزای مراقبت های بهداشتی اولیه بشمار نمی آید؟(پزشکی شهریور ۹۹ کشوری)

گزینه 1 بهبود وضع تغذیه

گزینه 2 گسترش برنامه ایمن سازی

گزینه 3 عدالت

گزینه 4 تامین و تدارکات داروهای اساسی

نمایش پاسخ

ج/این مورد جز اصول میباشد

سوال 111

مهمترین مفهوم ارتقای سلامت کدام گزینه زیر است؟(پزشکی شهریور ۹۹ _کشوری)

گزینه 1 توانمندسازی مردم در تصمیم گیری برای سلامت خود

گزینه 2 ارتقای آگاهی بهداشتی مردم به منظور تغییر رفتار

گزینه 3 تغییر فرهنگ بهداشتی مردم جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی

گزینه 4 ایجاد هماهنگی های درون بخشی برای توسعه سلامت جامعه

نمایش پاسخ

الف ارتقای سلامت : توانمند سازی مردم در تصمیم گیری برای سلامت خود.

سوال 112

منظور از جامعیت خدمات در مراقبت‌های اولیه بهداشتی چیست؟ (علوم پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 منابع و امکانات به گونه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد که همه مردم جامعه صرف‌نظر از تفاوت‌ها به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشند.

گزینه 2 همه امکانات، ابزار، روش‌ها و نیروی انسانی مناسب و منطبق با شرایط جامعه در ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه بکار گرفته شوند.

گزینه 3 همه مردم جامعه در ایجاد، نگهداری و استفاده از خدمات بهداشتی و پیشگیری فعالیت داشته باشند.

گزینه 4 مراقبت‌های بهداشتی اولیه در برگیرنده مداخلات ارتقای، پیشگیری کننده و باز توانی باشد.

نمایش پاسخ

د جامعیت خدمات در مراقبت‌های اولیه بهداشتی: مراقبت‌های بهداشتی اولیه در برگیرنده مداخلات ارتقای، پیشگیری کننده و بازتوانی باشد.

سوال 113

منظور از تشخیص اجتماعی چیست؟ (علوم پایه دندان پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 مجموعه‌ای از اقدامات برای برآوردن نیازهای جامعه با توجه به منابع و خواست مردم

گزینه 2 ارزیابی افراد به منظور تشخیص بالینی و سنجش نیازهای بهداشتی آن‌ها

گزینه 3 بررسی الگوی بیماری‌ها و عوامل مهم مؤثر بر این الگوی در جامعه

گزینه 4 آموزش و برقراری ارتباط با افراد جامعه به منظور انتشار آگاهی‌ها در سطح جامعه

نمایش پاسخ

ج/تشخیص اجتماعی یعنی: بررسی الگوی بیماری‌ها و عوامل مهم مؤثر بر این الگوی در جامعه

سوال 114

اگر به عنوان عضوی از تیم سلامت جامعه به منظور برنامه‌ریزی ارتقای سلامت دهان و دندان، اقدام به نیاز سنجی نموده و توسط ارزیابی تیم تخصصی لیستی از

نیازهای افراد آن جامعه تهیه کرده‌باشید، این دسته از نیازها در کدام دسته قرار می‌گیرند؟ (علوم پایه دندان پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری)

گزینه 1 Comparative

گزینه 2 Expressed

گزینه 3 Felt

گزینه 4 Normative

نمایش پاسخ

د/ اگر به عنوان عضوی از تیم سلامت جامعه به منظور برنامه‌ریزی ارتقای سلامت دهان و دندان، اقدام به نیاز سنجی نموده و توسط ارزیابی تیم تخصصی لیستی از نیازهای افراد آن جامعه تهیه کرده‌باشید، این نیازها در دسته نیازهای Normative قرار می‌گیرند.

سطوح مراقبت‌های بهداشتی

تعداد سوال: ۴۰

درج سختی: آسان

نکات:۱-بیمارستان عمومی سطح دوم مراقبت های بهداشت است.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی- درمانی شهری و پایگاه‌های بهداشتی به ترتیب در کدام سطح از سطوح خدمات بهداشتی قرار دارند؟ (پزشکی شهرپور ۹۵- قطب

تبریز / دندان پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و کرمان)

گزینه 1 اول- دوم- سوم

گزینه 2 دوم- اول- دوم

گزینه 3 دوم- دوم- دوم

گزینه 4 اول- اول- اول

نمایش پاسخ

سوال 2

کدامیک از موارد زیر جزء مراقبت‌های سطح دوم بهداشتی به حساب می‌آید؟ (دندان‌پزشکی شهرپور ۹۵- قطب تبریز / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز / دندان‌پزشکی شهرپور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 خدمات بیمارستان‌های تخصصی

گزینه 2 خدمات پیشگیری

گزینه 3 خدمات پایه درمانی

گزینه 4 خدمات بیمارستان‌های عمومی

نمایش پاسخ

سوال 3

کدامیک از سطوح هرم PHC (مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی) در برگیرنده‌ی بسیاری از مشکلات مربوط به جمع کثیری از مردم است؟ (پزشکی شهرپور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 میانی

گزینه 2 بالایی

گزینه 3 ابتدایی

گزینه 4 پایینی

نمایش پاسخ

سوال 4

کدامیک از موارد زیر سطح دوم مراقبت در سیستم بهداشتی درمانی ایران است؟ (پزشکی شهرپور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 خانه‌ی بهداشت

گزینه 2 مراکز بهداشتی درمانی

گزینه 3 بیمارستان عمومی شهر

گزینه 4 کلینیک‌های خصوصی

نمایش پاسخ

سوال 5

خدمات بیمارستان‌های عمومی در کدامیک از سطوح مراقبت‌های بهداشتی قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال / دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری / دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری /_پزشکی شهرپور ۹۵ قطب اصفهان/ دندان پزشکی شهرپور ۹۷_ قطب تبریز)

گزینه 1 مقدماتی

گزینه 2 اول

گزینه 3 دوم

گزینه 4 سوم

نمایش پاسخ

سوال 6

محیطی‌ترین و ابتدایی‌ترین واحد ارائه‌ی خدمت در نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال / دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم شهرپور ۹۸- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی شهرپور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 پایگاه بهداشت

گزینه 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

گزینه 3 خانه‌ی بهداشت

گزینه 4 واحد تسهیلات زایمانی

نمایش پاسخ

ج. محیطی‌ترین واحد ارائه‌ی خدمات و سطح اول خانه‌ی بهداشت است. بیمارستان عمومی در سطح دوم و بیمارستان تخصصی در سطح سوم خدمات خود را ارائه می‌دهد.

سوال 7

مراقبت‌های سطح اولیه‌ی نظام سلامت در کشور شامل کدام مورد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶. قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 بیمارستان‌های عمومی

گزینه 2 بیمارستان‌های تخصصی

گزینه 3 پایه درمانی، پیشگیری

نمایش پاسخ

ج

سوال 8

بیمارستان عمومی در شبکه‌ی بهداشتی درمانی در چه سطحی از خدمات قرار دارد؟ (دندان‌پزشکی شه‌ریور ۹۴- قطب شمال/پزشکی اسفند۹۷ _قطب تهران)

گزینه 1 سوم

گزینه 2 دوم

گزینه 3 اول

گزینه 4 فوق تخصصی

نمایش پاسخ

ب

سوال 9

براساس اصول PHC مراقبت‌های پیچیده‌تر شامل خدمات درمانی ضروری در کدام سطح ارائه می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 سطح اول

گزینه 2 سطح دوم

گزینه 3 سطح سوم

گزینه 4 سطح چهارم

نمایش پاسخ

ج

سوال 10

مراقبت‌های سطح دوم نظام سلامت در کشور، شامل کدام مورد زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 پایه‌درمانی

گزینه 2 ارتقایی، پیشگیری

گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی

گزینه 4 بیمارستان‌های تخصصی

نمایش پاسخ

ج

سوال 11

مراقبت‌های بهداشتی اولیه در همه‌ی واحدهای زیر ارائه می‌گردد، بجز: (پزشکی شه‌ریور ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 خانه‌ی بهداشت

گزینه 2 پایگاه بهداشتی

گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی شهرستان

گزینه 4 مرکز بهداشتی درمانی

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

اولین سطح ارجاع در سیستم بهداشتی- درمانی ایران کدام است؟ (دندان‌پزشکی شه‌ریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 مرکز بهداشتی- درمانی روستایی

گزینه 2 مرکز بهداشتی- درمانی شهری

گزینه 3 پایگاه بهداشتی

گزینه 4 بیمارستان شهرستان

نمایش پاسخ

ج

سوال 13

پایگاه بهداشتی تحت نظارت مستقیم کدامیک از واحدهای زیر است؟ (دندان شه‌ریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 مرکز بهداشتی- درمانی روستایی

گزینه 2 مرکز بهداشتی- درمانی شهری

گزینه 3 مرکز بهداشت شهرستان

گزینه 4 مرکز آموزش بهورزی

نمایش پاسخ

سوال 14

خدمات سطح اول شبکه‌های بهداشتی درمانی شامل همه‌ی موارد زیر است، بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ارتقایی

گزینه 2 پیشگیری

گزینه 3 پایه درمانی

گزینه 4 بیمارستان‌های عمومی

نمایش پاسخ

سوال 15

کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی‌های ارائه‌ی خدمات شبکه‌های بهداشت و درمان نیستند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 اولویت حاشیه‌ی شهرها

گزینه 2 در نظر گرفتن جهت تعریف شده

گزینه 3 ادغام خدمات

گزینه 4 سطح‌بندی خدمات

نمایش پاسخ

سوال 16

واحدهای ارائه کننده‌ی خدمات سطح اول کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 خانه‌ی بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی

گزینه 2 بیمارستان‌های عمومی شهرستان‌ها

گزینه 3 بیمارستان‌های فوق تخصصی

گزینه 4 مرکز بهداشت شهرستان‌ها

نمایش پاسخ

سوال 17

کوچک‌ترین واحد مستقل نظام ارائه‌ی خدمات سلامت در کشور کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شهیدبهشتی / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال /)

گزینه 1 شبکه‌ی بهداشت و درمان شهرستان

گزینه 2 خانه‌ی بهداشت روستایی

گزینه 3 خانه‌ی بهداشت

گزینه 4 پایگاه‌های بهداشتی

نمایش پاسخ

سوال 18

اولین واحد ارائه دهنده‌ی خدمات سلامت در شهرستان کدام مورد است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی شهری

گزینه 2 مرکز بهداشت شهرستان

گزینه 3 بیمارستان شهرستان

گزینه 4 خانه‌ی بهداشت

نمایش پاسخ

سوال 19

خدمات ارائه شده در «بیمارستان‌های تخصصی» زیرمجموعه‌ی کدامیک از سطوح مراقبت‌های بهداشتی است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 اول

گزینه 2 دوم

گزینه 3 سوم

گزینه 4 چهارم

نمایش پاسخ

سوال 20

اولین سطح تماس مردم با سیستم بهداشتی درمانی اولیه‌ی ضروری کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 کلینیک‌های تخصصی

گزینه 2 خانه‌های بهداشت

گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی شهرستان

گزینه 4 مراکز بهداشتی درمانی

نمایش پاسخ

ب

سوال 21

اولین سطح ارجاع در نظام بهداشتی، به کدامیک از مراکز خدماتی زیر محول شده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 خانه‌ی بهداشت

گزینه 2 بیمارستان‌های منطقه و مراکز بهداشتی مردم

گزینه 3 مؤسسات منطقه‌ای

گزینه 4 مؤسسات مرکزی

نمایش پاسخ

الف

سوال 22

کدامیک از گروه‌های ارائه کننده‌ی خدمت، به عنوان سطح ۱ خدمات بهداشت دهان و دندان محسوب می‌شوند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 دندان‌پزشکان

گزینه 2 بهداشت کاران دهان و دندان

گزینه 3 متخصصین دندان‌پزشکی

گزینه 4 بهورزان

نمایش پاسخ

د

سوال 23

خدمات بهداشت دهان و دندان توسط دندان‌پزشکان در نظام بهداشتی درمانی کشور، در کدام سطح انجام می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 خانه‌ی بهداشت

گزینه 2 بیمارستان عمومی

گزینه 3 مرکز بهداشتی درمانی

گزینه 4 مرکز بهداشت استان و بیمارستان تخصصی

نمایش پاسخ

ج

سوال 24

همه‌ی ملاحظات زیر برای بکارگیری روش‌های مناسب در مراقبت‌های بهداشتی اولیه باید در نظر گرفته شوند، بجز: (دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 مدرن و پیشرفته بودن

گزینه 2 هزینه‌ی مناسب

گزینه 3 برخورداری از کارایی

گزینه 4 قابل پذیرش بودن

نمایش پاسخ

الف / نیازی نیست که مراقبت‌های بهداشتی اولیه مدرن و پیشرفته باشند بلکه هزینه‌ی مناسب و قابل پذیرش بودن مهم‌تر می‌باشند.

سوال 25

کدام گزینه به سطح سوم ارائه‌ی مراقبت‌های سلامت اشاره دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 بیمارستان تخصصی

گزینه 2 بیمارستان عمومی شهرستان

گزینه 3 مرکز جامع مراقبت سلامت شهری

گزینه 4 مرکز جامع مراقبت سلامت روستایی

نمایش پاسخ

الف / بیمارستان عمومی در سطح دوم و بیمارستان تخصصی در سطح سوم خدمات خود را ارائه می‌دهد.

سوال 26

خدمات بیمارستان‌های تخصصی جزء کدام سطح از سطوح مراقبت‌های سلامتی محسوب می‌شود؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 اول

گزینه 2 دوم

گزینه 3 سوم

گزینه 4 چهارم

نمایش پاسخ

ج / بیمارستان عمومی در سطح دوم و بیمارستان تخصصی در سطح سوم خدمات خود را ارائه می‌دهد.

سوال 27

ترتیب صحیح واحدهای ارائه دهنده‌ی خدمت در سیستم ایران کدام است؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب همدان و مشهد) (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 روستاهای اقماری، روستای اصلی دانشگاهی مرکز استان، مرکز بهداشت درمانی، بیمارستان عمومی شهر

گزینه 2 روستاهای اصلی، مرکز بهداشتی درمانی، بیمارستان دانشگاهی مرکز استان

گزینه 3 روستای اصلی، مرکز بهداشتی درمانی، بیمارستان عمومی شهر، بیمارستان دانشگاهی مرکز استان

گزینه 4 روستای اقماری، روستای اصلی، مرکز بهداشتی درمانی، بیمارستان

نمایش پاسخ

ج / ~~تیم تخصصی شهریور~~، مرکز بهداشتی درمانی، بیمارستان عمومی شهر، بیمارستان دانشگاهی مرکز استان است.

سوال 28

در توانایی نظام مراقبت در تشخیص موارد، کدامیک از شاخص‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردارند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد / دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 حساسیت و ویژگی

گزینه 2 ویژگی و ارزش اخباری منفی

گزینه 3 حساسیت و ارزش اخباری مثبت

گزینه 4 ویژگی و ارزش اخباری مثبت

نمایش پاسخ

د

سوال 29

کدامیک از موارد زیر از تفاوت‌های خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 فعالیت‌های مربوط به بهداشت محیط

گزینه 2 جلب مشارکت مردم و تشکیل گروه‌های داوطلب

گزینه 3 مراقبت‌های مربوط به تنظیم خانواده و گذاشتن IUD

گزینه 4 ایمن‌سازی و واکسیناسیون

نمایش پاسخ

ج

سوال 30

در مناطق روستایی، دندان‌پزشک عمومی در کدام واحد شبکه‌های بهداشت و درمان کشور فعالیت دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 خانه بهداشت

گزینه 2 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

گزینه 3 مرکز آموزش بهورزی

گزینه 4 مرکز بهداشت شهرستان

نمایش پاسخ

ب

سوال 31

توجه به وظایف تعریف شده برای هر مرکز، «دندان‌پزشک» در کدامیک از مراکز زیر حضور ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 مرکز بهداشتی درمانی روستایی

گزینه 2 مرکز بهداشتی درمانی شهری

گزینه 3 پایگاه بهداشتی در شهر

گزینه 4 خانه بهداشت

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) شامل خدمات ارتقایی، پیشگیری و خدمات درمانی پایه در کدام سطح سیستم سلامت ارائه می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸-
قطب اصفهان و همدان)

گزینه 1 در سطح جامعه

گزینه 2 خانه بهداشت و مراکز بهداشتی

گزینه 3 بیمارستان‌های عمومی

گزینه 4 همه‌ی سطوح سیستم سلامت

نمایش پاسخ

ب

سوال 33

در منطقه‌ای میزان بزرگی طحال در کودکان ۲ تا ۹ ساله بیشتر از ۵۰ درصد و در بالغین بیشتر از ۲۵ درصد است، بر اساس طبقه‌بندی مالاریای بومی (Endemic Malaria) توسط سازمان جهانی بهداشت، این منطقه در کدام طبقه قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 فرو بومی

گزینه 2 تمام بومی

گزینه 3 فرا بومی

گزینه 4 نیمه بومی

نمایش پاسخ

ج / این منطقه بر اساس طبقه بندی مالاریای بومی در طبقه فرابومی قرار می‌گیرد.

سوال 34

اگر دریک برنامه ترک سیگار، حمایت‌های لازم از طرف مراکز فرهنگی که فرد به آن‌ها تعلق دارد، در این زمینه صورت بگیرد، بر اساس الگوی بوم شناختی- اجتماعی مک لیروی (McLeroy.Et Al.) کدام سطح تاثیر در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 میان‌فردی

گزینه 2 سازمانی

گزینه 3 اجتماعی

گزینه 4 سیاست‌ها و خط مشی‌ها

نمایش پاسخ

ب / سطح سازمانی در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

مراکز فرهنگی

سوال 35

در جامعه‌ای با شیوع بالای سرطان پوست، متخصصین در نظر دارند با استفاده از نظریه اشاعه نوآوری، رفتار استفاده از کرم ضد آفتاب را ترویج کنند. در فرآیند اجرای برنامه و طبقه بندی افراد، گروهی از آنان علاقه‌مند به انجام رفتار بوده ولی نیازمند انگیزه‌های بیرونی برای پذیرش رفتار بودند، این گروه در چه طبقه‌ای قرار می‌گیرند؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 پیشگامان

گزینه 2 زود پذیرندگان

گزینه 3 اکثریت اولیه

گزینه 4 واماندگان

نمایش پاسخ

ج / این گروه در گروه اکثریت اولیه قرار می‌گیرند.

سوال 36

در چارچوب خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی، کدام‌یک از مداخلات زیر برای "کم خونی" در گروه مداخلات درمانی قرار می‌گیرد؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 تجویز آهن

گزینه 2 غربالگری بیماران

گزینه 3 خدمات تلفیقی

گزینه 4 استفاده از مکمل تغذیه‌ای

نمایش پاسخ

د / استفاده از مکمل تغذیه ای جزء مراقبت های اولیه بهداشتی است.

سوال 37

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در مورد مراقبت‌های اولیه بهداشتی، صحیح نیست؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 خدمات مراقبت‌های بهداشتی اولیه، کلیه خدمات پیشگیری و ارتقایی، درمانی و بازتوانی را پوشش می‌دهد.

گزینه 2 پیچیدگی مراقبت‌های مربوط به سلامت در مراکز بهداشتی- درمانی، کمتر از سطح جامعه است.

گزینه 3 فراوانی مشکلات مربوط به سلامت در سطح جامعه، بیش از بیمارستان‌ها است.

گزینه 4 در مداخلات ارتقایی در مراقبت‌های بهداشتی اولیه، تاثیر بر علل اساسی مشکلات سلامت مدنظر است.

نمایش پاسخ

ب / در مورد مراقبت های بهداشتی اولیه پیچیدگی مراقبت‌های مربوط به سلامت در مراکز بهداشتی- درمانی، کمتر از سطح جامعه نیست.

سوال 38

اولین سطح مراقبت در سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه کدام است؟ (علوم‌پایه دندان‌پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 خانواده و جامعه

گزینه 2 خانه‌های بهداشت

گزینه 3 مراکز بهداشتی درمانی روستایی

گزینه 4 بیمارستان‌های شهرستان

نمایش پاسخ

الف / اولین سطح مراقبت در سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه خانواده و جامعه است.

سوال 39

منظور از جامعیت خدمات در مراقبت‌های اولیه بهداشتی چیست؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 منابع و امکانات به گونه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد که همه مردم جامعه صرف‌نظر از تفاوت‌ها به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشند.

گزینه 2 همه امکانات، ابزار، روش‌ها و نیروی انسانی مناسب و منطبق با شرایط جامعه در ارائه مراقبت‌های بهداشتی اولیه بکار گرفته شوند.

گزینه 3 همه مردم جامعه در ایجاد، نگهداری و استفاده از خدمات بهداشتی و پیشگیری فعالیت داشته باشند.

گزینه 4 مراقبت‌های بهداشتی اولیه در برگیرنده مداخلات ارتقایی، پیشگیری کننده و باز توانی باشد.

نمایش پاسخ

د - مراقبت‌های بهداشتی اولیه در برگیرنده مداخلات ارتقایی، پیشگیری کننده و باز توانی و خدمات پایه درمانی مثل تزریق آمپول و واکسن در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشتی و مراکز بهداشت درمانی است.

سوال 40

در چارچوب خدمات مراقبت‌های اولیه بهداشتی کدامیک از مداخلات زیر در مورد «بیماری اسهال» مداخله ارتقایی محسوب می‌شود؟ (علوم‌پایه پزشکی اسفند ۹۹- کشوری)

گزینه 1 تأمین امنیت غذایی

گزینه 2 تغذیه با شیر مادر

گزینه 3 مایع درمانی خوراکی

گزینه 4 آموزش بهداشت فردی

نمایش پاسخ

الف / تأمین امنیت غذایی، مداخله ارتقایی محسوب می‌شود.

تاریخچه‌ی بهداشت حرفه‌ای در جهان، ایران و اصول بهداشت حرفه‌ای

این مبحث طبق رفرنس سال ۹۶ به بعد جزء حذفیات بوده و نباید ارزش سؤال بیاد!

خودآزمایی

سوال 1

کدام گزینه مراحل اجرایی بهداشت حرفه‌ای را به ترتیب از راست به چپ صحیح نشان می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 ارزشیابی- شناسایی- اندازه‌گیری- کنترل

گزینه 2 ارزشیابی- اندازه‌گیری- شناسایی- کنترل

گزینه 3 شناسایی- اندازه‌گیری- ارزشیابی- کنترل

گزینه 4 کنترل- ارزشیابی- اندازه‌گیری- شناسایی

نمایش پاسخ

ج

سوال 2

مراحل اقدامات اجرایی در بهداشت حرفه‌ای به ترتیب کدامند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 شناسایی، ارزشیابی، اندازه‌گیری، کنترل

گزینه 2 شناسایی، اندازه‌گیری، ارزشیابی، کنترل

گزینه 3 اندازه‌گیری، ارزشیابی، شناسایی، کنترل

گزینه 4 اندازه‌گیری، شناسایی، ارزشیابی، کنترل

نمایش پاسخ

ب

اولین قدم در عملیات اجرایی بهداشت حرفه‌ای کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 اندازه‌گیری میزان خطر

گزینه 2 تعیین استانداردهای بهداشت حرفه‌ای

گزینه 3 شناسایی عوامل خطر

گزینه 4 جایگزینی منابع پر خطر با منابع کم خطر

نمایش پاسخ

ج

تعیین حدود نسبی عامل زیان‌آور، بیانگر کدامیک از اصول بهداشت حرفه‌ای است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 شناسایی

گزینه 2 اندازه‌گیری

گزینه 3 ارزشیابی

گزینه 4 کنترل

نمایش پاسخ

ب

بررسی میزان TLV در محدوده‌ی کدام وظیفه‌ی بهداشت حرفه‌ای است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 اندازه‌گیری

گزینه 2 ارزشیابی

گزینه 3 شناسایی

گزینه 4 کنترل

نمایش پاسخ

ب

تعیین افراد در معرض خطر و تعیین کارایی اقدامات کنترلی، جزء کدام مرحله‌ی اجرایی بهداشت حرفه‌ای است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 اقدامات کنترل

گزینه 2 شناسایی

گزینه 3 تفسیر نتایج و تعیین خطر (ارزشیابی)

گزینه 4 اندازه‌گیری

نمایش پاسخ

د

مقایسه‌ی مقادیر اندازه‌گیری شده محیطی و بیولوژیکی با «حد تعیین شده استاندارد» در بهداشت حرفه‌ای در کدام مرحله صورت می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 شناسایی

گزینه 2 ارزشیابی

گزینه 3 اندازه‌گیری

گزینه 4 اقدامات کنترلی

نمایش پاسخ

ب

در عملیات اجرایی بهداشت حرفه‌ای با انجام چه اقدامی می‌توان تعداد افراد در معرض خطر را نشان داد و کارایی اقدامات کنترلی را تعیین نمود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 شناسایی

گزینه 2 اندازه‌گیری

گزینه 3 ارزشیابی

گزینه 4 اقدامات کنترلی

نمایش پاسخ

ب

کدامیک از تکنیک‌های شناسایی خطر در بهداشت حرفه‌ای، در مورد همه حوادث قابل اجرا است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 تجزیه و تحلیل خطاهای کاری

گزینه 2 تجزیه و تحلیل علت - پیامد

گزینه 3 تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی

گزینه 4 ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل حفاظ‌ها و موانع

نمایش پاسخ

ج تکنیک تجزیه و تحلیل غفلت‌ها و فراموش‌کاری‌های مدیریتی قابل اجرا می‌باشد.

اهداف بهداشت حرفه‌ای

این مبحث طبق رفرنس سال ۹۶ به بعد جزء حذفیات بوده و نباید ارزش سؤال بیاد!

خودآزمایی

سوال 1

کدامیک از گزینه‌های زیر جزء اهداف اصلی بهداشت حرفه‌ای محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 تأمین و ارتقای بهداشت و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین

گزینه 2 پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار

گزینه 3 تطابق شرایط کار با انسان به منظور کاهش اثرات در سلامت

گزینه 4 تأمین شغل مناسب برای افراد به منظور کاهش بیماری‌های شغلی

نمایش پاسخ

د

سوال 2

کدامیک از گزینه‌های زیر، در مورد هدف برنامه کنترل سرخک در دنیا صحیح است؟ (علوم‌پایه پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان‌دوره کشوری)

گزینه 1 کاهش موارد ابتلا به میزان ۱۰۰ درصد تا سال ۱۹۹۵

گزینه 2 کاهش مرگ ناشی از سرخک به میزان ۹۵ درصد تا سال ۱۹۹۵

گزینه 3 افزایش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از ۵۰ درصد

گزینه 4 افزایش پوشش واکسیناسیون سرخک به بیش از ۹۰ درصد

نمایش پاسخ

ب کاهش مرگ ناشی از سرخک به میزان ۹۵ درصد تا سال ۱۹۹۵ جزء اهداف این برنامه می‌باشد.

راه‌های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه‌ای

این مبحث طبق رفرنس سال ۹۶ به بعد جزء حذفیات بوده و نباید ارزش سؤال بیاد!

خودآزمایی

سوال 1

همه‌ی موارد زیر جزء راه‌های دستیابی به اهداف بهداشت حرفه‌ایست بجز: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 معاینات قبل از استخدام

گزینه 2 تطبیق کار با کارگر

گزینه 3 بررسی علل غیبت از کار

گزینه 4 بازنشستگی زود هنگام در مشاغل پر مخاطره

نمایش پاسخ

د

سوال 2

کدام گزینه مراحل اجرایی بهداشت حرفه‌ای را به ترتیب از راست به چپ صحیح نشان می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 شناسایی- اندازه‌گیری- ارزشیابی- کنترل

گزینه 2 ارزشیابی- شناسایی- اندازه‌گیری- کنترل

گزینه 3 ارزشیابی- اندازه‌گیری- شناسایی- کنترل

گزینه 4 کنترل- ارزشیابی- اندازه‌گیری- شناسایی

نمایش پاسخ

د

کدام گزینه مراحل اجرایی بهداشت حرفه‌ای را به ترتیب از راست به چپ، به طور صحیح نشان می‌دهد؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 شناسایی- اندازه‌گیری- ارزشیابی- کنترل

گزینه 2 ارزشیابی- شناسایی- کنترل- اندازه‌گیری

گزینه 3 کنترل- ارزشیابی- شناسایی- اندازه‌گیری

گزینه 4 شناسایی- کنترل- اندازه‌گیری- ارزشیابی

نمایش پاسخ

الف

نقش بهداشت حرفه‌ای در توسعه‌ی پایدار

پیشنهاده‌ا: ایمنی کار و خطرات و بیماری‌های ناشی از کار

این مبحث طبق رفرنس سال ۹۶ به بعد جزء حذفیات بوده و نباید ازش سؤال بیاد!

خودآزمایی

در خصوص اقدامات کنترلی در محیط کار جهت حفاظت کارگران، به ترتیب اولویت گزینه‌ی صحیح کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 جایگزینی، ایجاد فاصله و موانع، وسایل حفاظت فردی

گزینه 2 وسایل حفاظت فردی، ایجاد فاصله و موانع، جایگزینی

گزینه 3 محصور کردن، جایگزینی، وسایل حفاظت فردی

گزینه 4 وسایل حفاظت فردی، جایگزینی، محصور کردن

نمایش پاسخ

الف

احداث فضای سبز در اطراف کارخانجات صنعتی در کدام حیطه از برنامه‌های کنترل خطرات شغلی قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 حذف

گزینه 2 محدودسازی

گزینه 3 طرح‌های ایمنی

گزینه 4 جداسازی

نمایش پاسخ

د

روش‌های پیشگیری از بارداری

تعدادسوال:۶۹

درجه سختی: متوسط

Ocp موارد منع مصرف مطلق

۱-اختلال عملکرد کلیه ۲- سرطان پستان ۳- خون ریزی غیر طبیعی دستگاه تناسلی با علت نامشخص.

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

در کدامیک از روش‌های پیشگیری از بارداری، میزان شکست در طی اولین سال استفاده‌ی معمول، بیش‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان/پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 قرص‌های ترکیبی

گزینه 2 کاندوم مردانه

گزینه 3 قرص‌های پروژسترونی تنها

گزینه 4 آی یو دی حاوی مس

نمایش پاسخ

ب

کدام روش پیشگیری از بارداری قابل برگشت، بهترین هزینه‌ی اثربخشی را دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 آمپول‌های تزریقی ترکیبی

گزینه 2 قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری

گزینه 3 دیومدروکسی پروژسترون

گزینه 4 آی یو دی

نمایش پاسخ

د

خانمی ۲۰ ساله که به تازگی ازدواج کرده است خواهان یک روش مؤثر پیشگیری از بارداری است. کدامیک را پیشنهاد می‌کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 DMPA

گزینه 2 توبکتومی

گزینه 3 IUD

گزینه 4 OCP

نمایش پاسخ

د

زمان استفاده از آمپول DMPA بعد از زایمان در مادران شیرده کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۶ هفته بعد از زایمان

گزینه 2 ۵ روز بعد از زایمان

گزینه 3 ۲ هفته بعد از زایمان

گزینه 4 ۶ ماه بعد از زایمان

نمایش پاسخ

الف

کدامیک جزء موارد منع مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 بیماری عروقی مغزی

گزینه 2 کارسینوم پستان

گزینه 3 چاقی

گزینه 4 اختلال عملکرد کبدی

نمایش پاسخ

ج

تمام موارد زیر از مزایای مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری هستند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 کاهش بروز سرطان آندومتر

گزینه 2 کاهش بروز آدنوم خوش‌خیم کبد

گزینه 3 کاهش بروز بیماری‌های التهابی لگن

گزینه 4 کاهش بروز سرطان تخمدان

نمایش پاسخ

ب

مصرف قرص‌های ترکیبی ضد بارداری در کدام مورد زیر منع مصرف مطلق دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 افسردگی بسیار شدید

گزینه 2 دیابت بدون درگیری عروقی

گزینه 3 بیماری فعال کیسه صفرا

گزینه 4 اختلال عملکرد کبدی

نمایش پاسخ

د

کدام مکانیسم متعلق به روش‌های هورمونی (قرص) پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 افزایش ترشح پرولاکتین

گزینه 2 واکنش التهابی موضعی رحم

گزینه 3 تغییر در تکامل طبیعی آندومتر

گزینه 4 پیشگیری از رسیدن اسپرم به تخمک

نمایش پاسخ

ج

سوال 10

در کدامیک از موارد زیر منع مصرف مطلق OCP ترکیبی وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 خون‌ریزی غیر طبیعی واژن با دلایل نامشخص

گزینه 2 افسردگی شدید

گزینه 3 بیماری فعال کیسه صفرا

گزینه 4 دیابت بدون درگیری عروق

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

آمپول‌های دیو مدروکسی پروژسترون استات چه مدتی اثر ضد بارداری ایجاد می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 ۲ ماه

گزینه 2 ۳ ماه

گزینه 3 ۶ ماه

گزینه 4 یک سال

نمایش پاسخ

ب

سوال 12

کدامیک از گزینه‌های زیر از موارد منع مصرف نسبی قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 کارسینوم تأیید شده یا مشکوک پستان یا سابقه‌ی آن

گزینه 2 بیماری‌های سیانوتیک و دریچه‌ای قلب توام با عارضه‌ی قلبی

گزینه 3 خون‌ریزی غیر طبیعی واژن با علت نامشخص

گزینه 4 سابقه‌ی یرقان انسدادی در حاملگی

نمایش پاسخ

د

سوال 13

تمام گزینه‌های زیر از موارد منع مصرف مطلق قرص‌های خوراکی پیشگیری کننده از حاملگی هستند، بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 بیماری عروق مغزی

گزینه 2 هیپرلپیدمی مادرزادی

گزینه 3 بیماری فعال کیسه صفرا

گزینه 4 نئوپلازی کبد

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

کدامیک از مزایای هورمون‌های تزریقی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 پیشگیری از سرطان آندومتر

گزینه 2 پیشگیری از سرطان تخمدان

گزینه 3 پیشگیری از سرطان گردن رحم

گزینه 4 پیشگیری از سرطان پستان

نمایش پاسخ

الف

سوال 15

کدام مورد زیر از مزایای مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 کاهش بروز سرطان تخمدان

گزینه 2 کاهش بروز سرطان سرویکس

گزینه 3 کاهش بروز سرطان اندومتر

گزینه 4 کاهش بروز بیماری‌های خوش‌خیم پستان

نمایش پاسخ

ب

سوال 16

کاهش احتمال ابتلا به کدامیک از موارد زیر از مزایای قرص‌های هورمونی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 سرطان سرویکس

گزینه 2 پرولاکتینومای هیپوفیز

گزینه 3 دیابت

گزینه 4 بیماری‌های التهابی لگن

نمایش پاسخ

د

سوال 17

تمام موارد زیر در مورد OCP صحیح است، بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 هر دارویی باعث تحریک آنزیم‌های کبدی شود روی متابولیسم سریع قرص‌ها اثر می‌گذارد.

گزینه 2 استفاده همزمان بعضی از داروها اثر پیشگیری قرص‌ها را کاهش می‌دهد.

گزینه 3 OCP تداخل شناخته شده‌ای با هیچ دارویی ندارد.

گزینه 4 در مصرف همزمان بعضی از داروها باید از یک Barrier استفاده شود.

نمایش پاسخ

ب

سوال 18

موارد زیر از مزایای قرص‌های پیشگیری از بارداری هستند بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 کاهش سرطان تخمدان

گزینه 2 کاهش سرطان سرویکس

گزینه 3 کاهش دیسمنوره

گزینه 4 کاهش بیماری‌های التهابی لگن (PID)

نمایش پاسخ

ب

سوال 19

همه‌ی موارد زیر از عوارض قرص‌های پیشگیری از بارداری محسوب می‌شوند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 افزایش موی صورت و بدن

گزینه 2 ترومبوز وریدی

گزینه 3 یرقان کولستاتیک

گزینه 4 کم‌خونی فقر آهن

نمایش پاسخ

د

سوال 20

خانم شیردهی از قرص‌های پیشگیری از بارداری پروژسترونی یا مینی پیل استفاده می‌کند. وی با نگرانی به دلیل فراموشی ۶ ساعته‌ی مصرف قرص مراجعه کرده است.

کدام توصیه‌ی زیر صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 ضمن مصرف ۲ عدد قرص تا ۴۸ ساعت از یک روش مطمئن دیگر استفاده کند.

گزینه 2 بقیه‌ی قرص‌ها را ادامه دهد و قرص فراموش شده را مصرف نکند.

گزینه 3 بقیه‌ی قرص‌ها را ادامه دهد، قرص فراموش شده را مصرف نکند و از یک روش مطمئن استفاده کند.

گزینه 4 ضمن مصرف ۲ عدد قرص تا یک هفته از یک روش مطمئن دیگر استفاده کند.

نمایش پاسخ

الف

سوال 21

خانم شیردهی به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است. وی اظهار می‌کند یک شب مصرف مینی بیل را فراموش کرده است. چه توصیه‌ای به وی می‌کنید؟ (پزشکی

شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 دو عدد قرص بخورد و تا ۴۸ ساعت از روش مطمئن دیگری استفاده نماید.

گزینه 2 قرص‌ها را قطع کند و تا آخر سیکل از روش دیگری استفاده کند.

گزینه 3 قرص فراموش شده را نخورد و قرص همان روز را خورده تا ۴۸ ساعت از روش دیگری استفاده کند.

گزینه 4 سه عدد قرص یک‌جا بخورد و تا آخر سیکل از روش دیگری استفاده کند.

نمایش پاسخ

الف

سوال 22

برای زوجی که تازه ازدواج کرده‌اند، کدامیک از روش‌های زیر روش مناسبی برای پیشگیری از بارداری نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 وسیله‌ی داخل رحمی (IUD)

گزینه 2 کاندوم

گزینه 3 قرص LD

گزینه 4 قرص تری فازیک

نمایش پاسخ

الف

سوال 23

کدامیک از قرص‌های زیر به عنوان قرص شیردهی (Minipill) شناخته می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 پروژسترون

گزینه 2 ترکیبی LD

گزینه 3 تری فازیک

گزینه 4 ترکیبی HD

نمایش پاسخ

الف

سوال 24

همه‌ی موارد زیر جزء موارد منع مصرف مطلق OCP می‌باشند، بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 افسردگی بسیار شدید

گزینه 2 سیگاری بالای ۳۵ سال

گزینه 3 سابقه‌ی سرطان پستان

گزینه 4 فشار خون بالای ۱۶۰/۱۰۰

نمایش پاسخ

الف

سوال 25

کدامیک از موارد زیر جزء منع مصرف مطلق کنتراسپتیوهای خوراکی (OCP) است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 خون‌ریزی واژینال با علت نامشخص

گزینه 2 سیگاری‌های زیر ۳۵ سال

گزینه 3 افسردگی

گزینه 4 میگردن بدون علائم عصبی

نمایش پاسخ

الف و ب

سوال 26

خانم ۳۷ ساله‌ی سیگاری با سردردهای میگرنی خفیف جهت مشاوره‌ی باروری مراجعه کرده است. کدامیک از روش‌های پیشگیری از بارداری در مورد ایشان منع مصرف مطلق دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 OCP

گزینه 2 IUD

گزینه 3 Mini Pill

گزینه 4 DMPA

نمایش پاسخ

الف

سوال 27

کدامیک از گزینه‌های زیر مهم‌ترین تعیین کننده‌ی خطر عوارض قلبی عروقی در مصرف کنندگان قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 میزان پروژسترون

گزینه 2 مصرف سیگار

گزینه 3 چاقی و اضافه وزن

گزینه 4 سن پایین شروع مصرف

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

در مرکز مشاوره‌ی تنظیم خانواده خانم ۲۸ ساله‌ای مبتلا به لویپوس سیستمیک تحت درمان با سابقه‌ی خون‌ریزی‌های ماهانه‌ی شدید که یک فرزند شیرخوار ۵ ماهه دارد، مراجعه کرده است. بهترین روش پیشگیری از بارداری برای دو تا چهار سال آینده برای ایشان، کدام مورد است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 نورپلانت

گزینه 2 تزریق مدروکسی پروژسترون استات

گزینه 3 آی یو دی

گزینه 4 توبکتومی

نمایش پاسخ

ب

سوال 29

اگر زوجین قصد داشته باشند فقط برای حدود ۶ ماه پیشگیری از بارداری داشته باشند همه‌ی روش‌های زیر برای آن‌ها مناسب است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 قرص LD

گزینه 2 قرص HD

گزینه 3 آمپول DMPA

گزینه 4 قرص تریفازیک

نمایش پاسخ

ج

سوال 30

تمام گزینه‌های زیر موارد منع مطلق مصرف IUD هستند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- مشترک کشوری)

گزینه 1 عفونت‌های لگنی فعال، اخیر یا مکرر

گزینه 2 بارداری (مشکوک یا شناخته نشده)

گزینه 3 خون‌ریزی‌های غیر طبیعی، نامنظم (تشخیص داده نشده)

گزینه 4 نداشتن سابقه‌ی زایمان

نمایش پاسخ

د

سوال 31

همه‌ی مکانیسم‌های زیر در استفاده از آی یو دی باعث پیشگیری از بارداری می‌شوند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 واکنش التهابی موضعی

گزینه 2 افزایش حرکات لوله‌های رحمی

گزینه 3 آتروفی اندومتر

گزینه 4 مهار تخمک‌گذاری

نمایش پاسخ

د

سوال 32

خانمی سابقه‌ی بارداری خارج رحمی دارد. کدام روش پیشگیری از بارداری زیر را توصیه نمی‌کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز/پزشکی شهریور ۹۳ _ قطب شیراز)

گزینه 1 IUD

گزینه 2 قرص‌های ترکیبی

گزینه 3 نورپلانت

گزینه 4 تزریق Depo-provera

نمایش پاسخ

الف

سوال 33

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص روش‌های پیشگیری از بارداری به صورت اضطراری صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 تجویز دانازول روزانه به مدت ۵ روز

گزینه 2 IUD حاوی مس تا ۵ روز پس از نزدیکی

گزینه 3 میفپریستون (Mifepristone) دو روز به فاصله‌ی ۱۲ ساعت

گزینه 4 لونورجسترل (Levonorgestrel) روزانه به مدت ۳ روز

نمایش پاسخ

الف

سوال 34

مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری به صورت اضطراری حداکثر تا چند ساعت پس از مقاربت با احتمال بارداری توصیه می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ۱۲

گزینه 2 ۲۴

گزینه 3 ۴۸

گزینه 4 ۷۲

نمایش پاسخ

د

سوال 35

کدامیک از موارد زیر در ارتباط با روش تزریقی پیشگیری از بارداری دیومدروکسی صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 استفاده از DMPA باعث افزایش وزن در مصرف کنندگان می‌شود.

گزینه 2 افسردگی یکی از علل شایع قطع مصرف DMPA است.

گزینه 3 بعد از سه ماه، تقریباً نیمی از مصرف کنندگان دچار آمنوره می‌شوند.

گزینه 4 استفاده از DMPA تأثیر دائمی بر باروری دارد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 36

کدامیک از گزینه‌های زیر، جزء «روش‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری» محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 نورپلانت Norplant

گزینه 2 لوونورژسترول (Levonorgestrel)

گزینه 3 لاینسترول یا مینی پیل Minipill

گزینه 4 دپوپروورا Depo – Provera

نمایش پاسخ

ب

سوال 37

بین مصرف دو بسته قرص مینی پیل (لاینسترول) جهت پیشگیری از بارداری چه فاصله‌ای لحاظ می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 هیچ فاصله‌ای

گزینه 2 یک هفته

گزینه 3 پنج روز

گزینه 4 به فاصله‌ی یک دوره‌ی خون‌ریزی

نمایش پاسخ

الف

سوال 38

در خانمی با کم‌خونی شدید فقر آهن، کدامیک از روش‌های زیر نسبت به سایر روش‌ها منع مصرف دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 IUD

گزینه 2 قرص ترکیبی با دوز پایین

گزینه 3 آمپول DMPA

گزینه 4 کاندوم

نمایش پاسخ

الف

سوال 39

استفاده از قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری به خاطر استروژن موجود در آن ریسک کدامیک از موارد زیر را افزایش می‌دهد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 سرطان آندومتر

گزینه 2 سرطان تخمدان

گزینه 3 ترومبوآمبولی

گزینه 4 حاملگی خارج رحم

نمایش پاسخ

ج

سوال 40

کدامیک از موارد منع استفاده از DMPA نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 خون‌ریزی رحمی با دلایل نامشخص

گزینه 2 شیردهی

گزینه 3 بیماری یا اختلال عملکرد کبدی

گزینه 4 سابقه‌ی ترومبو فلیت

نمایش پاسخ

ب

سوال 41

کدامیک از گزینه‌های زیر جزء موارد منع مصرف مطلق قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 سابقه‌ی یرقان انسدادی در بارداری

گزینه 2 دوران شیردهی

گزینه 3 ترومبو فلیت

گزینه 4 اختلال عملکردی کبد

نمایش پاسخ

د

سوال 42

تمام موارد زیر از موارد منع مصرف مطلق، قرص‌های ضد بارداری ترکیبی (OCP) است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 سابقه‌ی ترومبوز وریدهای عمقی

گزینه 2 اختلال عملمردی کبد

گزینه 3 کارسینوم (سرطان) پستان

گزینه 4 خون‌ریزی غیر طبیعی دستگاه تناسلی با علت نامشخص

نمایش پاسخ

الف

سوال 43

کم‌ترین میزان شکست در طی سال اول استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 کاندوم

گزینه 2 آی.یو.دی

گزینه 3 قرص‌های خوراکی

گزینه 4 نورپلانت

نمایش پاسخ

ج

سوال 44

کدام استروژن در اغلب کنتراسپتیوهای خوراکی بکار می‌رود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 استروژن

گزینه 2 اتینیل استرادیول

گزینه 3 استریول

گزینه 4 اکولین

نمایش پاسخ

ب

سوال 45

در مرکز مشاوره‌ی تنظیم خانواده، خانم ۲۸ ساله‌ای که فرزند شیرخوار پنج ماهه دارد مراجعه نموده است. او ذکر می‌کند که خون‌ریزی‌های ماهانه شدید دارد. از موارد زیر کدام روش پیشگیری از بارداری مناسب‌تری برای وی است؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 توپکتومی

گزینه 2 آی یو دی

گزینه 3 قرص ترکیبی HD

نمایش پاسخ

؟

سوال 46

تمام موارد زیر در مورد O.C.P صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 O.C.P تداخل شناخته شده‌ای با هیچ دارویی ندارد.

گزینه 2 استفاده همزمان بعضی از داروها اثر پیشگیری قرص‌ها را کاهش می‌دهد.

گزینه 3 هر دارویی که باعث تحریک آنزیم‌های کبدی شود روی متابولیسم سریع قرص‌ها اثر می‌گذارد.

گزینه 4 در مصرف همزمان بعضی از داروها باید از یک Barrier استفاده کرد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 47

کدامیک از علائم زیر موارد منع مصرف نسبی قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهوان)

گزینه 1 اختلال عملکرد یا نئوپلازی کبدی

گزینه 2 میگرن بدون علائم عصبی

گزینه 3 کارسینوم تأیید شده یا مشکوک پستان یا سابقه‌ی آن

گزینه 4 ترومبوفلیت، اختلالات ترومبو آمبولیک

نمایش پاسخ

ب

سوال 48

کدامیک از روش‌های جلوگیری از بارداری اثربخشی زیادتري دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 قرص‌های ترکیبی

گزینه 2 قرص‌های پروژسترونی

گزینه 3 کاندوم مردانه

گزینه 4 بستن لوله‌ها در مردان

نمایش پاسخ

د

سوال 49

مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری با وقوع کدامیک از موارد زیر همراه است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 نامنظم شدن سیکل قاعدگی

گزینه 2 افزایش بروز سرطان اندومتر

گزینه 3 افزایش بیماری‌های التهابی لگن

گزینه 4 کاهش بیماری‌های خوش‌خیم پستان

نمایش پاسخ

د

سوال 50

تزریق آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات DMPA در کدامیک از شرایط زیر توصیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 خون‌ریزی رحمی با علت نامشخص

گزینه 2 کیست فولیکولی تخمدانی

گزینه 3 ترومبوفلیت فعال

گزینه 4 سرطان پستان

نمایش پاسخ

ب

سوال 51

با وجود مصرف صحیح و مداوم مصرف قرص‌های تری فازیک، به کدام دلیل این نوع قرص نسبت به قرص‌های مونوفازیک جلوگیری از بارداری، برتری ندارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 بیش‌تر بودن میزان شکست

گزینه 2 کاهش میزان پروژسترون دریافتی

گزینه 3 بیش‌تر بودن احتمال رخداد لکه‌بینی

گزینه 4 همه‌ی موارد

سوال 52

کدامیک از گزینه‌های زیر از تأثیرات مصرف قرص‌های هورمونی ترکیبی پیشگیری از بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 کاهش ابتلا به سرطان سرویکس

گزینه 2 کاهش بروز سرطان اندومتر و تخمدان

گزینه 3 کاهش ابتلا به آدنوم خوش‌خیم کبدی

گزینه 4 افزایش بیماری‌های خوش‌خیم پستان

سوال 53

شایع‌ترین عارضه‌ی کپسول‌های کاشتنی (نورپلانت) جهت پیشگیری از بارداری کدام گزینه‌ی زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 تغییر وزن

گزینه 2 سردرد

گزینه 3 افسردگی

گزینه 4 تغییر در خون‌ریزی قاعدگی

سوال 54

قرص‌های پیشگیری از بارداری، احتمال ابتلا به کدام سرطان‌ها را کاهش می‌دهند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 اندومتر و تخمدان

گزینه 2 اندومتر و سرویکس

گزینه 3 پستان و سرویکس

گزینه 4 اندومتر و پستان

الف. قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث کاهش سرطان‌های تخمدان و اندومتر و کاهش فیبروئیدهای رحم می‌شوند اما باعث کاهش سرطان پستان نمی‌شوند.

سوال 55

در کدام روش پیشگیری از بارداری، برگشت باروری با تأخیر بیش‌تری همراه است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 آمپول ترکیبی

گزینه 2 DMPA

گزینه 3 OCP

گزینه 4 IUD

ب. قرص OCP کوتاه اثر بوده اما آمپول DMPA سه ماه اثر دارد.

سوال 56

کدامیک از مزایای مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 کاهش دیس‌منوره

گزینه 2 کاهش خون‌ریزی قاعدگی

گزینه 3 کاهش احتمال ابتلا به بیماری‌های مقاربتی

گزینه 4 کاهش کیست‌های عملکردی تخمدان

ج. قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث کاهش سرطان‌های تخمدان و اندومتر و کاهش فیبروئیدهای رحم و کاهش دیس‌منوره و خون‌ریزی قاعدگی می‌شوند.

سوال 57

خانم ۲۰ ساله‌ای به کم‌خونی فقر آهن و دیس‌منوره شدید جهت مشاوره برای پیشگیری از بارداری به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است. کدام روش پیشگیری را برای وی مناسب می‌دانید؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 کاندوم

گزینه 2 IUD

گزینه 3 بستن لوله‌های رحمی

گزینه 4 قرص پیشگیری از بارداری

د. قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث کاهش سرطان‌های تخمدان و کاهش دیس‌منوره و خون‌ریزی قاعدگی می‌شوند.

سوال 58

کدام مورد مهم‌ترین تعیین کننده‌ی خطر در افزایش وقوع بیماری ایسکمیک قلبی در زنان مصرف کننده‌ی قرص‌های هورمونی ضد بارداری است؟ (پزشکی اسفند ۹۷-
قطب مشهد)

گزینه 1 مصرف سیگار و الکل

گزینه 2 سن کم‌تر، سابقه‌ی مصرف در گذشته

گزینه 3 مصرف الکل، سن کم‌تر

گزینه 4 سن بالا، مصرف سیگار

نمایش پاسخ

د / سن بالاو مصرف سیگار مهم‌ترین تعیین کننده‌ی خطر در افزایش وقوع بیماری ایسکمیک قلبی در زنان مصرف کننده‌ی قرص‌های هورمونی ضد بارداری است.

سوال 59

یک خانم ۳۲ ساله که از قرص هورمون ترکیبی برای پیشگیری از بارداری استفاده می‌کند با نگرانی از اختلال در تست‌های تیروئیدی مراجعه نموده است این دارو چه تأثیری بر تست‌های تیروئیدی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 افزایش T4

گزینه 2 کاهش تیروکسین آزاد

گزینه 3 افزایش rt3

گزینه 4 کاهش TSH

نمایش پاسخ

الف. قرص‌های ضد بارداری باعث هایپرتیروئیدی به صورت افزایش T4می‌شوند. همچنین بر روی متابولیسم چربی و تحمل گلوکز هم اثر می‌گذارند.

سوال 60

موارد منع مطلق IUD تمام موارد زیر است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 اختلالات انعقادی

گزینه 2 عفونت‌های لگنی فعال، اخیر یا مکرر

گزینه 3 خون‌ریزی‌های رحمی غیر طبیعی، نامنظم یا تشخیص داده نشده

گزینه 4 سابقه‌ی دیس‌منوره

نمایش پاسخ

د. موارد منع مطلق IUD شامل شک به حاملگی بیماری التهابی لگن خون‌ریزی رحمی سرطان سرویکس و اختلالات انعقادی است.

سوال 61

کدام عارضه‌ی جانبی زیر در افراد استفاده کننده از IUD بیش‌تر دیده می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 نازایی

گزینه 2 عفونت داخل لگنی

گزینه 3 بارداری خارج رحمی

گزینه 4 پارگی رحم حین کارگذاری

نمایش پاسخ

ب. عوارض جانبی IUD شامل عفونت داخل لگنی نازایی بارداری خارج رحمی و پارگی رحم است.

سوال 62

در کدامیک از موارد زیر مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از حاملگی (OCP) منعی ندارد؟ (دندان‌پزشکی و پزشکی ریفرم و کلاسیک شهریور ۹۸- مشترک کشوری)

گزینه 1 بیماری عروقی مغزی

گزینه 2 سن بالای ۳۵ سال

گزینه 3 کارسینوم پستان

گزینه 4 نئوپلازی کبدی

نمایش پاسخ

ب / موارد منع مصرف قرص‌های ترکیبی پیشگیری از حاملگی: بارداری- سیگار- نئوپلازی کبدی- کارسینوم پستان- بیماری عروقی مغزی- هایپرلیپیدمی مادرزادی

سوال 63

کدامیک از روش‌های پیشگیری از بارداری، موقت نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 عقیم‌سازی مردان

گزینه 2 قرص‌های جلوگیری از بارداری

گزینه 3 وسیله‌ی داخل رحمی

گزینه 4 روش‌های ایجاد مانع

نمایش پاسخ

الف / عقیم‌سازی مردان برای همیشه آن‌ها را نابارور می‌کند.

سوال 64

در مورد روش اورژانسی پیشگیری از بارداری کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 مصرف ۲ قرص HD در اولین فرصت و ۲ عدد ۲۴ ساعت بعد

گزینه 2 مصرف ۲ قرص LD در اولین فرصت و ۲ عدد ۲۴ ساعت بعد

گزینه 3 مصرف ۴ عدد قرص LD در اولین فرصت و ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد

گزینه 4 مصرف ۴ عدد قرص HD در اولین فرصت و ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد

نمایش پاسخ

ج / در مورد روش اورژانسی پیشگیری از بارداری که به قرص صبح روز بعد معروف است مصرف ۴ عدد قرص LD در اولین فرصت و ۴ عدد ۱۲ ساعت بعد توصیه می‌شود.

سوال 65

از میان روش‌های پیشگیری از بارداری،..... مؤثرترین روش پیشگیری قابل برگشت است. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 روش‌های هورمونی

گزینه 2 روش‌های ایجاد مانع

گزینه 3 وسیله‌ی داخل رحمی

گزینه 4 روش‌های طولانی اثر مدرن

نمایش پاسخ

الف / روش‌های هورمونی مؤثرترین روش پیشگیری قابل برگشت هستند.

سوال 66

کدامیک از انواع ای یو دی موجود در بازار، مدت اثربخشی حداکثر ۵ ساله دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 Copper T380A

گزینه 2 Progestasert

گزینه 3 Lippes Loop

گزینه 4 Levonorgestrel

نمایش پاسخ

د / ای یو دی Levonorgestrel موجود در بازار، مدت اثربخشی حداکثر ۵ ساله دارد.

سوال 67

در مورد قرص مینی پیل کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 هر بسته ۲۱ قرص و یک هفته عدم استفاده دارد.

گزینه 2 مهم‌ترین مکانیسم عمل این قرص‌ها جلوگیری از تخمک‌گذاری است.

گزینه 3 بیش‌ترین شکست آن در زنان جوان است.

گزینه 4 در صورت فراموشی بیش از ۳ ساعت از زمان مصرف بایستی مصرف قطع و روش کمکی استفاده شود.

نمایش پاسخ

ج / بین استفاده از دو بسته قرص مینی پیل نباید هیچ فاصله‌ی زمانی‌ای وجود داشته باشد و از طریق نامناسب کردن آندومتر برای لانه‌گزینی تخم عمل می‌کند.

سوال 68

کدامیک از موارد لزوم استفاده از پیشگیری اورژانسی از بارداری نییست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 تجاوز جنسی

گزینه 2 فراموشی خوردن قرص ترکیبی برای ۳ نوبت

گزینه 3 فراموشی خوردن قرص شیردهی به مدت بیش از ۳ ساعت

گزینه 4 استفاده از روش طبیعی پیشگیری از بارداری

نمایش پاسخ

ج / اندیکاسیون‌های استفاده از پیشگیری اورژانسی از بارداری: تجاوز جنسی و فراموشی خوردن قرص ترکیبی برای ۳ نوبت و استفاده از روش طبیعی پیشگیری از بارداری

مثل روش تقویمی

سوال 69

مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری (OCP) باعث کاهش کدامیک از موارد زیر نمی‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 بروز سرطان تخمدان

گزینه 2 بروز سرطان اندومتر

گزینه 3 حاملگی خارج رحمی

گزینه 4 بیماری بدخیم پستان

نمایش پاسخ

الف و ب / قرص‌های پیشگیری از بارداری باعث کاهش سرطان‌های تخمدان و اندومتر و کاهش فیبروئیدهای رحم می‌شوند اما باعث کاهش سرطان پستان نمی‌شوند.

بهداشت باروری

تعداد سوال: ۳۱

درجه سختی: آسان

نکات:۱-آزمایش اعتیاد و تالاسمی و سفلیس قبل از ازدواج برای زوجین در ایران

ضروری است

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدام محدوده‌ی سنی مناسب‌ترین زمان برای بارداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 ۱۵-۲۵ سال

گزینه 2 ۱۸-۲۵ سال

گزینه 3 ۲۰-۳۵ سال

گزینه 4 ۲۰-۳۰ سال

نمایش پاسخ

د

سوال 2

شایع‌ترین اختلالات ژنتیکی در ازدواج فامیلی کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 کوررنگی

گزینه 2 کم‌خونی داسی‌شکل

گزینه 3 هموفیلی

گزینه 4 سندرم‌داون

نمایش پاسخ

د

سوال 3

کدامیک از آزمایشات زیر قبل از ازدواج برای زوجین در ایران ضروری قلمداد می‌شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 اعتیاد- سیفلیس- سرخجه

گزینه 2 اعتیاد- تالاسمی- سرخجه

گزینه 3 اعتیاد- سیفلیس- هپاتیت

گزینه 4 اعتیاد- تالاسمی- سیفلیس

نمایش پاسخ

د

سوال 4

در حال حاضر در ایران به منظور کسب اطمینان از سلامت زوجین، انجام کدامیک از آزمایشات زیر قبل از ازدواج ضروری است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 سیفلیس- اعتیاد- HIV

گزینه 2 سوزاک- HIV- تالاسمی

گزینه 3 اعتیاد- HIV- هپاتیت ب

گزینه 4 سیفلیس- تالاسمی- اعتیاد

نمایش پاسخ

د

سوال 5

خانم بارداری با شکایت سوزش معده و احساس ترش کردن مراجعه کرده است، بهتر است کدام موادغذایی در رژیم وی کاهش یابد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 شیرینی‌جات

گزینه 2 مواد پرچرب

گزینه 3 لبنیات

گزینه 4 مایعات

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

در حال حاضر در ایران کدامیک از آزمایش‌های زیر، قبل از ازدواج، به صورت رایگان و همگانی انجام می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 سیفلیس – اعتیاد

گزینه 2 تالاسمی- HIV

گزینه 3 سیفلیس – تالاسمی – اعتیاد

گزینه 4 اعتیاد – HIV – هپاتیت

نمایش پاسخ

ج

سوال 7

سه ماهه‌ی دوم بارداری از چه هفته‌ای شروع و در چه هفته‌ای پایان می‌یابد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ابتدای هفته‌ی دوازدهم تا انتهای هفته‌ی بیست و ششم

گزینه 2 ابتدای هفته‌ی چهاردهم تا پایان هفته‌ی بیست و هشتم

گزینه 3 انتهای هفته‌ی دوازدهم تا انتهای هفته‌ی بیست و هفتم

گزینه 4 انتهای هفته‌ی چهاردهم تا پایان هفته‌ی بیست و هشتم

نمایش پاسخ

د

سوال 8

به طور معمول در ۱-۲ هفته‌ی آخر بارداری، تنگی نفس و تکرر ادرار مادر چه تغییری می‌یابد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 کاهش – کاهش

گزینه 2 افزایش – کاهش

گزینه 3 کاهش – افزایش

گزینه 4 افزایش – افزایش

نمایش پاسخ

د

سوال 9

برای درمان یبوست در دوران بارداری کدامیک را توصیه نمی‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 مصرف مایعات بیش‌تر

گزینه 2 مصرف‌ملین

گزینه 3 مصرف غذاهای گیاهی

گزینه 4 پیاده‌روی روزانه

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

یک خانم باردار به محض مشاهده‌ی هر یک از علائم زیر لازم است فوراً به مرکز بهداشتی- درمانی، پزشک یا ماما مراجعه کند بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- مشترک کشوری)

گزینه 1 اختلالات بینایی و تاری دید

گزینه 2 افزایش ناگهانی وزن بدن

گزینه 3 گرفتگی پاها

گزینه 4 سردردهای شدید

نمایش پاسخ

ج

سوال 11

کدامیک جزء علائم خطر دوران بارداری نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 خون‌ریزی تناسلی

گزینه 2 تاری‌دید

گزینه 3 ضعف و سرگیجه

گزینه 4 دردهای منظم شکمی

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

کدامیک جزء علائم خطر در بارداری نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 سردردهای شدید

گزینه 2 درد سر دل

گزینه 3 سوزش سر دل

گزینه 4 آبریزش ناگهانی

نمایش پاسخ

ج

سوال 13

خانم باردار با مشاهده‌ی کدامیک از علائم زیر باید به صورت اورژانس به مرکز بهداشتی درمانی، پزشک یا ماما مراجعه کند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 خطوط صورتی رنگ بر روی شکم، ران‌ها و پستان‌ها

گزینه 2 واریس رگ‌های پا و پرخونی رگ‌های اطراف مقعد

گزینه 3 آبریزش و هر نوع ترشح بدبو و چرکی از ناحیه‌ی تناسلی

گزینه 4 ورم در ناحیه‌ی قوزک پا و کمر درد

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

کدامیک از موارد زیر جزء مشکلات شایع دوران بارداری محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 دردهای منظم شکمی

گزینه 2 افزایش ناگهانی وزن

گزینه 3 تهوع و استفراغ مداوم

گزینه 4 سوزش سر دل

نمایش پاسخ

د

سوال 15

خانمی با سن بارداری ۱۲ هفته که اولین بارداری خود را می‌گذراند با شکایت تهوع و استفراغ بارداری (ویار حاملگی) به خانه‌ی بهداشت مراجعه کرده است. بهورز آموزش‌های لازم را به شرح زیر به او ارائه می‌کند. در توصیه‌ها و آموزش‌های بهورز چند جمله صحیح وجود دارد؟ «علت ویار کاملاً مشخص نیست و با گذشت زمان کم‌تر می‌شود.» «نیم ساعت قبل از بلند شدن از رختخواب یک تکه نان برشته مصرف کنید.» «غذای چرب و پر ادویه مصرف نکنید.» «همراه با غذا مایعات خنک بنوشید.» (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 ۱

گزینه 2 ۲

گزینه 3 ۴

گزینه 4 ۳

نمایش پاسخ

د

سوال 16

افزایش وزن مناسب برای خانمی با قد ۱۷۰ سانتی‌متر و وزن قبل از بارداری ۷۰ کیلوگرم، در طول دوران بارداری چند کیلوگرم است؟ (پزشکی شهریور ۹۵ و اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 ۶ الی ۹

گزینه 2 ۷ الی ۱۱/۵

گزینه 3 ۱۱/۵ الی ۱۶

گزینه 4 ۱۲/۵ الی ۱۸

نمایش پاسخ

د

سوال 17

در ویزیت آمادگی برای بارداری خانمی متوجه می‌شوید که شاخص توده‌ی بدنی وی ³⁵kg/m2 است. مقدار افزایش وزن توصیه شده برای ایشان در کل دوران بارداری چند کیلوگرم است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 ۶ کیلوگرم

گزینه 2 ۱۲ کیلوگرم

گزینه 3 ۱۶ کیلوگرم

گزینه 4 ۱۸ کیلوگرم

نمایش پاسخ

سوال 18

کدامیک از موارد زیر جزء شکایات شایع در دوران بارداری نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 تکرار ادراری

گزینه 2 تهوع صبحگاهی

گزینه 3 ورم انگشتان دست

گزینه 4 سوزش سردل

نمایش پاسخ

سوال 19

انتظار می‌رود که مادر باردار با وزن طبیعی قبل از بارداری، در سه ماهه اول بارداری چه مقدار وزن بگیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 ۱ تا ۲ کیلوگرم

گزینه 2 هفته‌ای ۴۰۰ گرم

گزینه 3 ۴ تا ۵ کیلوگرم

گزینه 4 هر ماه یک و نیم کیلوگرم

نمایش پاسخ

سوال 20

سن مناسب بارداری در پایین‌ترین و بالاترین حد به ترتیب چند سالگی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 ۴۰-۱۵

گزینه 2 ۳۸-۱۸

گزینه 3 ۳۸-۱۵

گزینه 4 ۳۵-۱۸

نمایش پاسخ

سوال 21

مبنای محاسبه‌ی سن بارداری چه تاریخی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 آخرین روز آخرین قاعدگی

گزینه 2 اولین روز آخرین قاعدگی

گزینه 3 ۷ روز پس از پایان آخرین قاعدگی

گزینه 4 چهارده روز پس از پایان آخرین قاعدگی

نمایش پاسخ

سوال 22

افزایش وزن طبیعی در دوران بارداری چند کیلوگرم است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 ۹-۸

گزینه 2 ۱۲-۱۰

گزینه 3 ۱۳-۱۲

گزینه 4 ۱۴-۱۳

نمایش پاسخ

سوال 23

خانمی جهت مشاوره‌ی قبل از بارداری مراجعه کرده است. او سیگار می‌کشد و در مورد مصرف گاه‌گاهی الکل سوالاتی می‌پرسد. ذکر کدام مورد در مورد عوارض مصرف سیگار و الکل در بارداری به ترتیب صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 اختلال رشد جنین و جدا شدن جفت- عقب‌ماندگی ذهنی

گزینه 2 آریتمی‌های قلبی- نارسایی عروق رحم و سقط جنین

گزینه 3 بیش فعالی در سن مدرسه- زایمان زودرس

گزینه 4 دیابت بارداری- عقب‌ماندگی ذهنی و زایمان زودرس

نمایش پاسخ

کدامیک از آزمایشات زیر جزء آزمایشات روتین زوجین قبل از ازدواج نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 تالاسمی

گزینه 2 اعتیاد

گزینه 3 سیفلیس

گزینه 4 ایدز

نمایش پاسخ

د

خانم بارداری جهت مراقبت در ماه سوم باردای مراجعه کرده است، وجود کدام عامل زیر نیازمند بررسی پزشکی و رد بیماری خطرناک است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 گرفتگی و ورم پاها

گزینه 2 سردرد مداوم

گزینه 3 تنگی نفس فعالیتی

گزینه 4 تکرر ادرار

نمایش پاسخ

ب. گرفتگی و ورم پاها و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد شایع در بارداری است اما باید به سردردهای مداوم و تب و لرزها توجه کرد.

همه‌ی موارد زیر از شکایات شایع دوران بارداری است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 سوزش سر دل

گزینه 2 تنگی نفس

گزینه 3 تب و لرز

گزینه 4 گرفتگی پاها

نمایش پاسخ

ج. گرفتگی و ورم پاها و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد شایع در بارداری است اما باید به سردردهای مداوم و تب و لرزها توجه کرد.

کدامیک، از آزمایشات قبل از ازدواج نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 CBC برای تشخیص تالاسمی

گزینه 2 تشخیص مبتلایان به سیفلیس

گزینه 3 تشخیص ناقلین HIV

گزینه 4 آزمایشات ادرار برای تشخیص اعتیاد

نمایش پاسخ

ج / آزمایش‌های قبل از ازدواج: سیفلیس / اعتیاد / تالاسمی

کدامیک از علائم خطر حاملگی در خانم‌های باردار است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 حالت تهوع و استفراغ

گزینه 2 سردرد و سرگیجه

گزینه 3 اختلال بینایی

گزینه 4 ورم اندام‌ها

نمایش پاسخ

ج / گرفتگی و ورم پاها و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد شایع در بارداری است اما باید به سردردهای مداوم و تب و لرزها و اختلال بینایی توجه کرد.

در صورت بروز کدامیک از علائم بالینی زیر در یک خانم باردار مراجعه‌ی فوری به مراکز بهداشتی، پزشک یا ماما توصیه می‌شود؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 اختلالات بینایی و تاری دید

گزینه 2 ضعف و سرگیجه

گزینه 3 واریس اندام تحتانی

گزینه 4 سوزش سردل

نمایش پاسخ

الف / گرفتگی و ورم پاها و تنگی نفس فعالیتی و تکرر ادرار و سوزش سر دل از موارد شایع در بارداری است اما باید به سردردهای مداوم و تب و لرزها و اختلال بینایی توجه کرد.

سوال 30

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد تهوع و استفراغ بارداری درست است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 با پیشرفت بارداری، شدت آن افزایش می‌یابد.

گزینه 2 صبح‌ها شدیدتر است ولی ممکن است در طول روز ادامه داشته باشد.

گزینه 3 برای کاهش آن، نوشیدن مایعات خنک همراه با غذا توصیه می‌گردد.

گزینه 4 توصیه می‌شود تعداد وعده‌های غذایی روزانه کاهش یابد.

نمایش پاسخ

ب / تهوع و استفراغ بارداری صبح‌ها شدیدتر است ولی ممکن است در طول روز ادامه داشته باشد. توصیه می‌شود تعداد وعده‌های غذایی روزانه افزایش یابد و با پیشرفت بارداری، شدت آن کاهش می‌یابد.

سوال 31

خانمی در هفته‌ی ۲۷ بارداری با شکایت اجابت مزاج دردناک همراه با سوزش و خارش مقعد مراجعه کرده است. جهت بهبود علائم چه توصیه‌ای به او می‌کنید؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 کمپرس آب گرم

گزینه 2 نوشیدن آب زیاد

گزینه 3 مصرف داروی ملین

گزینه 4 مصرف غذای گوشتی

نمایش پاسخ

ب / برای درمان یبوست در دوران بارداری مصرف داروی ملین ممنوع بوده و بهترین راه حل نوشیدن آب زیاد است.

تغذیه با شیر مادر

تعداد سوال: ۷۷

درجه سختی: آسان

نکات: ۱-لاکتوز در شیر مادر و پروتئین و کازین و مواد معدنی در شیر خشک بیشتر است

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

شروع رفلکس شیر با کدامیک از موارد زیر پیش می‌آید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 تولید لاکتوباسیلوس

گزینه 2 ترشح پرولاکتین

گزینه 3 ترشح اکسی‌توسین

گزینه 4 مکیدن نوک‌پستان

نمایش پاسخ

د

سوال 2

خانمی که دو روز پیش زایمان کرده است، از بی‌شیری و نرم و خالی بودن پستان شاکی است. چه توصیه‌ای دارید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 مطمئن نمودن مادر از طبیعی بودن این حالت

گزینه 2 توصیه به مصرف شیرخشک برای دو روز و با قاشق چای‌خوری

گزینه 3 توصیه به مصرف سرم قندی برای دو روز و با قاشق چای‌خوری

گزینه 4 توصیه به مصرف سرم قندی – نمکی برای دو روز و با قاشق چای‌خوری

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

در مقایسه‌ی شیر مادر و شیر گاو کدام عبارت صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 شیرهای حیوانی پروتئین کم‌تری نسبت به شیر مادر دارند.

گزینه 2 قسمت اعظم شیر گاو آلفا لاکتالبومین است.

گزینه 3 قسمت اعظم شیر مادر کارژنین است.

گزینه 4 اسیدهای چرب ضروری در شیر مادر بیش از شیر گاو است.

نمایش پاسخ

د

سوال 4

کدام گزینه در خصوص شیر مادر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 شیر مادر بیش‌ترین مقدار لاکتوز را نسبت به سایر شیرها دارد.

گزینه 2 بجز در آب و هوای گرم، شیر مادرخواران در ۶-۴ ماه اول نیاز به آب اضافی ندارند.

گزینه 3 مواد معدنی موجود در شیر مادر نسبت به شیر گاو بیش‌تر است.

گزینه 4 تغذیه‌ی شیرخوار با شیر مادر سبب افزایش کم‌خونی در مادر می‌گردد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 5

کدامیک یک از گزینه‌های زیر در خصوص تفاوت شیر مادر و شیرهای حیوانی، صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 شیرهای حیوانی پروتئین کم‌تری نسبت به شیر مادر دارند.

گزینه 2 شیرهای حیوانی اسید فولیک بیش‌تری نسبت به شیر مادر دارند.

گزینه 3 شیرهای حیوانی لاکتوز کم‌تری نسبت به شیر مادر دارند.

گزینه 4 شیرهای حیوانی املاح کم‌تری نسبت به شیر مادر دارند.

نمایش پاسخ

ج

سوال 6

مهم‌ترین پروتئین و چربی شیر مادر به ترتیب کدامند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 کارژین- تریگلیسیرید

گزینه 2 آلفالاکتالبومین- تریگلیسیرید

گزینه 3 کارژین-کلسترول

گزینه 4 آلفالاکتالبومین- کلسترول

نمایش پاسخ

ب

سوال 7

در مورد شیر مادر کدام گزینه درست است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 کارژین، پروتئین عمده‌ی شیر مادر است.

گزینه 2 لاکتوز شیر مادر کم است.

گزینه 3 مقدار ویتامین D شیر مادر زیاد است.

گزینه 4 تری گلیسیرید مهم‌ترین چربی شیر مادر است.

نمایش پاسخ

د

سوال 8

همه‌ی عبارات ذیل در مورد پروتئین شیر مادر صحیح است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 قسمت اعظم آن کارژین است.

گزینه 2 مقدار آن نسبت به شیرهای حیوانی کم‌تر است.

گزینه 3 نوعی آلفا لاکتالبومین است.

گزینه 4 هضم آن آسان‌تر است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 9

کدامیک در شیر مادر نسبت به سایر شیرها (شیرهای حیوانی) بیش‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 لاکتوز

گزینه 2 پروتئین

گزینه 3 ویتامین د

گزینه 4 آهن

نمایش پاسخ

سوال 10

کدامیک از مواد و ویتامین‌های زیر در شیر مادر نسبت به سایر پستانداران بیش‌تر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 Folic Acid

گزینه 2 B12

گزینه 3 B1

گزینه 4 K

نمایش پاسخ

سوال 11

مهم‌ترین تفاوت شیر گاو با شیر مادر که استفاده از آن را در ماه‌های اول تولد دشوار می‌سازد، اضافه دریافت کدامیک از مواد مغذی زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 کالری و آهن

گزینه 2 کازئین و املاح

گزینه 3 روی و لاکتالبومین

گزینه 4 ویتامین A و آهن

نمایش پاسخ

سوال 12

کدامیک از موارد زیر تنها در شیر مادر وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان/پزشکی شهریور ۹۳_قطب اصفهان)

گزینه 1 آلفا لاکتالبومین

گزینه 2 کازئین

گزینه 3 آنزیم لیپاز

گزینه 4 اسید فولیک

نمایش پاسخ

سوال 13

عبارت زیر در تعریف کدامیک از انواع شیر مادر که ذکر شده است است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)
«شیر آبدکی و اغلب بی‌رنگ که حاوی مقدار زیاد پروتئین و آب و لاکتوز است و چربی کم‌تری دارد»

گزینه 1 کلستروم یا آغوز

گزینه 2 Hind Milk

گزینه 3 Fore Milk

گزینه 4 Mature Milk

نمایش پاسخ

سوال 14

کدامیک از موارد زیر در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 قندلاکتوز

گزینه 2 سدیم

گزینه 3 کلسیم

گزینه 4 فسفر

نمایش پاسخ

سوال 15

در مورد ترکیبات شیر مادر کدام گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 در شیر مادر پروتئین کازئین وجود ندارد.

گزینه 2 پروتئین عمده‌ی شیر مادر آلفا لاکتالبومین است.

گزینه 3 شیر مادر کم‌ترین لاکتوز را در بین شیرها دارد.

گزینه 4 مقدار ویتامین‌های شیر مادر از شیر گاو بیش‌تر است.

نمایش پاسخ

سوال 16

مهم ترین چربی شیر مادر کدام است؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 تری گلیسیرید

گزینه 2 کلسترول

گزینه 3 HDL

گزینه 4 LDL

نمایش پاسخ

الف

سوال 17

غلظت کدامیک در شیر انسان کم تر از شیر سایر پستانداران است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 نیاسین

گزینه 2 اسید فولیک

گزینه 3 ویتامین B12

گزینه 4 اسید اسکوربیک

نمایش پاسخ

ج

سوال 18

کدامیک از ویژگی های Fore milk نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 بی رنگ و آبکی

گزینه 2 غنی از انرژی

گزینه 3 حاوی مقادیر زیادی پروتئین

گزینه 4 حاوی مقادیر زیادی لاکتوز

نمایش پاسخ

ب

سوال 19

شیر آغوز یا کلستروم نسبت به شیر بعدی مادر چه تفاوت هایی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 چربی بیش تر- پروتئین کم تر

گزینه 2 پروتئین بیش تر- چربی کم تر

گزینه 3 پروتئین و چربی بیش تر

گزینه 4 پروتئین و چربی کم تر

نمایش پاسخ

ب

سوال 20

کدام مورد زیر در مورد ویژگی های شیر مادر نادرست است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان/پزشکی شهریور ۹۷ _ قطب همدان)

گزینه 1 کلستروم نسبت به شیر معمولی مادر دارای چربی بیش تری است.

گزینه 2 شیر مادر دارای لیزوزیم کشنده ی باکتری است.

گزینه 3 شیر مادر کم تر از شیر گاو دارای مواد معدنی است.

گزینه 4 در طول زمان ترکیبات شیر مادر متغیر است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 21

کدامیک از موارد زیر در شیر گاو بیش تر از شیر انسان است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان/پزشکی اردیبهشت ۹۷ _ میان دوره کشوری)

گزینه 1 لاکتوز

گزینه 2 پروتئین

گزینه 3 اسیدهای چرب ضروری

گزینه 4 عوامل دفاعی

نمایش پاسخ

ب

سوال 22

کدام ایمنوگلوبولین در شیر مادر در پیشگیری از عفونت‌ها نقش مهم‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان/پزشکی اسفند ۹۴ _قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 IgE

گزینه 2 IgG

گزینه 3 IgM

گزینه 4 IgA

نمایش پاسخ

د

سوال 23

کدامیک از ورود باکتری‌ها و ویروس‌ها به بافت روده‌ی شیرخوار جلوگیری می‌کند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 IgG

گزینه 2 IgA

گزینه 3 IgM

گزینه 4 فاکتور بیفیدوس

نمایش پاسخ

ب

سوال 24

کدامیک از فاکتورهای موجود در شیر مادر از طریق اتصال به آهن از رشد باکتری‌ها پیشگیری می‌نماید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 ایمنوگلوبولین A

گزینه 2 لیزوزیم

گزینه 3 فاکتور بیفیدوس

گزینه 4 لاکتوفرین

نمایش پاسخ

د

سوال 25

گزینه‌ی صحیح در مقایسه‌ی شیر مادر با شیر گاو کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ویتامین‌های C و A در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است.

گزینه 2 آهن موجود در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است.

گزینه 3 لاکتوز و چربی شیر گاو بالاتر از شیر مادر است.

گزینه 4 میزان انرژی تولید شده توسط شیر مادر بسیار بالاتر از شیرگاو است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 26

همه‌ی موارد زیر در مورد شیر مادر صحیح است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۵ و دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 میزان املاح آن بیش‌تر از شیر گاو است.

گزینه 2 نسبت کلسیم به فسفر در آن ۲ به ۱ است.

گزینه 3 ویتامین K در آن ناچیز است.

گزینه 4 قند آن لاکتوز است که بیش‌تر از شیر گاو است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 27

شیر مادر همه‌ی جنبه‌های ایمونولوژیک زیر را دارا است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 لاکتوفرین

گزینه 2 لاکتالبومین

گزینه 3 فاکتور پیفیدوس

گزینه 4 IgA

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

نحوه‌ی شیردهی مادران در زمان مصرف داروها چگونه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 در زمان مصرف همه‌ی داروها، ممنوع است.

گزینه 2 در زمان مصرف مسکن‌های ساده و اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها، مشکلی ندارد.

گزینه 3 در زمان مصرف داروهای ضد سرطان، بلامانع است.

گزینه 4 در زمان مصرف داروهای ضد سرطان و آنتی‌بیوتیک با نظر پزشک، بلامانع است.

نمایش پاسخ

ب

سوال 29

تمام موارد زیر در شیر مادر کم‌تر از شیر گاو است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- مشترک کشوری / دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری / دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 کلسیم

گزینه 2 کارژنین

گزینه 3 پروتئین

گزینه 4 لاکتوز

نمایش پاسخ

د

سوال 30

کدامیک از مزایای تغذیه با شیر مادر نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر می‌کند.

گزینه 2 احتمال بروز اسهال در شیر مادرخواران کم‌تر است.

گزینه 3 جذب کلسیم شیر مادر کم‌تر است.

گزینه 4 آغوز حاوی مواد مفید ارزنده ایمنی است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 31

کدامیک از گزینه‌های زیر برای تداوم تغذیه با شیر مادر بیش‌تر مؤثر است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 بهتر است مادر از اشتغال در خارج از خانه خودداری نماید.

گزینه 2 تنظیم برنامه هر ۴-۳ ساعت یک بار توصیه می‌شود.

گزینه 3 بعد از هر بار شیردهی، پستان مادر با آب ساده شسته شود.

گزینه 4 طول مدت شیرخواری باید مطابق میل شیرخوار باشد.

نمایش پاسخ

د

سوال 32

تمام موارد زیر درباره‌ی تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر صحیح است بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۴ _ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر از لحظه‌ی تولد تا پایان یک سالگی تمام نیازهای شیرخوار را به تنهایی تأمین می‌کند.

گزینه 2 ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار تغییر می‌کند.

گزینه 3 چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از چربی و پروتئین شیرهای دیگر هضم و جذب می‌شود.

گزینه 4 در تغذیه‌ی انحصاری و مکرر شیر مادر، حاملگی‌های زودرس کم‌تر اتفاق می‌افتد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 33

تمام موارد زیر درباره‌ی تغذیه‌ی کودک با شیر مادر صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۳ و ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 برگشت رحم به حالت طبیعی را سرعت می‌بخشد.

گزینه 2 از دست دادن وزن اضافی مادر را تسریع می‌نماید.

گزینه 3 ترکیب شیر مادر با رشد شیرخوار تغییر می‌یابد.

گزینه 4 امکان تخمک‌گذاری مادر را سرعت می‌بخشد.

نمایش پاسخ

د

سوال 34

تمام موارد زیر در باره‌ی مزایای شیر مادر صحیح است، بجز: (پزشکی شهریور و اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 شیر مادر به آسانی هضم و تقریباً به طور کامل جذب می‌شود.

گزینه 2 ترکیب شیر مادر متناسب با سن کودک، فصل و ساعات شبانه‌روز تغییر می‌کند.

گزینه 3 شیر مادر به تنهایی نیازهای شیرخوار را در ۱۲ ماه نخست زندگی تأمین می‌کند.

گزینه 4 شیر مادر از ابتدای کودک به بیماری‌های مختلف پیشگیری می‌کند.

نمایش پاسخ

ج

سوال 35

در تغذیه‌ی کمکی، شروع مصرف تکه‌های کوچک میوه و نان برای شیرخواران طبیعی از اواخر کدام ماه توصیه شده است؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 ماه ششم

گزینه 2 ماه هفتم

گزینه 3 ماه هشتم

گزینه 4 ماه نهم

نمایش پاسخ

ج

سوال 36

همه‌ی موارد جزء مزایای شیر مادر است بجز: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 شیر مادر به تنهایی تا پایان ۸ ماهگی تمام نیازهای غذایی شیرخوار را تأمین می‌کند.

گزینه 2 شیرخوار پرخوری نمی‌کند و کم‌تر چاق می‌شود

گزینه 3 نسبت به سایر شیرها جذب کلسیم شیر مادر بهتر انجام می‌شود.

گزینه 4 نسبت به سایر شیرها جذب چربی و پروتئین شیر مادر بهتر انجام می‌شود.

نمایش پاسخ

الف

سوال 37

مهم‌ترین محرک ترشح شیر مادر کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 خالی کردن منظم و کامل پستان‌ها

گزینه 2 تغذیه‌ی مناسب مادر

گزینه 3 تنظیم برنامه‌ی شیردهی

گزینه 4 مصرف مایعات و آب میوه

نمایش پاسخ

الف

سوال 38

علت اصلی شروع تغذیه با شیر مادر در اولین ساعت زندگی چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 نیاز تغذیه‌ای نوزاد

گزینه 2 گرم کردن نوزاد

گزینه 3 هوشیار بودن نوزاد

گزینه 4 تحریک تولید شیر

نمایش پاسخ

د

سوال 39

کدامیک از موارد زیر به عنوان نکته‌ی کلیدی و مهم در تغذیه با شیر مادر محسوب نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 تغذیه از هر دو پستان در هفته‌های اول تولد در هر وعده‌ی شیردهی توصیه می‌شود.

گزینه 2 تنظیم برنامه‌ی دقیق (مثلاً هر ۴-۳ ساعت) شیردهی موجب افزایش شیر مادر و بهبود شیردهی می‌شود.

گزینه 3 طول مدت و فواصل شیر خوردن شیرخوار باید مطابق میل و دلخواه او تنظیم شود.

گزینه 4 پس از خاتمه‌ی شیردهی بهتر است یک قطره شیر مادر روی نوک پستان مادر گذاشته شود و نیازی به شستشوی پستان نیست.

نمایش پاسخ

ب

سوال 40

شاخص قضاوت در مورد کافی بودن شیر مادر کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 شیردهی موفق خویشاوندان

گزینه 2 گریه و بی‌قراری نوزاد

گزینه 3 وزن‌گیری مطلوب نوزاد

گزینه 4 مکیدن انگشت توسط نوزاد

نمایش پاسخ

ج

سوال 41

شاخص ناکافی بودن شیر مادر کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 گریه و بی‌قراری شیرخوار

گزینه 2 تقاضای مکرر برای شیر خوردن

گزینه 3 وزن‌گیری کم شیرخوار

گزینه 4 مکیدن انگشتان

نمایش پاسخ

ج

سوال 42

مادر شیرخوار سالم ۴ ماهه‌ای از ناکافی بودن شیر خود شاکی است و اظهار می‌کند که شیرخوارش سیر نمی‌شود و تقاضای تجویز شیر خشک دارد. کدام معیار زیر دلیل ناکافی بودن شیر مادر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 ثابت ماندن وزن نسبت به ماه قبل

گزینه 2 تقاضای مکرر برای شیر خوردن

گزینه 3 کم‌خوابی

گزینه 4 بی‌قراری

نمایش پاسخ

الف

سوال 43

مادری به مرکز بهداشت مراجعه نموده و اظهار می‌کند چون کودکش مکرر تقاضای شیر دارد و بی‌قرار است، شیرش کافی نیست. اولین اقدام شما چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 معاینه‌ی مادر از نظر سایز پستان

گزینه 2 معاینه‌ی کودک از نظر مشکلات آناتومیکی

گزینه 3 توزین کودک

گزینه 4 تجویز شیر کمکی

نمایش پاسخ

ج

سوال 44

شیر مادر خارج از یخچال تا چند ساعت قابل نگهداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۸

گزینه 2 ۲

گزینه 3 ۴

گزینه 4 ۶

نمایش پاسخ

الف

سوال 45

شیر مادر و پس از دوشیده شدن تا چند ساعت در یخچال قابل نگهداری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 ۱۲

گزینه 2 ۲۴

گزینه 3 ۳۶

گزینه 4 ۴۸

نمایش پاسخ

ب

سوال 46

تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر (EBF) کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 مصرف شیر مادر در ۶ ماه اول همراه آب جوشانده

گزینه 2 مصرف شیر مادر ۶ ماه اول (فقط شیر مادر و داروها)

گزینه 3 مصرف شیر مادر ۲ ماه اول همراه آب جوشانده

گزینه 4 مصرف شیر مادر ۲ ماه اول (فقط شیر مادر و داروها)

نمایش پاسخ

د

سوال 47

کدامیک از جملات زیر در مورد مصرف داروها در زمان شیردهی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 مصرف داروهای مسکن در زمان شیردهی در هر حالتی برای مادر ممنوع است.

گزینه 2 اگر مصرف داروهای مسکن برای مادر ضروری است شیردهی باید متوقف شود.

گزینه 3 مصرف داروهای ضد سرطان در زمان شیردهی به دلیل اهمیت بیماری مادر مانعی ندارد.

گزینه 4 مصرف داروهای مسکن در صورت ضرورت با نظر پزشک به مقدار معمولی مانعی ندارد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 48

بهترین معیار برای کافی بودن شیر مادر چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 بیدار نشدن کودک ۲ ساعت پس از خوردن شیر

گزینه 2 چاق بودن کودک

گزینه 3 سیر پیشرونده‌ی منحنی رشد موازی با محور صدک‌ها

گزینه 4 بیمار نشدن کودک طی ۶ ماه اول

نمایش پاسخ

ج

سوال 49

مطالعات نشان داده‌اند که شیر مادر حاوی فاکتورهای رشد است. کدام گزینه در مورد این فاکتور صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 در تکامل نوزاد مؤثر است و با افزایش سن افزایش می‌یابد

گزینه 2 موجب تکامل مخاط روده‌ی شیرخوار می‌شود و در آغوز بیش‌ترین غلظت را دارد

گزینه 3 در جذب آهن شیر مادر نقش مهمی دارد

گزینه 4 در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیکی و قلبی عروقی در بزرگسالی نقش دارد

نمایش پاسخ

ب

سوال 50

شیر انسان در مقایسه با شیر گاو کدام مزیت را دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶ و دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- - قطب اهواز)

گزینه 1 چربی بیش‌تر

گزینه 2 پروتئین بیش‌تر

گزینه 3 املاح بیش‌تر

گزینه 4 لاکتوز بیش‌تر

نمایش پاسخ

د

سوال 51

کدامیک از مزایای شیر مادر نییست؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 افزایش جذب آهن در نوزادانی که شیر مادر خورده‌اند، نسبت به نوزادان تغذیه شده با شیرخشک

گزینه 2 افزایش وزن نوزادانی که شیر مادر خورده‌اند، نسبت به نوزادان تغذیه شده با شیرخشک

گزینه 3 کاهش آگزا در نوزادانی که شیر مادر خورده‌اند، نسبت به نوزادان تغذیه شده با شیرخشک

گزینه 4 کاهش جمع شدن گاز و استفراغ در نوزدانی که شیر مادر خورده‌اند، نسبت به نوزادان تغذیه شده با شیرخشک

نمایش پاسخ

ب

سوال 52

جمله‌ی صحیح کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 جذب کلسیم شیر مادر به دلیل کمبود میزان روی در شیر مادر بالاتر است

گزینه 2 جذب کلسیم شیر مادر پایین ولی میزان ویتامین D آن بالاتر از سایر پستانداران است

گزینه 3 جذب کلسیم شیر مادر به دلیل نسبت بالای کلسیم به فسفر بیش‌تر از شیر سایر پستانداران است

گزینه 4 کلسیم و ویتامین D در شیر مادر بیش‌تر از سایر پستانداران است

نمایش پاسخ

سوال 53

تمام موارد زیر در شیر گاو از شیر مادر بیش‌تر است_بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 ترکیبات معدنی

گزینه 2 پروتئین‌ها

گزینه 3 کازئین

گزینه 4 کربوهیدرات‌ها

نمایش پاسخ

د

سوال 54

کدامیک جزء مزایای شیر مادر نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 کاهش ابتلا به آسم در نوزاد

گزینه 2 کاهش امکان تخمک‌گذاری و حاملگی زودرس

گزینه 3 کاهش وزن در کودک

گزینه 4 افزایش دلبستگی مادر و فرزند

نمایش پاسخ

ج

سوال 55

از گزینه‌های زیر کدام مورد در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می‌کنند در مقایسه با شیرخواران مصرف کننده‌ی شیرخشک، کم‌تر گزارش شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

۱- راش و سوختگی تناسلی ۲- جذب آهن ۳- چاقی ۴- اگزما

گزینه 1 ۱ و ۳ و ۴

گزینه 2 ۲ و ۴

گزینه 3 ۲ و ۳

گزینه 4 ۲ و ۱ و ۴

نمایش پاسخ

الف

سوال 56

علت اصلی شروع تغذیه‌ی نوزاد از سینه‌ی مادر در ساعت اول تولد کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 افزایش ترشح شیر مادر

گزینه 2 هوشیاری نوزاد در بدو تولد

گزینه 3 استحکام رابطه‌ی عاطفی روانی

گزینه 4 کاهش خون‌ریزی در مادر

نمایش پاسخ

الف

سوال 57

به مادری که در روزهای اول بعد از زایمان با شکایت حجم کم شیر و خالی بودن پستان به شما مراجعه می‌کند چه توصیه‌ای می‌نمایید؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 ارجاع به متخصص جهت بررسی بیش‌تر

گزینه 2 آزمایش جهت بررسی رفلکس‌های شیردهی

گزینه 3 توصیه به تغذیه با شیر مصنوعی تا رفع مشکل

گزینه 4 توضیح طبیعی بودن این حالت و رفع نگرانی

نمایش پاسخ

د

سوال 58

در مورد تغذیه با شیر مادر همه‌ی گزینه‌ها صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 شیر مادرخواران در ۶- ۴ ماه اول نیاز به آب اضافی حتی در آب و هوای گرم ندارند

گزینه 2 غلظت نیاسین، اسید فولیک و اسید اسکوربیک غالباً در شیر انسان بیش‌تر از سایر پستانداران است

گزینه 3 شیر مادر پروتئین بیش‌تری نسبت به شیرهای حیوانی دارد

گزینه 4 هم اتاقی مادر و نوزاد بروز عفونت و همه‌گیر شدن آن در سن نوزادی را کم‌تر می‌کند

کدامیک از موارد زیر از مزایای مربوط به تغذیه‌ی کودک با شیر مادر نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 ایمنی بیش‌تری در کودک نسبت به شیر مصنوعی ایجاد می‌کند

گزینه 2 ابتلا به آسم و آلرژی نسبت به شیر مصنوعی کم‌تر است

گزینه 3 چاقی و اضافه وزن نسبت به شیر مصنوعی بیش‌تر است

گزینه 4 شیر مادر پاکیزه و دارای درجه حرارت مناسب است

در مقایسه‌ی شیر مادر با شیر گاو، کدام گزینه درست است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 مواد معدنی در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است

گزینه 2 لاکتوز شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است

گزینه 3 شیر مادر حاوی آنزیم لیپاز است

گزینه 4 کارئین شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است

کدامیک از موارد زیر در مقایسه‌ی ترکیب شیر مادر با شیر گاو صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 بخش عمده‌ی پروتئین شیر مادر، کارئین است.

گزینه 2 مقدار پروتئین شیر مادر از شیر گاو بیش‌تر است.

گزینه 3 مقادیر مواد معدنی شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است.

گزینه 4 کربوهیدرات‌های شیر مادر از شیر گاو بیش‌تر است.

کدامیک از مواد موجود در شیر مادر برای رشد مغز و سلامت عروق خونی نوزاد اهمیت بیش‌تری دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 تری گلیسرید

گزینه 2 اسید چرب

گزینه 3 لاکتوز

گزینه 4 ایمنوگلوبولین

بهترین معیار برای کافی بودن شیر مادر کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 چاق بودن کودک

گزینه 2 بیمار نشدن کودک طی ۶ ماه

گزینه 3 سیر پیشرونده‌ی منحنی رشد با محور صدک‌ها

گزینه 4 بیمار نشدن کودک ۲ ساعت پس از خوردن شیر

کدام مورد جزء مزایای ثابت شده شیردهی، برای مادران است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 کاهش حوادث قلبی عروقی، کاهش سوءتغذیه

گزینه 2 جلوگیری از کم‌خونی، ابتلا کم‌تر به سرطان تخمدان

گزینه 3 ابتلا کم‌تر به سرطان پستان، جلوگیری از دیابت

گزینه 4 ابتلا کم‌تر به سرطان رحم و آندومتر، جلوگیری از کم‌خونی

ب. شیردهی ریسک ابتلا کم‌تر به سرطان تخمدان و همچنین سرطان پستان را کم می‌کند و از کم‌خونی مادر جلوگیری می‌کند.

کدام نوع شیر مادر دارای چربی کم تر و فاکتور رشد بیش تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اصفهان، تهران و اصفهان)

گزینه 1 Fore milk

گزینه 2 کلس

گزینه 3 Hind milk

گزینه 4 شیر رسیده

نمایش پاسخ

ب. کلستروم نسبت به شیر عادی چربی کم تر و پروتئین بیش تری دارد اما Hind milk سه برابر بیش تر از Fore milk چربی دارد.

رفلکس اکسی‌توسین در شیردهی با شیر مادر، در کدام مورد نقش ندارد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 تولید و ترشح شیر

گزینه 2 جهش و جاری شدن شیر

گزینه 3 انقباض عضله‌ی رحم و کنترل خون‌ریزی

گزینه 4 آزادسازی جفت

نمایش پاسخ

الف. رفلکس اکسی‌توسین در ترشح شیر نقش دارد نه تولید آن.

برای یک مادر ۲۸ ساله‌ای که ۳۰ هفته باردار است در یک جلسه در مورد شیردهی با شیر مادر آموزش می‌دهید. کدام مورد را توصیه می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 شستن پستان با صابون و الکل

گزینه 2 شیردهی به صورت متناوب از پستان‌ها

گزینه 3 شروع شیردهی بلافاصله بعد از ترخیص از بیمارستان

گزینه 4 دادن آب به نوزاد در مناطق بسیار گرم

نمایش پاسخ

ب. شیردهی از پستان‌ها باید به صورت مستمر صورت بگیرد.

در مقایسه‌ی ارزش غذایی شیر مادر با شیر سایر پستانداران کدام گزینه صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 بالاتر بودن میزان ویتامین C شیر مادر

گزینه 2 کم تر بودن میزان لاکتوز شیر مادر

گزینه 3 بالاتر بودن کازئین شیر مادر

گزینه 4 بالاتر بودن میزان پروتئین شیر مادر

نمایش پاسخ

الف / شیر سایر پستانداران پروتئین بیش تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین C بیش تری دارد.

کدام عبارت جنبه‌ی تغذیه‌ای شیر مادر را در مقایسه با شیر گاو به درستی بیان می‌کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 بیش تر بودن قابلیت جذب ویتامین D شیر گاو نسبت به شیر مادر

گزینه 2 بیش تر بودن پروتئین شیر گاو نسبت به شیر مادر

گزینه 3 بیش تر بودن اسید چرب اشباع نشده‌ی شیر گاو نسبت به شیر مادر

گزینه 4 بیش تر بودن لاکتوز شیر گاو نسبت به شیر مادر

نمایش پاسخ

ب / شیر سایر پستانداران پروتئین بیش تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین C بیش تری دارد.

تمام ترکیبات زیر در شیر مادر بیش تر از شیر گاو است، بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 ویتامین

گزینه 2 اسیدهای چرب ضروری

گزینه 3 پروتئین

گزینه 4 لاکتوز

نمایش پاسخ

ج / شیر سایر پستانداران پروتئین بیش تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین C بیش تری دارد.

اولین تغذیه‌ی نوزاد ترم و سالم که به روش سزارین متولد شده است، باید با..... باشد. (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 سایر مایعات و بعد از بهبود درد با شیر مادر

گزینه 2 شیر مادر و بعد از به هوش آمدن مادر

گزینه 3 شیرخشک و بعد از ۶- ۴ ساعت با شیر مادر

گزینه 4 شیر مادر و بلافاصله بعد از سزارین

نمایش پاسخ

ب / مادر باید بلافاصله بعد از به هوش آمدن به نوزاد خود شیر بدهد.

سوال 72

خانم کارمندی جهت تغذیه‌ی کودک شیرخوار، شیر خود را می‌دوشد. شیر دوشیده شده حداکثر تا چه مدت در یخچال قابل نگهداری است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 ۸ ساعت

گزینه 2 ۱ روز

گزینه 3 ۱ هفته

گزینه 4 ۳ ماه

نمایش پاسخ

ب / شیر دوشیده شده حداکثر تا یک روز در یخچال و ۳ ماه در فریزرهای خانگی قابل نگهداری است.

سوال 73

کدامیک از عوامل ایمنولوژیک شیر مادر، پرزهای روده‌ی شیرخوار را پوشانده و از ورود باکتری‌ها و ویروس‌ها به بافت جلوگیری می‌نماید؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 فاکتور بیفیدوس

گزینه 2 لاکتوفرین

گزینه 3 ایمنوگلوبولین A

گزینه 4 لیزوزیم

نمایش پاسخ

ج / ایمنوگلوبولین A پرزهای روده‌ی شیرخوار را پوشانده و از ورود باکتری‌ها و ویروس‌ها به بافت جلوگیری می‌نماید.

سوال 74

کدام مورد درباره‌ی شیر مادر صحیح نیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 تغذیه‌ی انحصاری نوزاد با شیر مادر تا ۹۸% اثر پیشگیری از بارداری دارد.

گزینه 2 باعث کاهش بروز سرطان پستان در مادر می‌شود.

گزینه 3 لاکتوفرین موجود در آن باعث کاهش بروز عفونت در نوزادان می‌شود.

گزینه 4 شیردهی اثر حفاظتی در برابر استئوپروز دارد.

نمایش پاسخ

د / شیردهی می‌تواند باعث استئوپروز شود.

سوال 75

کدام ترکیب در شیر مادر کم‌تر از شیر گاو وجود دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اصفهان)

گزینه 1 لاکتوز

گزینه 2 پروتئین

گزینه 3 لیپاز

گزینه 4 ویتامین C

نمایش پاسخ

ب / شیر سایر پستانداران پروتئین بیش‌تری دارد اما شیر مادر لاکتوز و ویتامین C بیش‌تری دارد.

سوال 76

تمام موارد زیر در شیر مادر بیش‌تر از شیر گاو است، بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 کارژنین

گزینه 2 لاکتالبومین

گزینه 3 لاکتوز

گزینه 4 ایمونوگلوبولین

نمایش پاسخ

الف

سوال 77

کدامیک از موارد زیر در شیر مادر کم‌تر از شیر گاو است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان)

گزینه 1 اسیدهای چرب ضروری

گزینه 2 کارئین

گزینه 3 نیاسین

گزینه 4 ویتامین C

نمایش پاسخ

ب

رشد و نمو کودکان و بلوغ

تعدادسوال: ۱۰۹

درجه سختی : متوسط

نکات:۱-در ۱۰-۱۱ماهگی شیر خوار بدون کمک می ایستد

۲-کودک در ۹-۱۰ ماهگی اشیا را از این دست به ان دست میدهد

۳- موارد لزوم مراجعه به پزشک در رابطه با بلوغ بسیار پر تکرار است

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

اولین تکامل حرکتی در شیرخواران چیست و در چه سنی ظاهر می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 راست نگهداشتن سر- سه ماهگی

گزینه 2 سینه‌خیز رفتن- سه ماهگی

گزینه 3 با کمک نشستن- چهار تا پنج ماهگی

گزینه 4 چرخاندن سر- دو ماهگی

نمایش پاسخ

الف

سوال 2

به طور معمول یک کودک در چه سنی «بدون کمک» می‌ایستد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 ۸- ۶ ماهگی

گزینه 2 ۱۱- ۱۰ ماهگی

گزینه 3 ۱۴- ۱۲ ماهگی

گزینه 4 ۲۱- ۱۸ ماهگی

نمایش پاسخ

ب

سوال 3

شیرخواری قادر است بدون کمک بایستد، نخستین کلمات را بر زبان جاری کند و برای بلند کردن اشیاء از انگشتان شست و اشاره استفاده کند. سن تقریبی او چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 ۱۴-۱۲ ماهه

گزینه 2 ۱۱-۱۰ ماهه

گزینه 3 ۱۰-۹ ماهه

گزینه 4 ۱۲-۱۱ ماهه

نمایش پاسخ

ب

سوال 4

کودکی قادر است تا بدون کمک بایستد، اشیاء را رها کرده و برای بلند کردن آن‌ها از شصت و انگشت اشاره استفاده کند. سن تقریبی او چقدر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 ۱۴-۱۳ ماهه

گزینه 2 ۱۲-۱۱ ماهه

گزینه 3 ۱۰-۹ ماهه

گزینه 4 ۱۰-۱۱ ماهه

نمایش پاسخ

د

سوال 5

انتظار می‌رود کودک در سن ۹-۱۰ ماهگی قادر به انجام کدامیک از موارد زیر باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 ایستادن بدون کم

گزینه 2 رها کردن اشیاء

گزینه 3 گذاشتن دو مکعب روی هم

گزینه 4 بلند کردن اشیاء با استفاده از شصت و انگشت اشاره

نمایش پاسخ

ب

سوال 6

کودک در چند ماهگی بدون کمک می‌ایستد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 ۱۰-۱۱

گزینه 2 ۱۱-۱۲

گزینه 3 ۱۲-۱۳

گزینه 4 ۱۳-۱۴

نمایش پاسخ

الف

سوال 7

در چه سنی کودک از بیگانه‌ها غریبی می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 ۴-۵

گزینه 2 ۶-۸

گزینه 3 ۹-۱۰

گزینه 4 ۱۰-۱۱

نمایش پاسخ

ج

سوال 8

کودکی که اشیاء را از این دست به آن دست می‌کند و می‌تواند اشیاء را رها کند، از بیگانه‌ها غریبی می‌کند و سینه‌خیز می‌رود چند ماهه است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 ۴-۵

گزینه 2 ۹-۱۰

گزینه 3 ۲-۳

گزینه 4 ۶-۸

نمایش پاسخ

ب

سوال 9

از نظر مراحل تکاملی کودک، کودکی که بدون کمک می‌ایستد، نخستین کلمات را بر زبان جاری می‌کند و برای بلند کردن اشیاء از شصت و انگشت نشانه استفاده می‌کند، حداقل در چه سنی قرار دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 ۱۸-۲۱ ماهگی

گزینه 2 ۱۲-۱۴ ماهگی

گزینه 3 ۶-۸ ماهگی

گزینه 4 ۱۰-۱۱ ماهگی

نمایش پاسخ

د

سوال 10

کودکی قادر است بدود، و تیله‌ای را از داخل شیشه مرباخوری خارج کند و دستورات دو مرحله‌ی آب را بفهمد. این کودک در چه سنی است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 ۲۴ تا ۳۶ ماهگی

گزینه 2 ۱۲ تا ۱۸ ماهگی

گزینه 3 تا ۲۱ ماهگی

گزینه 4 تا ۱۸ ماهگی

نمایش پاسخ

د

سوال 11

در چند ماهگی کودک از نظر تکامل شخصی- اجتماعی، از بیگانه‌ها غریبی می‌کند؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 ۴-۵

گزینه 2 ۶-۸

گزینه 3 ۹-۱۰

گزینه 4 ۱۱-۱۲

نمایش پاسخ

ج

سوال 12

کودکی که بدون کمک می‌ایستد و چند کلمه به زبان می‌آورد حدوداً چند ماهه است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شهیدبهبشتی)

گزینه 1 ۷-۸

گزینه 2 ۹-۱۰

گزینه 3 ۱۱-۱۳

گزینه 4 ۱۳-۱۴

نمایش پاسخ

ج

سوال 13

وزن کودکی در زمان تولد ۲۸۰۰ گرم بوده و در دو سالگی ۱۲ کیلوگرم شده است. درباره‌ی رشد او اظهار نظر کنید. (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 رشد طبیعی داشته است.

گزینه 2 رشد کم‌تر از حد انتظار داشته است.

گزینه 3 رشد او بیش از حد طبیعی بوده است.

گزینه 4 نمی‌توان اظهار نظر کرد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 14

وزن یک شیرخوار در چند ماهگی حدود دو برابر وزن تولدش می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 ۳

گزینه 2 ۵

گزینه 3 ۷

گزینه 4 ۹

نمایش پاسخ

ب

سوال 15

کدام شاخص زیر از بهترین شاخص‌های رشد کودکان به حساب می‌آید؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 وزن به سن

گزینه 2 قد به سن

گزینه 3 دورکمر به قد

گزینه 4 دورسر به قد

نمایش پاسخ

الف

سوال 16

وزن کودک در بدو تولد ۳/۵ کیلوگرم است. وزن این کودک در ۵ ماهگی و ۲ سالگی به ترتیب از راست به چپ چند کیلوگرم خواهد شد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 ۶ - ۱۰/۵

گزینه 2 ۱۴ - ۶

گزینه 3 ۷ - ۱۰/۵

نمایش پاسخ

د

سوال 17

قد کودک حوالی چه سنی دو برابر قد زمان تولد او می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 ۲ سالگی

گزینه 2 ۳ سالگی

گزینه 3 ۴ سالگی

گزینه 4 ۱ سالگی

نمایش پاسخ

ج

سوال 18

نوزادی که با قد ۵۰ سانتی‌متر به دنیا آمده است، در ۴ سالگی قد نرمال او حدوداً چند سانتی‌متر خواهد بود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ۷۵

گزینه 2 ۱۰۰

گزینه 3 ۱۲۵

گزینه 4 ۱۵۰

نمایش پاسخ

ب

سوال 19

بهترین نماگر وضع تغذیه‌ی عمومی کودکان عبارت است از: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 وزن

گزینه 2 دور بازو

گزینه 3 قد

گزینه 4 وزن برای قد

نمایش پاسخ

د

سوال 20

شاخص ارزیابی کوتاه قدی تغذیه‌ای در کودکان کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 قد برای سن

گزینه 2 قد برای وزن

گزینه 3 وزن برای سن

گزینه 4 قد به تنهایی

نمایش پاسخ

الف

سوال 21

منحنی‌های استاندارد NCHS در بررسی رشد و تکامل کودکان، براساس کدام اطلاعات زیر جمع‌آوری و ارائه شده‌اند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 نمونه‌ای از کودکان کل دنیا- صرف نظر از وضعیت تغذیه

گزینه 2 نمونه‌ای از کودکان اروپایی- صرف نظر از وضعیت تغذیه

گزینه 3 نمونه‌ای از کودکان سالم و خوب تغذیه شده‌ی آمریکا

گزینه 4 این منحنی‌ها براساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای برای هر کشور جداگانه طراحی شده است.

نمایش پاسخ

ج

سوال 22

دور سر یک نوزاد در بدو تولد ۳۱ سانتی‌متر است در ۶ ماهگی به طور معمول انتظار دارید چند سانتی‌متر باشد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 ۳۵ سانتی‌متر

گزینه 2 ۴۰ سانتی‌متر

گزینه 3 ۴۵ سانتی‌متر

گزینه 4 ۵۰ سانتی‌متر

نمایش پاسخ

ب

سوال 23

نوزادی که وزن هنگام تولدش ۵/۳ کیلوگرم بوده، در پنج ماهگی، یک سالگی و دو سالگی به ترتیب از راست به چپ دارای وزن تقریبی چند کیلوگرم خواهد بود؟
(پزشکی شهریور ۹۳- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 ۷- ۱۰.۵- ۱۶

گزینه 2 ۵- ۱۰.۷- ۵

گزینه 3 ۷- ۱۰.۵- ۱۴

گزینه 4 ۷- ۵- ۱۵

نمایش پاسخ

ج

سوال 24

یک شیرخوار ۷ ماهه با وزن ۳۴۰۰ گرم به دنیا آمده انتظار می‌رود چند کیلوگرم باشد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 ۵.۵

گزینه 2 ۸

گزینه 3 ۷

گزینه 4 ۵ ۶.

نمایش پاسخ

ب

سوال 25

تأخیر در ظهور اولین لبخند اجتماعی شیرخوار تا چه زمانی نشانه‌ی تأخیر در تکامل محسوب شده و نیازمند پیگیری است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 سه ماهگی

گزینه 2 دو ماهگی

گزینه 3 یک و نیم ماهگی

گزینه 4 یک ماهگی

نمایش پاسخ

ب

سوال 26

تغییرات اخیر در وضعیت تغذیه و سلامت با کدامیک از شاخص‌های رشد کودکان ارزیابی می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 وزن برای سن

گزینه 2 قد برای سن

گزینه 3 وزن برای قد

گزینه 4 دور سر برای سن

نمایش پاسخ

الف

سوال 27

خط منحنی پایین کارت رشد کشوری کودکان، معرف کدام صدک است؟ (پزشکی شهریور و اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 صدک سوم دختران

گزینه 2 صدک سوم پسران

گزینه 3 صدک سوم بدون توجه به جنس

گزینه 4 میانگین صدک سوم دختران و پسران

نمایش پاسخ

الف

سوال 28

خط منحنی پایین کارت رشد کشوری کودکان معرف کدامیک از صدک‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 صدک سوم دختران

گزینه 2 صدک پنجم پسران

گزینه 3 میانگین صدک پنجاهم پسران و دختران

گزینه 4 میانگین صدک پنجم پسران و دختران

نمایش پاسخ

الف

همه‌ی گزینه‌های زیر در خصوص شاخص‌های رشد کودکان صحیح است، بجز: (پزشکی شهرپور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 برای اطلاع از لاغری وزن با سن سنجیده می‌شود.

گزینه 2 کم وزنی بازتاب سوءتغذیه حاد و مزمن، هر دو است.

گزینه 3 لاغری پدیده‌ای حاد حاصل بیماری و یا بحران در گذشته نزدیک است.

گزینه 4 شاخص توده‌ی بدنی ترکیبی از قد و وزن برای سن است.

نمایش پاسخ

الف

دختربچه‌ی ۱۱ ماهه‌ای را برای پایش رشد به مرکز بهداشتی درمانی آورده‌اند. وزن او در حال حاضر ۹/۵ کیلوگرم است. برای این کودک منحنی رشد رسم نشده است. اگر صدک ۵۰ منحنی وزن برای سن ۱۱ ماهگی ۱۰ کیلوگرم باشد، وضعیت رشد این کودک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 رشد شیرخوار مناسب است.

گزینه 2 رشد شیرخوار به طور نامناسبی کم است.

گزینه 3 وزن‌گیری کودک به طور نامناسبی زیاد است.

گزینه 4 وضعیت وزن‌گیری او نامشخص است.

نمایش پاسخ

الف

منحنی رشد کودک ۸ ماهه‌ای در زیر صدک سوم رشد قرار دارد، کدامیک از اقدامات زیر ضروری است؟ (پزشکی شهرپور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 هرچه سریع‌تر علت تأخیر رشد کودک باید بررسی شود.

گزینه 2 باید بلافاصله مکمل‌های غذایی تجویز شود.

گزینه 3 با توجه به اطلاعات داده شده نمی‌توان اظهار نمود.

گزینه 4 در مورد تغذیه‌ی تکمیلی مناسب به مادر آموزش داده شود.

نمایش پاسخ

ج

کدامیک از شاخص‌های اختلال رشد کودکان، عمدتاً بازتابی از هر دو وضعیت سوءتغذیه‌ی حاد و مزمن است؟ (پزشکی شهرپور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 کوتاه قدی تغذیه‌ای

گزینه 2 لاغری

گزینه 3 کم وزنی

گزینه 4 بحران کم غذایی

نمایش پاسخ

ج

کدامیک از شاخص‌های تن سنجی کودکان نسبت به تغییرات اخیر در وضعیت تغذیه و سلامت حساس‌تر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 وزن برای قد

گزینه 2 وزن برای سن

گزینه 3 شاخص توده‌ی بدنی برای سن

گزینه 4 قد برای سن

نمایش پاسخ

ب

جهت تعیین وضعیت لاغری (wasting) در کودکان، کدام شاخص زیر مناسب است؟ (پزشکی شهرپور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 وزن برای سن

گزینه 2 قد برای سن

گزینه 3 وزن برای قد

گزینه 4 شاخص توده‌ی بدنی

نمایش پاسخ

ج

کدام گزینه در مورد تعریف کوتاه قدی تغذیه‌ای (Stunting) صحیح نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 معرف کاهش وزن نسبت به قد است و به دنبال بحران‌های حاد کم غذایی اتفاق می‌افتد.

گزینه 2 نوعی سوءتغذیه مزمن است که باعث می‌شود کودک به قد متناسب سن خود نرسد.

گزینه 3 نشانه‌ای از فرصت‌های از دست رفته و غیر قابل جبران در تغذیه‌ی کودک است.

گزینه 4 ابتلا به عفوت‌های مکرر یکی از مهم‌ترین علل آن است.

نمایش پاسخ

ب

سوال 36

کدام گزینه‌ی زیر مهم‌ترین معرف سوءتغذیه‌ی مزمن و غفلت در گذشته‌ی کودک است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 کم وزنی (underweight)

گزینه 2 کوتاهی قدی تغذیه‌ای (stunting)

گزینه 3 کاهش BMI (body mass index)

گزینه 4 لاغری (wasting)

نمایش پاسخ

ب

سوال 37

شیرخوار ۶ ماهه دختر دارای وزن ۷ کیلوگرم در منحنی رشد وزن به سن، روی صدک ۵۰ است، رشد این کودک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 با توجه به اطلاعات نمی‌توان اظهارنظر کرد.

گزینه 2 با توجه به سن کودک، به صورت غیر طبیعی بالاست.

گزینه 3 با توجه به سن کودک، به صورت غیر طبیعی پایین است.

گزینه 4 با توجه به سن کودک، مناسب است.

نمایش پاسخ

د

سوال 38

نوزادی با وزن ۳.۵ کیلوگرم، قد ۵۰ سانتی‌متر و دور سر ۳۵ سانتی‌متر به دنیا آمده است. اگر رشد وی در سال اول عمر طبیعی باشد در یک سالگی وزن، قد و دور سر او چگونه خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 وزن ۹ کیلوگرم، قد ۷۵ سانتی‌متر، دور ۴۵ سانتی‌متر

گزینه 2 وزن ۱۰.۵ کیلوگرم، قد ۶۰ سانتی‌متر، دو سر ۴۷ سانتی‌متر

گزینه 3 وزن ۹ کیلوگرم، قد ۶۰ سانتی‌متر، دور سر ۴۵ سانتی‌متر

گزینه 4 وزن ۱۰.۵ کیلوگرم، قد ۷۵ سانتی‌متر، دور سر ۴۷ سانتی‌متر

نمایش پاسخ

د

سوال 39

متوسط سن بلوغ دختران چند سال است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 ۹ تا ۱۳

گزینه 2 ۱۰ تا ۱۶

گزینه 3 ۱۱ تا ۱۵

گزینه 4 ۸ تا ۱۸

نمایش پاسخ

د

سوال 40

بهترین گزینه در خصوص اظهار نظر و قضاوت درباره‌ی چگونگی رشد کودکان یک منطقه کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 یک نوبت اندازه‌گیری شاخص‌های رشد

گزینه 2 اندازه‌گیری شاخص‌های رشد در فواصل منظم

گزینه 3 ارتقای دقت اندازه‌گیری شاخص‌های رشد

گزینه 4 مقایسه‌ی روند منحنی رشد با منحنی استاندارد

نمایش پاسخ

د

سوال 41

شکل منحنی رخداد بیماری نسبت به سن چگونه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 J-shape

گزینه 2 U-shape

گزینه 3 S-shape

گزینه 4 V-shape

نمایش پاسخ

الف

سوال 42

چنانچه کودکی از مراقبت ایده‌آل دوران کودکی برخوردار شده باشد، انتظار داریم تا پایان ۲۴ ماهگی چند بار توسط پرسنل بهداشت خانواده مورد مراقبت قرار گرفته باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 ۱۲

گزینه 2 ۱۸

گزینه 3 ۲۲

گزینه 4 ۳۰

نمایش پاسخ

ب

سوال 43

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص فرآیند پایش رشد کودکان صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 واژه‌ی «کم وزنی» به وزن نامناسب کودک برای قد اطلاق می‌گردد.

گزینه 2 کوتاه قدی تغذیه‌ای بازتاب سوءتغذیه حاد در کودک است.

گزینه 3 در نمودار رشد، پنجاه درصد جمعیت کودکان مرجع، وزنی بین صدک ۳ و صدک ۹۵ دارند.

گزینه 4 در نمودار رشد، جهت منحنی بیش از وضعیت نقاط ثبت شده مربوط به وزن اهمیت دارد.

نمایش پاسخ

د

سوال 44

در نمودار رشدی که مقیاس وزن برای سن کودکان را می‌سنجد، حد بالایی و پایینی کدام هستند؟ (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 صدک ۱۰ و ۹۰

گزینه 2 صدک ۳ و ۹۷

گزینه 3 منها و مثبت یک انحراف معیار از میانگین

گزینه 4 منها و مثبت سه انحراف معیار از میانگین

نمایش پاسخ

؟

سوال 45

همه‌ی گزینه‌های زیر شاخص‌های خوبی برای شروع بلوغ یک دختر نوجوان است، بجز: (دندان‌پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 زمان اولین خون‌ریزی قاعدگی (منارک)

گزینه 2 سن استخوانی

گزینه 3 سن تقویمی

گزینه 4 بروز صفات ثانویه‌ی جنسی

نمایش پاسخ

ب

سوال 46

تمام گزینه‌های زیر از موارد استفاده از منحنی رشد کودکان در ایران به شمار می‌روند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 وسیله‌ی با ارزشی برای پایش رشد کودکان است.

گزینه 2 ابزار تشخیصی برای شناسایی کودکان پرمخاطره است.

گزینه 3 در برنامه‌ریزی‌ها و ایجاد سیاست‌های بهداشتی کارایی دارد.

گزینه 4 تمام نشانگرهای مربوط به رشد و تکامل کودکان را پوشش می‌دهد.

نمایش پاسخ

د

سوال 47

کدامیک از عوامل زیر باعث تأخیر سن بلوغ در دختران می‌شود؟ (پزشکی اردیبهشت ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 سوءتغذیه

گزینه 2 افزایش مصرف چربی

گزینه 3 ورزشکاری و فعالیت مداوم

گزینه 4 سکونت در روستا

نمایش پاسخ

الف و ب و ج

سوال 48

تحت چه شرایطی شیر مادر در دوره‌ی زمانی ۶ ماهه‌ی اول عمر کودک کافی قلمداد می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 کودک بیش‌تر از ۲۵۰ گرم در دو هفته وزن اضافه کند.

گزینه 2 کودک بیش‌تر از ۱۵۰ گرم در دو هفته وزن اضافه کند

گزینه 3 کودک بیش‌تر از ۱۵۰ گرم در هفته وزن اضافه کند

گزینه 4 کودک بیش‌تر از ۲۵۰ گرم وزن در هفته اضافه کند.

نمایش پاسخ

الف. عدم پوشش سیب سبز

سوال 49

چنانچه کودک هنگام تولد دارای قدی معادل ۵۰ سانتی‌متر باشد، انتظار می‌رود قد کودک در چهارده (۱۴ ماهگی) چند سانتی‌متر باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 ۷۵

گزینه 2 ۸۰

گزینه 3 ۹۰

گزینه 4 ۱۰۰

نمایش پاسخ

ب

سوال 50

اولین زمان راست نگهداشتن سر در کودکان و توانایی کودک برای جابجایی اشیاء از یک دست به دست دیگر به ترتیب از سمت راست به چپ از چند ماهگی آغاز می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 ۳، ۴ تا ۵

گزینه 2 ۴ تا ۵، ۶ تا ۸

گزینه 3 ۳، ۶ تا ۸

گزینه 4 ۴ تا ۵، ۴ تا ۵

نمایش پاسخ

ج

سوال 51

نوزادی در بررسی دقیقه‌ی اول بعد از تولد، به شدت گریه می‌کند، ضربان قلبش ۹۰ بار در دقیقه، سیانوز و کبودی در انتهاها دارد، با تحریک بینی عطسه می‌کند و در بررسی تون عضلانی اندام‌هایش قدری خمیده است، آپگار این نوزاد چقدر است؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 ۶

گزینه 2 ۷

گزینه 3 ۸

گزینه 4 ۹

نمایش پاسخ

ب

سوال 52

افزایش رشد قدی در زمان بلوغ با کدامیک از دوره‌های کودکی همخوانی دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 رشد قدی دوره‌ی دبستان

گزینه 2 رشد قدی در چهار سالگی

گزینه 3 رشد قدی در سال اول زندگی

گزینه 4 رشد قدی در سال دوم زندگی

نمایش پاسخ

ج

سوال 53

بلوغ در دختران به ترتیب، شامل: (پزشکی شهریور ۹۶- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۳_قطب اهواز)

گزینه 1 منارک، پوبارک، تلارک

گزینه 2 پوبارک، تلارک، منارک

گزینه 3 منارک، تلارک، پوبارک

گزینه 4 تلارک، پوبارک، منارک

نمایش پاسخ

د

سوال 54

دختر خانم ۱۶ ساله‌ای هنوز قاعده نشده است. در سابقه‌ی صفات ثانویه جنسی از ۱۴ سالگی شروع شده است. BMI وی ۲۹ بوده و والدین وی دچار اضطراب گشته‌اند. چند دلیل برای لزوم مراجعه‌ی او به پزشک وجود دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 یک

گزینه 2 دو

گزینه 3 سه

گزینه 4 چهار

نمایش پاسخ

ب

سوال 55

کدامیک از موارد زیر، لزوم مراجعه به پزشک را برای دختران در سنین بلوغ مطرح نمی‌نماید؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز و همدان)

گزینه 1 اگر قاعدگی تا سن ۱۵ سالگی شروع نشده باشد.

گزینه 2 اگر سه سال پس از جوانه زدن پستان، قاعدگی رخ نداده باشد.

گزینه 3 صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد.

گزینه 4 اگر ۵ سال از شروع اولین علائم بلوغ بگذرد، ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیفتاده باشد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 56

در خصوص بهداشت بلوغ، در همه‌ی موارد مراجعه به پزشک لازم است بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب زنجان)

گزینه 1 عدم شروع قاعدگی تا ۱۴ سالگی

گزینه 2 اضطراب و سوالات نوجوان و یا والدین

گزینه 3 وجود اختلاف زیاد بین قد و وزن با سن همزمان

گزینه 4 عدم شروع قاعدگی علی‌رغم گذشت ۳ سال از جوانه زدن پستان

نمایش پاسخ

الف

سوال 57

در کدامیک از موارد زیر یک دختر در سنین بلوغ باید به پزشک مراجعه کند؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 اگر قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد.

گزینه 2 اگر پستان‌ها تا سن ۱۳ سالگی جوانه نزده باشند.

گزینه 3 اگر سه سال پس از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد.

گزینه 4 اگر پستان‌ها تا سن ۱۲ سالگی جوانه نزده باشد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 58

در معاینات دوره‌ای یک دختر نوجوان چه زمانی نیاز به ارجاع به پزشک وجود دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 عدم شروع قاعدگی تا ۱۵ سالگی

گزینه 2 عدم شروع قاعدگی تا ۴ سال بعد از جوانه زدن پستان

گزینه 3 عدم شروع صفات ثانویه جنسی تا ۱۳ سالگی

گزینه 4 عدم شروع قاعدگی بعد از ۴ سال از شروع اولین علائم بلوغ

نمایش پاسخ

ب

سوال 59

کدام گزینه در خصوص بلوغ دختران صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 سن بلوغ دختران نسبت به دهه‌های گذشته مختصری افزایش یافته است.

گزینه 2 بلوغ دختران چاق نسبتاً زودتر شروع می‌شود.

گزینه 3 زندگی در مناطق کوهستانی می‌تواند بلوغ دختران را به تعویق بیاندازد.

گزینه 4 سن متوسط بلوغ دختران بین ۸ تا ۱۸ سال است.

نمایش پاسخ

الف

سوال 60

در مورد بلوغ دختران کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 شروع سن بلوغ زیر ۸ سالگی را بلوغ زودرس می‌گویند.

گزینه 2 سن اولین قاعدگی (منارک) معمولاً در ۱۰ سالگی است.

گزینه 3 افزایش قد در دوران بلوغ در دختران ۴۵ سانتی‌متر است.

گزینه 4 بلوغ در دختران دچار سوءتغذیه زودتر شروع می‌شود.

نمایش پاسخ

الف

سوال 61

مراجعه به پزشک در دختری که در سنین بلوغ است در کدامیک از موارد زیر ضروری است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 اگر سه سال بعد از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد.

گزینه 2 اگر قاعدگی تا سن چهارده سالگی شروع نشود.

گزینه 3 اگر سه سال از شروع اولین علامت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیفتد.

گزینه 4 اگر صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن دوازده سالگی شروع نشده باشد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 62

در کدامیک از موارد زیر مراجعه به پزشک الزامی است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 چنانچه صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد.

گزینه 2 اگر قاعدگی تا سن ۱۵ سالگی شروع نشده باشد.

گزینه 3 اگر ۴ سال از شروع اولین علامت بلوغ گذشته باشد ولی قاعدگی اتفاق نیفتاده باشد.

گزینه 4 چنانچه ۲ سال بعد از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 63

در همهی موارد زیر مراجعه یک دختر نوجوان به پزشک لازم است، بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 عدم شروع قاعدگی تا سن ۱۶ سالگی

گزینه 2 اضطراب و سؤالات نوجوان و یا والدین

گزینه 3 عدم شروع صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۲ سالگی

گزینه 4 عدم شروع قاعدگی ۵ سال بعد از شروع اولین علامت بلوغ

نمایش پاسخ

ج

سوال 64

به طور معمول آخرین علامت بلوغ در دختران کدام است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/پزشکی شهریور ۹۵- زنجان)

گزینه 1 رشد پستان‌ها

گزینه 2 جهش قد و وزن

گزینه 3 قاعدگی

گزینه 4 پیدایش موهای تناسلی

نمایش پاسخ

ج

سوال 65

دختر ۱۲ ساله‌ای با شکایت این که دو سال از جوانه زدن پستان می‌گذرد ولی قاعدگی اتفاق نیافتاده است به پزشک مراجعه نموده است، در مورد توصیه‌ی پزشک

کدامیک صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 می‌توان یک سال دیگر صبر کرد و اگر قاعدگی رخ ندهد ارجاع داده شود.

گزینه 2 مشکل خاصی نیست و به خانواده اطمینان می‌دهد.

گزینه 3 بیمار از یک اختلال هورمونی رنج می‌برد و به متخصص ارجاع داده شود.

گزینه 4 تا سن ۱۸ سالگی می‌توان صبر کرد و اگر قاعدگی رخ ندهد ارجاع داده شود.

نمایش پاسخ

الف

سوال 66

آخرین مرحله‌ی دوران بلوغ در دختران کدام مرحله است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 رشد پستان

گزینه 2 پیدایش موهای ناحیه‌ی تناسلی و زیربغل

گزینه 3 رشد و جهش سریع در قد و وزن

گزینه 4 قاعدگی

نمایش پاسخ

د

سوال 67

در کدامیک از شرایط زیر سیر بلوغ یک دختر نیاز به پیگیری دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 اگر قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی اتفاق نیفتد.

گزینه 2 اگر رویش موهای تناسلی تا ۱۶ سالگی شروع نشود.

گزینه 3 اگر بلافاصله بعد از برقراری منارک، قاعدگی منظم نباشد

گزینه 4 اگر سه سال بعد از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 68

واضح‌ترین و ملموس‌ترین علامت بلوغ در دختران کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 بروز اولین خون‌ریزی قاعدگی

گزینه 2 افزایش ضخامت رحم

گزینه 3 بزرگی پستان‌ها

گزینه 4 افزایش سن تقویمی

نمایش پاسخ

الف

سوال 69

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص تغییرات دوران بلوغ صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 جهش رشد در پسران زودتر از دختران اتفاق می‌افتد.

گزینه 2 طول مدت رشد در پسران طولانی‌تر از دختران است.

گزینه 3 حداکثر جهش رشد در دختران یک سال بعد از شروع عادت ماهیانه است.

گزینه 4 هورمون جنسی استروژن سبب تسریع رشد استخوان‌ها می‌گردد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 70

مزایای فیزیولوژیک ورزش در دوران بلوغ تمام موارد زیر است بجز: (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 کارایی بافت عضلانی را برای تولید انرژی افزایش می‌دهد.

گزینه 2 امکان کاهش وزن را از طریق کاهش اشتها فراهم می‌سازد.

گزینه 3 باعث تقویت قلب و ریه و گردش خون می‌شود.

گزینه 4 مقدار چربی‌های خون را کاهش می‌دهد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 71

کدام جمله در خصوص بلوغ دختران صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 در سوءتغذیه‌ی شدید بلوغ زودتر اتفاق می‌افتد.

گزینه 2 زندگی در ارتفاعات بالا بلوغ را تسریع می‌کند.

گزینه 3 معرف عمده‌ی سن بلوغ وراثت است.

گزینه 4 در چاقی بلوغ به تأخیر می‌افتد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 72

اولین قاعدگی در دختران ایرانی معمولاً در چه سنی اتفاق می‌افتد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 ۱۳ سالگی

گزینه 2 ۱۴ سالگی

گزینه 3 ۱۲ سالگی

گزینه 4 ۱۱ سالگی

نمایش پاسخ

الف

سوال 73

کدام مورد زیر در دوران نوجوانی نیاز به مراجعه پزشک ندارد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 بین قد و وزن با سن همزمان اختلاف زیادی وجود داشته باشد.

گزینه 2 عدم شروع قاعدگی تا ۱۴ سال

گزینه 3 ۵ سال از شروع اولین علامت بلوغ گذشته اما هنوز قاعدگی اتفاق نیفتاده

گزینه 4 رویش موهای زیر زیرچانه به طور ناگهانی بعد از شروع قاعدگی منظم

نمایش پاسخ

ب

سوال 74

در تشخیص مشکل رشد قدی در کودکان کدامیک از موارد زیر از اهمیت بیش‌تری برخوردار است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 کمبود هورمون رشد در اندازه‌گیری آزمایشگاهی

گزینه 2 نحوه‌ی حرکت کودک بر روی منحنی رشد قدی

گزینه 3 قرار گرفتن کودک روی صدک ۳ منحنی رشد قدی

گزینه 4 فاصله داشتن قد کودک از قد هدف

نمایش پاسخ

ب

سوال 75

در مورد «رشد و تکامل کودکان» همه‌ی گزینه‌ها صحیح است بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 کودکان در سال سوم حداقل هر ۳ ماه یک بار باید مراقبت شوند

گزینه 2 به کوتاهی قد براساس سن Stunting اطلاق می‌شود

گزینه 3 دور سر در ۶ ماهه نخست حدود ۸ و در ۶ ماهه‌ی دوم حدود ۳ سانتی‌متر افزایش می‌یابد

گزینه 4 در مراحل تکامل، کودک ۹ تا ۱۰ ماهگی باید بتواند بدون کمک بایستد

نمایش پاسخ

د

سوال 76

مراقبت ایده‌آل برای کودک در سال اول هر چند ماه یک بار است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 هر ماه یک بار

گزینه 2 هر دو ماه یک بار

گزینه 3 هر سه ماه یک بار

گزینه 4 هر چهار ماه یک بار

نمایش پاسخ

الف

سوال 77

یک دختر نوجوان همراه با مادرش به علت نگرانی از عدم شروع قاعدگی مراجعه نموده است. بعد از گرفتن شرح حال و معاینه در صورت عدم وقوع کدامیک از موارد زیر نیاز به اقدامات تشخیصی وجود نخواهد داشت؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 قاعدگی ۷ سال از شروع اولین علامت بلوغ

گزینه 2 صفات ثانویه‌ی جنسی تا سن ۱۴ سالگی

گزینه 3 قاعدگی تا ۳ سال بعد از جوانه زدن پستان

گزینه 4 قاعدگی تا سن ۱۶ سالگی

سوال 78

سن بلوغ در یک دختر نوجوان ورزشکار مصرف زیاد چربی و پروتئین را در رژیم غذایی خود ذکر می‌کند. نسبت به هم سن‌های خودش که این عامل را ندارند چگونه خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 فرقی نخواهد داشت

گزینه 2 زودتر اتفاق می‌افتد

گزینه 3 دیرتر اتفاق می‌افتد

گزینه 4 بستگی به عوامل ژنتیکی دارد

سوال 79

کوتاه قدی تغذیه‌ای Stunting بیانگر چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 سوءتغذیه مزمن

گزینه 2 عدم تغذیه با شیر مادر

گزینه 3 عفونت اخیر

گزینه 4 بحران حاد کم غذایی

سوال 80

در مورد لاغری کودکان کدامیک از موارد صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 لاغری کودکان پدیده‌ای مزمن است

گزینه 2 کم وزنی برای سن می‌تواند سوءتغذیه‌ی حاد را مزمن جدا کند

گزینه 3 برای بررسی از شاخص «قد یا وزن» استفاده می‌شود

گزینه 4 لاغری به تنهایی وضع کودکان یک منطقه را نشان می‌دهد

سوال 81

نوزادی در بررسی دقیقه‌ی اول بعد از تولد، تنفس ضعیفی دارد، ضربان قلبش ۹۰ در دقیقه است و سیانوز و کبودی انتهاها را دارد. با تحریک بینی واکنش نشان نمی‌دهد و در بررسی تون عضلانی اندام‌هایش قدری خمیده است. آپگار این نوزاد را محاسبه کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 ۶

گزینه 2 ۵

گزینه 3 ۳

گزینه 4 ۴

سوال 82

کدامیک از عبارات زیر در مورد سوءتغذیه‌ی حاد (دریافت ناکافی موادغذایی) صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 افت منحنی وزن به سن

گزینه 2 افت منحنی قد برای سن

گزینه 3 طبیعی بودن منحنی وزن به قد

گزینه 4 افت منحنی دور سر برای سن

سوال 83

کدامیک از موارد زیر جهت انجام اقدامات تشخیصی بیش‌تر در بلوغ دختران نیازمند ارجاع به پزشک است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 چنانچه قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی شروع نشده باشد

گزینه 2 چنانچه یک سال بعد از جوانه زدن پستان، قاعدگی اتفاق نیفتد

گزینه 3 اگر ۳ سال از شروع اولین علامت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی اتفاق نیفتد

گزینه 4 اگر بین قد و وزن با سن همزمان، اختلاف زیادی وجود داشته باشد

سوال 84

کدامیک از موارد زیر جهت بررسی اختلال در روند بلوغ دختران مراجعه به پزشک ضروری است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 عدم رخ دادن قاعدگی بیش از ۵ سال از شروع اولین علامت بلوغ

گزینه 2 عدم رخ دادن قاعدگی تا سن ۱۴ سالگی

گزینه 3 عدم ظهور صفات ثانوی جنسی نظیر رویش موهای ناحیه‌ی تناسلی تا سن ۱۲ سالگی

گزینه 4 عدم رخداد قاعدگی همزمان با جوانه زدن پستان‌ها

سوال 85

کودکی به وسیله‌ی مادر خود جهت پایش رشد به مرکز بهداشتی درمانی آورده شده است. چنانچه کودک بدون کمک بایستد و برای بلند کردن اشیاء از شست و انگشت نشانه استفاده کند انتظار حداقل سن کودک به ماه چند خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 ۸-۶

گزینه 2 ۱۰-۹

گزینه 3 ۱۱-۱۰

گزینه 4 ۱۴-۱۲

سوال 86

اولین و آخرین تغییرات ناشی از بلوغ در دختران به ترتیب از راست به چپ در کدامیک از گزینه‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 پوبارک- منارک

گزینه 2 رشد قدی جسمی (جهش رشدی)- منارک

گزینه 3 تلارک- پوبارک

گزینه 4 رشد قدی جسمی (جهش رشدی)- پوبارک

سوال 87

تعریف سن درست به کدامیک از موارد زیر اطلاق می‌یابد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 تعداد سال‌هایی که از طول زندگی یک شخص می‌گذرد

گزینه 2 سنی که در یک لحظه مصداق می‌یابد

گزینه 3 سنی که در طول یک سال شمسی لحاظ می‌شود

گزینه 4 به سن مداوم درست گفته می‌شود

سوال 88

در کدامیک از موارد زیر مشاوره‌ی ژنتیک توصیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 نازایی

گزینه 2 کوتاهی بیش از حد قد

گزینه 3 سرطان‌ها

گزینه 4 همه‌ی موارد

سوال 89

کدام مورد زیر معرف سوءتغذیه‌ی حاد در کودکان است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 کوتاهی قد به سن

گزینه 2 وزن کم نسبت به قد

گزینه 3 وزن کم نسبت به سن

گزینه 4 کم بودن نمایه توده‌ی بدنی

ج. کوتاهی قد به سن برای سوءتغذیه مزمن و وزن کم نسبت به سن برای سوءتغذیه حاد در کودکان است.

سوال 90

کدامیک از شاخص‌های ذیل می‌تواند هر سه اختلال رشد کم وزنی (Underweight)، لاغری (Wasting) و یا بیش وزنی (Overweight) کودکان را مشخص کند؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب کرمان، تهران و اصفهان)

گزینه 1 شاخص قد برای سن

گزینه 2 شاخص توده‌ی بدنی برای سن

گزینه 3 شاخص وزن برای سن

گزینه 4 شاخص وزن برای قد

نمایش پاسخ

د. وزن برای قد ربطی به سن ندارد و می‌تواند لاغری یا اضافه وزن کودکان را مشخص کند.

سوال 91

خط منحنی پایین کارت رشد کشوری، معرف کدام صدک است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 صدک سوم پسران

گزینه 2 صدک سوم دختران

گزینه 3 صدک سوم بدون توجه به جنس

گزینه 4 میانگین صدک سوم پسران و دختران

نمایش پاسخ

ب. نمودار رشد ۲ منحنی دارد. بالایی یعنی صدک ۵۰ میانه‌ی وزن پسر و پایینی هم صدک سوم دختر.

سوال 92

مراقبت ایده‌ال از کودکان در سال اول زندگی هر چند ماه یک بار است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 یک

گزینه 2 دو

گزینه 3 سه

گزینه 4 چهار

نمایش پاسخ

الف. در سال اول زندگی هر یک ماه یک بار و به ترتیب کمتر میشود تا به سالی یک بار برسد.

سوال 93

در کدامیک از موارد زیر جهت بررسی اختلال در روند بلوغ دختران باید به پزشکی مراجعه کرد؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 اگر قاعدگی ۱۴ سالگی شروع نشده باشد.

گزینه 2 چنانچه ۵ سال از شروع اولین علامت بلوغ بگذرد ولی هنوز قاعدگی رخ نداده باشد.

گزینه 3 چنانچه همزمان با جوانه زدن پستان‌ها قاعدگی رخ ندهد.

گزینه 4 در صورتی که صفات ثانویه‌ی جنسی نظیر جوانه زدن پستان‌ها تا سن ۱۲ سالگی رخ نداده باشد.

نمایش پاسخ

ب. لزوم مراجعه به پزشک: اگر قاعدگی تا ۱۶ سالگی رخ ندهد و یا صفات ثانویه تا ۱۴ سالگی ایجاد نشود یا ۵ سال بعد از اولین علامت بلوغ قاعدگی اتفاق نیفتد.

سوال 94

مادر دختر نوجوانی نگران وضعیت بلوغ و قاعدگی فرزند خود است. تحت کدام شرایط، این دختر نوجوان باید به پزشک مراجعه نماید؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 اگر قاعدگی تا ۱۵ سالگی آغاز نشده باشد.

گزینه 2 یک سال پس از اولین علائم بلوغ منارک اتفاق نیفتد.

گزینه 3 جوانه زدن پستان تا ۱۴ سالگی شروع نشده باشد.

گزینه 4 اگر یک سال پس از جوانه زدن پستان قاعدگی اتفاق نیفتد.

نمایش پاسخ

ج. لزوم مراجعه به پزشک: اگر قاعدگی تا ۱۶ سالگی رخ ندهد و یا صفات ثانویه تا ۱۴ سالگی ایجاد نشود یا ۵ سال بعد از اولین علامت بلوغ قاعدگی اتفاق نیفتد.

سوال 95

کودک در چه سنی از بیگانگان غریبی می‌کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب آزاد)

گزینه 1 سه ماهگی

گزینه 2 ۹-۱۰ ماهگی

گزینه 3 ۱۸-۲۱ ماهگی

گزینه 4 ۲۴ ماهگی

نمایش پاسخ

ب / کودک در ۱۰-۹ ماهگی از بیگانگان غریبی می‌کند و در سن ۱۱- ۱۰ ماهگی بدون کمک می‌ایستد و نخستین کلمات را بر زبان جاری می‌کند.

با استفاده از کدامیک شاخص‌های زیر می‌توان کودکان و نوجوانان را به گروه‌های کم وزن، دارای وزن زیاد و در معرض خطر اضافه وزن طبقه‌بندی کرد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 وزن برای سن

گزینه 2 شاخص توده‌ی بدنی برای سن

گزینه 3 قد برای سن

گزینه 4 وزن برای قد

نمایش پاسخ

ب / با کمک شاخص توده‌ی بدنی برای سن می‌توان کودکان و نوجوانان را به گروه‌های کم وزن، دارای وزن زیاد و در معرض خطر اضافه وزن طبقه‌بندی کرد.

در پایش رشد کودک ۷ ماهه، از نظر تکامل حرکتی می‌تواند سینه‌خیز رود و از نظر تکامل اجتماعی از بیگانه‌ها غریبی می‌کند. از نظر رشدی این کودک در چه مرحله‌ای است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 از لحاظ تکاملی در سن بالاتری نسبت به همسالان خود است.

گزینه 2 رشد کودک منطبق بر رشد کودکان هم سن خود است.

گزینه 3 از لحاظ تکاملی در سن پایین‌تری نسبت به همسالان خود قرار دارد.

گزینه 4 از لحاظ تکاملی اجتماعی منطبق و از لحاظ حرکتی جلوتر از همسالان خود است.

نمایش پاسخ

الف / سینه‌خیز رفتن در ۹ ماهگی است پس از لحاظ تکاملی در سن بالاتری نسبت به همسالان خود است.

براساس شاخص‌های پایش و ارزشیابی برنامه‌ی «بهداشت برای همه»، ارائه‌ی خدمات مراقبت از کودکان حداقل تا چه سنی باید ادامه یابد؟ (پزشکی ریفرم شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 پنج سالگی

گزینه 2 یک سالگی

گزینه 3 دو سالگی

گزینه 4 سه سالگی

نمایش پاسخ

ب / ارائه‌ی خدمات مراقبت از کودکان باید حداقل تا یک سالگی ادامه یابد.

کدامیک به عنوان آخرین علامت بلوغ در دختران است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 منارک

گزینه 2 پوبارک

گزینه 3 رشد قوی

گزینه 4 تلارک

نمایش پاسخ

الف / ترتیب مراحل بلوغ: تلارک / آدرنارک / پوبارک / منارک (واضح‌ترین علامت)

برای پایش رشد کودکی که سنش برای شما نامعلوم است، استفاده از شاخص، درست است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 وزن برای سن

گزینه 2 قد برای سن

گزینه 3 وزن برای قد

گزینه 4 BMI برای سن

نمایش پاسخ

ج / وزن برای قد ربطی به سن ندارد و می‌تواند لاغری یا اضافه وزن کودکان را مشخص کند.

واضح‌ترین علامت بلوغ دختران چیست؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 منارک

گزینه 2 سن استخوانی

گزینه 3 رویش مو در ناحیه‌ی پوبیس

گزینه 4 پر رنگ شدن ارئول پستان

نمایش پاسخ

الف / ترتیب مراحل بلوغ: تلارک / آدرنارک / پوبارک / منارک (واضح‌ترین علامت)

سوال 102

کودکی که بدون کمک می‌ایستد و نخستین کلمات را بر زبان جاری می‌کند، حدوداً چند ماهه است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 ۸-۹

گزینه 2 ۱۰-۱۱

گزینه 3 ۱۲-۱۴

گزینه 4 ۱۸-۲۱

نمایش پاسخ

ب / کودک در ۱۰-۹ ماهگی از بیگانگان غریبی می‌کند و در سن ۱۱- ۱۰ ماهگی بدون کمک می‌ایستد و نخستین کلمات را بر زبان جاری می‌کند.

سوال 103

کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص بلوغ دختران صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 در دختران چاق نسبتاً زودتر شروع می‌شود.

گزینه 2 در دختران ورزشکار زودتر اتفاق می‌افتد.

گزینه 3 سکونت در مناطق دور از استوا، بلوغ را تسریع می‌کند.

گزینه 4 دختران ساکن ارتفاعات کم، بلوغ را دیرتر تجربه می‌کنند.

نمایش پاسخ

الف / بلوغ در دختران دچار سوءتغذیه و ورزشکار و ساکن در مناطق دور از استوا دیرتر شروع می‌شود.

سوال 104

کدامیک از موارد زیر در مراحل بلوغ و نوجوانی نیاز به مراجعه به پزشک ندارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 اضطراب و سؤالات نوجوان یا والدین او

گزینه 2 اگر ۵ سال بعد از شروع اولین علامت بلوغ، قاعدگی اتفاق نیافتد.

گزینه 3 اگر ۳ سال بعد از جوانه زدن پستان، قاعدگی اتفاق نیافتد.

گزینه 4 اگر رویش موهای ناحیه‌ی زهار تا سن ۱۳ سالگی شروع نشده باشد.

نمایش پاسخ

د / لزوم مراجعه به پزشک: اگر قاعدگی تا ۱۶ سالگی رخ ندهد و یا صفات ثانویه تا ۱۴ سالگی ایجاد نشود یا ۵ سال بعد از اولین علامت بلوغ قاعدگی اتفاق نیفتد.

سوال 105

تغییرات بلوغ در پسران در مقایسه با دختران معمولاً چه تفاوتی از نظر زمان شروع و طول مدت تحولات دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 چهار سال دیرتر- کوتاه‌تر

گزینه 2 دو سال زودتر- کوتاه‌تر

گزینه 3 چهار سال دیرتر- طولانی‌تر

گزینه 4 دو سال دیرتر- طولانی‌تر

نمایش پاسخ

د / تغییرات بلوغ در پسران در مقایسه با دختران معمولاً دو سال دیرتر آغاز می‌شود و طولانی‌تر است.

سوال 106

مناسب‌ترین سن شروع تغذیه‌ی تکمیلی در شیرخواران چند ماهگی است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب همدان)

گزینه 1 چهار تا شش ماهگی

گزینه 2 پایان چهار ماهگی

گزینه 3 پایان شش ماهگی

گزینه 4 پایان پنج ماهگی

نمایش پاسخ

ج / تا ۶ ماهگی باید تنها تغذیه‌ی انسان شیر مادر باشد.

سوال 107

در چند ماهگی کودک برای بلند کردن اشیاء از انگشت شست و نشانه استفاده می‌کند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 ۶ تا ۸

گزینه 2 ۹ تا ۱۰

گزینه 3 ۱۰ تا ۱۱

گزینه 4 ۱۲ تا ۱۴

نمایش پاسخ

ج

سوال 108

معمولاً چند سال پس از بلوغ جسمی، دختر یا پسر آمادگی ازدواج خواهند داشت؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 ۳ تا ۴

گزینه 2 ۴ تا ۶

گزینه 3 ۶ تا ۸

گزینه 4 ۸ تا ۱۰

نمایش پاسخ

الف / معمولاً ۳ تا ۴ سال پس از بلوغ جسمی، دختر یا پسر آمادگی ازدواج خواهند داشت.

سوال 109

کدامیک از شاخص‌های ارزیابی سوءتغذیه وابستگی کم‌تری به سن و جنس کودک دارد؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 کم وزنی

گزینه 2 کوتاه قدی تغذیه‌ای

گزینه 3 میکروسفالی

گزینه 4 اندازه‌ی کم دور بازو

نمایش پاسخ

د. سؤال بی‌ربط از مبحث بی‌ربط!

بهداشت روان

تعداد سوال: ۲۵

درجه ساختی: آسان

نکات:۱-اختلال شخصیت جز بیماری روانی عمومی نیست

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

رشد متعادل شخصیت و بینش عاطفی انسان که او را قادر می‌سازد تا با انسان‌های دیگر به صورت هماهنگ زندگی کند اصطلاحاً بهداشت نامیده می‌شود.
(پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 اولیه

گزینه 2 اجتماعی

گزینه 3 روانی

گزینه 4 بلوغ

نمایش پاسخ

ج

سوال 2

موارد زیر از ویژگی‌های روان سالم است بجز: (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 خشمگین شدن و سپس پشیمانی

گزینه 2 احترام به خود

گزینه 3 جلب احترام دیگران

گزینه 4 ارزیابی توانایی خود در حد واقعی

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

کدامیک از موارد زیر در مورد اختلالات روان غلط است؟ (پزشکی شهریور۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 افسردگی یک قطبی، مهم‌ترین علت ناتوانی در میان اختلالات روان است.

گزینه 2 اختلالات شخصیتی از اختلالات ماژور (عمده) محسوب می‌گردند.

گزینه 3 اسکیزوفرنی، وخیم‌ترین بیماری روانی است.

گزینه 4 ۹۵% از افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند مبتلا به اختلالات روان هستند.

نمایش پاسخ

ب

سوال 4

کدامیک از ویژگی‌های افراد از نظر روانی سالم محسوب می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 نسبت به زمان، مکان و اشخاص از بینش و آگاهی طبیعی برخوردار باشد.

گزینه 2 بتواند توانایی‌های خود را در حد واقعی ارزیابی کند.

گزینه 3 بتواند عواطف و احساسات دیگران را تشخیص داده و مدیریت کند.

گزینه 4 با غم یا شادی دیگران، غمگین یا خوشحال شده و حس همدردی داشته باشد.

نمایش پاسخ

ب

سوال 5

تنش‌های عاطفی جزء کدام دسته از علل بیماری‌های روانی هستند؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 وراثت

گزینه 2 بیماری‌های عضوی

گزینه 3 عوامل محیطی- اجتماعی

گزینه 4 حوادث

نمایش پاسخ

ج

سوال 6

کدامیک از اختلالات روانی زیر بیش‌ترین سهم را در بار کل بیماری‌ها به خود اختصاص می‌دهد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 اسکیزوفرنی

گزینه 2 خودکشی

گزینه 3 سوءمصرف مواد مخدر

گزینه 4 افسردگی تک قطبی

نمایش پاسخ

د

سوال 7

کدامیک از نشانه‌های زیر هشدار دهنده برای ضعف روانی نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 بی‌خوابی مکرر

گزینه 2 عدم تحمل فرزندان به صورت گهگاهی

گزینه 3 ترس بی‌جهت دائمی

گزینه 4 احساس نگرانی دائمی

نمایش پاسخ

ب

سوال 8

کدامیک از راهکارهای زیر جزء راه‌های پیشگیری ثانویه در بهداشت روان است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 بیماریابی به منظور تشخیص و درمان به موقع

گزینه 2 ارائه‌ی مشاوره‌های خانوادگی و فردی و گروهی

گزینه 3 انجام تحقیقات سبب‌شناسی عوامل خطر در جامعه

گزینه 4 تأسیس واحدهای نوتوانی در بخش‌های روان‌پزشکی

نمایش پاسخ

الف

سوال 9

توجه به باورهای معنوی در کدامیک از سطوح پیشگیری از بیماری‌های روانی نقش اساسی دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 سطح نخستین

گزینه 2 سطح اول

گزینه 3 سطح دوم

گزینه 4 سطح سوم

نمایش پاسخ

ب

سوال 10

کدام عبارت در مورد پیشگیری از بیماری‌های روانی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 پیشگیری ثالثیه یعنی پیشگیری از تداوم تداخلات اختلالات روانی مزمن

گزینه 2 پیشگیری اولیه یعنی جلوگیری از عوارض اختلالات روانی در افراد جامعه

گزینه 3 پیشگیری ثانویه یعنی پیشگیری از تداوم اختلالات روانی مزمن

گزینه 4 پیشگیری ثانویه یعنی مقاوم نمودن افراد جامعه در برابر اختلالات روانی

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

کدامیک از اقدامات زیر جزء پیشگیری سطح سوم بیماری‌های روانی در جامعه است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 بیماریابی در سطح جامعه

گزینه 2 پیشگیری از بروز علائم شدید در افراد مبتلا

گزینه 3 جلوگیری از عود بیماری و دفعات بستری

گزینه 4 شناسایی بیماران دچار اختلال روانی مزمن

نمایش پاسخ

د

سوال 12

نحوهی رویارویی با عوامل اضطراب‌انگیز محیطی و اجتماعی از اهداف کدام سطح پیشگیری از بیماری‌های روانی است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 پیشگیری اولیه (سطح اول)

گزینه 2 پیشگیری ثانویه (سطح دوم)

گزینه 3 پیشگیری ثالثیه (سطح سوم)

گزینه 4 همه‌ی موارد

نمایش پاسخ

الف

سوال 13

کدامیک از موارد زیر در مورد اختلالات روان غلط است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 افسردگی تک قطبی، مهم‌ترین علت ایجاد ناتوانی در بین اختلالات روان است.

گزینه 2 خودکشی شایع‌ترین علت مرگ در افراد ۳۰-۱۵ سال است.

گزینه 3 اسکیزوفرنی شدیدترین اختلال روان محسوب می‌شود.

گزینه 4 اختلالات شخصیتی از اختلالات روان غیر عمدی (مینور) محسوب می‌شود.

نمایش پاسخ

ب

سوال 14

مشاوره‌ی قبل از ازدواج کدام نوع پیشگیری برای بیماری‌های روانی محسوب می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 پیشگیری اولیه (سطح اول)

گزینه 2 پیشگیری ثانویه (سطح دوم)

گزینه 3 پیشگیری ثالثیه (سطح سوم)

گزینه 4 پیشگیری محسوب نمی‌شود.

نمایش پاسخ

الف

سوال 15

کدامیک از موارد زیر جزء بیماری‌های غیر عمدی روانی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب آزاد)

گزینه 1 روان گسیختگی

گزینه 2 اختلال شخصیت

گزینه 3 افسردگی- سرخوشی

گزینه 4 سوءظن شدید و هذیان

نمایش پاسخ

ب

سوال 16

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد سلامت روان صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 میزان شیوع اختلالات روانی در ایران در مناطق مختلف بین ۷-۱۴٪ گزارش شده است.

گزینه 2 برحسب برآورد سازمان جهانی بهداشت ۱۰٪ مردم جهان دچار نوعی از اختلالات روانی- عصبی- رفتاری هستند.

گزینه 3 ناتوانی ناشی از بیماری‌های روان بین ۵-۱۵% از بار کلی بیماری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

گزینه 4 از ده بیماری عمده‌ای که سبب ناتوانی می‌شوند ۴ بیماری مربوط به اختلالات عصبی- روانی است.

نمایش پاسخ

د

سوال 17

در پیشگیری اولیه بیماری‌های روانی کدامیک از اقدامات زیر انجام می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 مقاوم نمودن افراد جامعه و اقشار آسیب‌پذیر

گزینه 2 پیشگیری از بالا رفتن میزان عود و دفعات بستری

گزینه 3 شناسایی مبتلایان به اختلالات روانی مزمن

گزینه 4 حمایت از مبتلایان شناخته شده

نمایش پاسخ

الف

سوال 18

کدامیک نشان دهنده‌ی اهمیت مشارکت پزشکان عمومی در برنامه‌های کشوری بهداشت روان است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 پزشکان عمومی آموزش‌های کافی برای مداخلات روان‌پزشکی دریافت می‌کنند

گزینه 2 پزشکان عمومی مشکلات روان‌پزشکی را به خوبی تشخیص می‌دهند

گزینه 3 پزشکان عمومی به خوبی افراد دارای اختلال روان‌پزشکی را درمان می‌کنند

گزینه 4 معمولاً بیماران با اختلال روان‌پزشکی با شکایات جسمی به پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند

نمایش پاسخ

د. عدم پوشش در سبب سبز

سوال 19

شایع‌ترین بیماری روانی عمده که سبب ناتوانی می‌شود، در سطح جهان کدام است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 افسردگی دو قطبی

گزینه 2 اسکیزوفرنی

گزینه 3 وسواس

گزینه 4 افسردگی یک قطبی

نمایش پاسخ

د. افسردگی شایع‌ترین بیماری روانی است و اسکیزوفرنی هم به معنای روان‌پریشی یا جنون است.

سوال 20

کدامیک از شاخص‌های تعیین سلامت در انسان بیش‌تر جنبه‌ی ذهنی دارد؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 میزان حمایت اجتماعی

گزینه 2 امید به زندگی

گزینه 3 مشارکت در برنامه‌های سلامت

گزینه 4 رفتارهای بهداشتی

نمایش پاسخ

الف / میزان حمایت اجتماعی که از شاخص‌های تعیین سلامت در انسان است نسبت به سایر شاخصه‌ها بیش‌تر جنبه‌ی ذهنی دارد.

سوال 21

براساس بررسی‌های بالینی، شکایت اولیه‌ی اکثر بیماران روانی چیست و بیش‌تر به چه گروهی از ارائه دهندگان خدمت مراجعه می‌نمایند؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب تهران)

گزینه 1 اضطراب، مشاوران و روان‌شناسان

گزینه 2 اضطراب، روان‌پزشکان

گزینه 3 افسردگی، پزشکان عمومی

گزینه 4 شکایت بدنی، پزشکان عمومی

نمایش پاسخ

د / اکثر بیماران روانی در مرحله‌ی اول به پزشکان عمومی مراجعه می‌کنند و از یک مشکل بدنی شکایت دارند و بعداً به مشکل اصلی خود پی می‌برند.

سوال 22

تمام موارد زیر جزء بیماری‌های روانی عمده محسوب می‌گردند، بجز: (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 روان گسیختگی

گزینه 2 افسردگی- سرخوشی

گزینه 3 اختلالات شخصیتی

نمایش پاسخ

ج / افسردگی شایع‌ترین بیماری روانی است و اسکیزوفرنی هم به معنای روان‌پریشی یا جنون است. اختلالات شخصیتی جزء بیماری‌های روانی عمده محسوب نمی‌گردد.

سوال 23

کدامیک از موارد زیر در مورد اختلال‌های روان صحیح است؟ (پزشکی کلاسیک شهریور ۹۸- قطب شیراز)

گزینه 1 اختلال افسردگی، وخیم‌ترین بیماری روانی محسوب می‌شود.

گزینه 2 خودکشی شایع‌ترین علت مرگ در افراد ۱۵ تا ۳۰ ساله است.

گزینه 3 دمانس، شایع‌ترین اختلال روان در افراد میانسال است.

گزینه 4 اسکیزوفرنی از سنین نوجوانی و جوانی آغاز می‌گردد.

نمایش پاسخ

د

سوال 24

کدام یک از گزینه‌های زیر درباره بیماری‌های روانی صحیح نمی‌باشد؟(علوم پایه پزشکی دی ۹۹ – میان‌دوره)

گزینه 1 عدم اطلاع افرادی که ناراحتی روانی دارند از وضع نامتعادل خود

گزینه 2 عدم اطلاع خانواده و نزدیکان فرد از وجود بیماری روانی

گزینه 3 عدم اقدام به‌موقع برای درمان بیماری روانی

گزینه 4 عدم وجود عود مکرر در بیماری روانی

نمایش پاسخ

د در بیماری روانی ممکن است عود مکرر وجود داشته باشد.

سوال 25

تمام موارد زیر درباره بیماری‌های روانی صحیح است، به‌جز: (علوم‌پایه دندان‌پزشکی دی ۹۹ - میان‌دوره)

گزینه 1 بیماری‌های روانی عود مکرر دارند.

گزینه 2 بسیاری از افراد از اختلالات روانی خود اطلاع ندارند.

گزینه 3 بیماری‌های روانی در مقایسه با بیماری‌های جسمانی کشندگی بالایی دارند.

گزینه 4 بیماری‌های روانی درآمد سرانه کشور را کاهش می‌دهند.

نمایش پاسخ

ج / میزان کشندگی بیماری‌های جسمانی بیشتر است.

واکسیناسیون

تعدادسوال: ۹۹

درجه سختی: متوسط

نکات:۱-جدول واکسیناسیون بر حسب سن پر تکرار است

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدام یک از واکسن‌های مورد مصرف زیر در انسان شامل ویروس تخفیف حدت یافته (ضعیف شده) است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد/پزشکی شهریور ۹۳ _ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 هپاتیت B

گزینه 2 فلج‌اطفال تزریقی

گزینه 3 هاری

گزینه 4 سرخک

نمایش پاسخ

د

سوال 2

تمام واکسن‌های زیر از ویروس زنده‌ی ضعیف شده تهیه شده‌اند بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 اریون

گزینه 2 سرخک

گزینه 3 هاری

نمایش پاسخ

ج

سوال 3

شیرخوار شش ماهه‌ای همزمان با تجویز واکسن پولیو خوراکی دچار اسهال شدید است. چه اقدامی در مورد آن لازم است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 دریافت یک دوز اضافی یک ماه بعد

گزینه 2 دریافت یک دوز اضافی دو ماه بعد

گزینه 3 دریافت یک دوز اضافی شش ماه بعد

گزینه 4 اقدام دیگری نیاز ندارد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 4

واکسن BCG جزء کدامیک از واکسن‌های زیر است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 Synthetic Vaccines

گزینه 2 DNA Vaccines

گزینه 3 Attenuated Vaccines

گزینه 4 Subunit Vaccines

نمایش پاسخ

ج

سوال 5

در خصوص برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون کدام گزینه صحیح نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 واکسن‌های گرما دوست باید در طبقه‌ی میانی یخچال زنجیره‌ی سرد خانه‌ی بهداشت نگهداری شود.

گزینه 2 دمای مناسب نگهداری واکسن‌ها در یخچال خانه‌ی بهداشت باید بین ۲+ تا ۸+ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد.

گزینه 3 دوز واکسن هپاتیت ب در افراد سالم بالای ده سال دو برابر افراد سالم زیر ده سال است.

گزینه 4 روش صحیح تزریق واکسن ب.ث.ژ تزریق زیرجلدی است.

نمایش پاسخ

د

سوال 6

تمام واکسن‌های زیر براساس برنامه‌ی ایمن‌سازی کشوری در بدو تولد تجویز می‌شود، بجز: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 ب.ث.ژ (سل)

گزینه 2 پولیو (فلج اطفال)

گزینه 3 واکسن سه‌گانه (DPT)

گزینه 4 هپاتیت B

نمایش پاسخ

ج

سوال 7

طبق برنامه‌ی واکسیناسیون روتین کشور، همه‌ی واکسن‌های زیر در بدو تولد تجویز می‌شوند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 فلج اطفال

گزینه 2 هپاتیت B

گزینه 3 کزاز

گزینه 4 ب.ث.ژ

نمایش پاسخ

ج

سوال 8

بر طبق برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون، کدامیک از واکسن‌های زیر در یک سالگی تجویز می‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شمال/پزشکی شهریور ۹۴ _ قطب کرمان)

گزینه 1 سه‌گانه – هپاتیت ب

گزینه 2 MMR به تنهایی

گزینه 3 فلج اطفال –MMR

گزینه 4 سه‌گانه – فلج اطفال

نمایش پاسخ

سوال 9

براساس برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون در سن ۱۸ ماهگی کدام واکسن‌های زیر باید تجویز گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 سه‌گانه، فلج اطفال، MMR

گزینه 2 سه‌گانه، فلج اطفال

گزینه 3 سه‌گانه، MMR

گزینه 4 سه‌گانه، فلج اطفال، هپاتیت B

نمایش پاسخ

الف

سوال 10

اگر شروع واکسیناسیون ثلاث (DPT) برای کودکی در ۵ سال و ۱۰ ماهگی بوده باشد، طبق جدول واکسیناسیون، یادآور دوم او را در چه زمانی تزریق می‌کنید؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 یادآور دوم نیاز ندارد.

گزینه 2 ۶ ماه تا یک سال بعد از یادآور اول

گزینه 3 ۶ ماه تا یک سال بعد از نوبت سوم

گزینه 4 دوگانه بزرگسال ۶ ماه تا یک سال بعد از یادآور اول

نمایش پاسخ

الف

سوال 11

در صورتی که واکسن‌های زنده ویروسی به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرند، فاصله‌ی بین آن‌ها حداقل باید چند روز باشد؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۳۰

گزینه 2 ۴۵

گزینه 3 ۶۰

گزینه 4 ۷۵

نمایش پاسخ

الف

سوال 12

واکسیناسیون کودکان HIV مثبت فاقد علامت چگونه است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 فقط BCG را دریافت نمی‌کنند.

گزینه 2 طبق برنامه‌ی ایمن‌سازی انجام می‌شود.

گزینه 3 MMR و OPV را دریافت نمی‌کنند.

گزینه 4 اصلاً واکسیناسیون انجام نمی‌شود.

نمایش پاسخ

ب

سوال 13

خانم بارداری سابقه‌ی هیچ‌گونه واکسیناسیون کزاز ندارد. در ماه ششم بارداری جهت مراقبت به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده است. توصیه‌ی شما جهت ایمن‌سازی این خانم علیه بیماری کزاز چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تبریز)

گزینه 1 تزریق بعد از زایمان

گزینه 2 یک بار تزریق

گزینه 3 دو بار تزریق

گزینه 4 سه بار تزریق

نمایش پاسخ

ج

سوال 14

کودک ۶ ساله‌ای به دنبال یک مشکل پزشکی، گاماگلوبولین وریدی دریافت می‌کند از سویی در شش سالگی باید قطره‌ی فلج اطفال دریافت کند. برنامه‌ی واکسیناسیون وی چگونه خواهد بود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 با فاصله‌ی ۳ ماه بعد از تزریق گاماگلوبولین، واکسیناسیون انجام شود.

گزینه 2 با فاصله‌ی ۶ ماه بعد از تزریق گاماگلوبولین، واکسیناسیون انجام شود.

گزینه 3 بدون تغییر زمانی اما باید از فرم تزریقی IPV استفاده شود.

گزینه 4 نیازی به تغییر برنامه‌ی زمانی واکسیناسیون وجود ندارد.

سوال 15

استفاده از کدامیک از واکسن‌های زیر در زنان باردار مجاز نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز/پزشکی شهریور۹۵ _ قطب زنجان)

گزینه 1 هپاتیت ب

گزینه 2 پولیو خوراکی

گزینه 3 دوگانه بزرگسالان

گزینه 4 سرخک

سوال 16

اگر در هنگام درمان فرد مشکوک به هپاتیت B، سوزنی به دست دندان‌پزشک فرو رود و دندان‌پزشک سابقه‌ی واکسیناسیون هپاتیت B داشته و تیتراژ آنتی‌بادی آن ۵ واحد بین‌الملل باشد، کدام اقدام زیر لازم است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 مجدداً یک دوره‌ی کامل واکسیناسیون را انجام دهد.

گزینه 2 ۵ سی‌سی ایمنوگلوبولین اختصاصی تزریق کند.

گزینه 3 همزمان واکسیناسیون و تزریق ۵ سی‌سی ایمنوگلوبولین را انجام دهد.

گزینه 4 با توجه به سابقه‌ی واکسیناسیون و تیتراژ آنتی‌بادی نیاز به اقدام خاصی ندارد.

سوال 17

مادری فرزند خود را به علت تشکیل نشدن اسکار در محل تزریق واکسن BCG نزد شما آورده است. توصیه و اقدام شما چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۵ _ مشترک کشوری)

گزینه 1 تزریق مجدد واکسن با دوز قبلی

گزینه 2 تزریق مجدد واکسن با ۲ برابر دوز قبلی

گزینه 3 توصیه به مراجعه‌ی مجدد پس از ۳ ماه

گزینه 4 اطمینان دادن به مادر که نیازی به واکسیناسیون مجدد نیست.

سوال 18

همه‌ی موارد زیر به عنوان معیارهای فرآیند در برنامه‌ی واکسیناسیون کودکان مطرح می‌باشند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۳ - قطب شمال)

گزینه 1 درصد رضایت والدین از خدمت ارائه شده

گزینه 2 درصد ایجاد سطح قابل قبول پاسخ ایمنی

گزینه 3 درصد انجام به موقع واکسیناسیون

گزینه 4 درصد شناسایی کودکان واجد شرایط

سوال 19

کدام واکسن در اثر یخ‌زدگی تغییر ماهیت داده و قابل استفاده نیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 هپاتیت B

گزینه 2 BCG

گزینه 3 MMR

گزینه 4 فلج اطفال

سوال 20

در حال حاضر واکسن پنج‌گانه (پنتاوالان) در ایران در چه سنی تزریق می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد/پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب زنجان)

گزینه 1 بدو تولد، دو ماهگی، چهار ماهگی

گزینه 2 دو ماهگی، چهار ماهگی، شش ماهگی

گزینه 3 بدو تولد، شش ماهگی، هجده ماهگی

گزینه 4 شش ماهگی، دوازده ماهگی، هجده ماهگی

نمایش پاسخ

ب

سوال 21

در افراد مبتلا به ایدز تزریق کدام واکسن ممنوع است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 سه‌گانه

گزینه 2 هپاتیت ب

گزینه 3 ب.ث.ژ

گزینه 4 فلج اطفال تزریقی

نمایش پاسخ

ج

سوال 22

طبق برنامه‌ی رایج واکسیناسیون کشوری، کودکان تا یک سالگی چند نوبت واکسن سه‌گانه دریافت می‌کنند؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۲

گزینه 2 ۳

گزینه 3 ۴

گزینه 4 ۵

نمایش پاسخ

ب

سوال 23

در کدام مورد، تجویز واکسن هپاتیت B ممنوع است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 زنان باردار

گزینه 2 فرد HBSAg+

گزینه 3 فرد با نقص ایمنی

گزینه 4 ممنوعیتی ندارد

نمایش پاسخ

د

سوال 24

تجربه‌ی کدامیک از افراد زیر به ساخت واکسن آبله‌ی انسانی کمک کرد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 جان اسنو

گزینه 2 ایگنز سام لی واز

گزینه 3 ادوارد جنر

گزینه 4 دال وهیل

نمایش پاسخ

ج

سوال 25

کدامیک از واکسن‌های زیر در افراد مبتلا به ایدز منع استفاده دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب آزاد)

گزینه 1 ب.ث.ژ

گزینه 2 هپاتیت ب

گزینه 3 دیفتری

گزینه 4 کزاز

نمایش پاسخ

الف

سوال 26

تزریق واکسن کدام نوع هپاتیت در سنین زیر یک سالگی ممنوع است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 هپاتیت A

گزینه 2 هپاتیت B

گزینه 3 هپاتیت C

گزینه 4 هپاتیت D

نمایش پاسخ

الف

کودک افغانی ۴ سال و دو ماهه‌ای که سابقه‌ی هیچ‌گونه واکسیناسیونی ندارد را برای ایمن‌سازی به مرکز بهداشت آورده‌اند. با توجه به برنامه‌ی ایمن‌سازی کشوری یادآور دوم ثلاث این کودک در چه سنی تلقیح خواهد شد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۵ سال و چهار ماهگی

گزینه 2 شش سالگی

گزینه 3 ۶ سال و چهار ماهگی

گزینه 4 نیاز ندارد

نمایش پاسخ

د

طبق برنامه‌ی جاری واکسیناسیون کشوری در ۱۲ ماهگی کدام واکسن تلقیح می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 MMR

گزینه 2 OPV

گزینه 3 IPV

گزینه 4 DPT

نمایش پاسخ

الف

کدامیک از واکسن‌های زیر در طبقه‌ی میانی با پایینی یخچال نگهداری می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 دوگانه (دیفتری – کزاز)

گزینه 2 BCG

گزینه 3 MMR

گزینه 4 فلج اطفال

نمایش پاسخ

الف

کدام گزینه در مورد واکسیناسیون BCG صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 واکسن در ناحیه‌ی سرین تزریق می‌گردد.

گزینه 2 تا سن ۶ سالگی نیاز به انجام تست مانتو است.

گزینه 3 تلقیح واکسن تا پایان ۱۳ سالگی ضروری است.

گزینه 4 در سن سه ماهگی و بالاتر واکنش (آبسه) در عرض ۷۲ ساعت در محل تزریق غیر طبیعی است.

نمایش پاسخ

د

بیماری ۱۵ ساله همودیالیز می‌شود برای واکسیناسیون هپاتیت B مراجعه کرده است. در هر بار چند میلی‌لیتر واکسن باید تزریق شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 ۰/۰۵

گزینه 2 ۰/۱

گزینه 3 ۱

گزینه 4 ۲

نمایش پاسخ

د

در کدامیک از شرایط زیر واکسیناسیون باید تکرار شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 هپاتیت ب در کودک نارس

گزینه 2 ب.ث.ژ در تعویض خون نوزاد

گزینه 3 قطره‌ی فلج اطفال در اسهال شدید

گزینه 4 هپاتیت ب در زردی نوزادی

نمایش پاسخ

ج

در افراد مبتلا به ایدز، مجاز به تجویز تمامی واکسن‌های زیر می‌باشیم بجز: (پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 واکسن سرخک

گزینه 2 واکسن ب.ث.ژ

گزینه 3 واکسن ثلاث

گزینه 4 واکسن هپاتیت B

نمایش پاسخ

ب

سوال 34

شیرخواری را در ۴ ماهگی به مرکز بهداشتی درمانی آورده‌اند وی به علت عدم نزول بیضه طی ۲ هفته‌ی آینده تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت با توجه به سن و شرایط شیرخوار کدام گزینه‌ی زیر در مورد ایمن‌سازی صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 پنج‌گانه

گزینه 2 پنج‌گانه- فلج اطفال تزریقی

گزینه 3 پنج‌گانه- فلج اطفال خوراکی- فلج اطفال تزریقی

گزینه 4 فعلاً واکسنی تجویز نمی‌شود و بعد از دوره‌ی نقاهت عمل مراجعه نماید.

نمایش پاسخ

ج

سوال 35

در صورت تزریق گاماگلوبولین عضلانی به کودکان، فاصله‌ی تجویز واکسن‌های ویروسی ضعیف شده (بجز واکسن پولیو خوراکی و تب زرد) با گاماگلوبولین حداقل چند ماه می‌بایست باشد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 ۱

گزینه 2 ۳

گزینه 3 ۶

گزینه 4 ۲

نمایش پاسخ

ب

سوال 36

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد واکسیناسیون شیرخواران در ۴ ماهگی صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 فلج اطفال خوراکی- سه‌گانه- هپاتیت B

گزینه 2 فلج اطفال خوراکی- پنج‌گانه- فلج اطفال تزریقی

گزینه 3 فلج اطفال خوراکی- پنج‌گانه- هپاتیت B

گزینه 4 سه‌گانه- فلج اطفال تزریقی- هپاتیت B

نمایش پاسخ

ب

سوال 37

حداکثر مهلت دریافت ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت ب در نوزادان که از مادر HBsAg مثبت متولد شده است، چه مدت پس از تولد است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 ۱۲ ساعت

گزینه 2 ۷ روز

گزینه 3 ۲۴ ساعت

گزینه 4 ۱۴ روز

نمایش پاسخ

ب

سوال 38

به علت عدم کنترل درجه حرارت یخچال، کلیه واکسن‌های داخل یخچال یخ زدند در چنین شرایطی کدامیک از واکسن‌ها قابل استفاده است؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 دوگانه

گزینه 2 کزاز

گزینه 3 MMR

گزینه 4 هپاتیت

نمایش پاسخ

سوال 39

اگر ویال واکسن MMR را در ساعت ۸ صبح باز نمودید تا چه مدت آن را مورد استفاده قرار می‌دهید؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 پایان کار روزانه

گزینه 2 پایان تاریخ انقضاء

گزینه 3 شش ساعت بعد از آماده‌سازی

گزینه 4 پایان محتویات آن

نمایش پاسخ

سوال 40

شیرخوار یک ساله‌ای هفته‌ی گذشته نوبت اول واکسن سرخک را دریافت کرده است. امروز به علت بیماری بستری شده و ایمونوگلوبولین وریدی دریافت کرده است. چه اقدامی در مورد واکسن سرخک وی صحیح است؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب زنجان)

گزینه 1 نیازی به تجدید دوباره‌ی واکسن نیست.

گزینه 2 واکسن مجدداً سه ماه بعد تجویز شود.

گزینه 3 واکسن مجدداً شش ماه بعد تجویز شود.

گزینه 4 باید براساس تیتراژ آنتی‌بادی تصمیم گرفت.

نمایش پاسخ

سوال 41

در بیماران هموفیلی واکسن هپاتیت B به چه صورت تزریق می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 زیرجلدی

گزینه 2 داخل جلدی

گزینه 3 عضلانی

گزینه 4 فرقی ندارد

نمایش پاسخ

سوال 42

ویال‌های آماده شده‌ی واکسن BCG و MMR پس از چند ساعت باید دور ریخته شوند؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان / دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- مشترک کشوری)

گزینه 1 ۲ ساعت

گزینه 2 ۶ ساعت

گزینه 3 ۱۲ ساعت

گزینه 4 ۲۴ ساعت

نمایش پاسخ

ب. ویال‌های واکسن BCG و MMR از زمان باز شدن فقط ۶ ساعت قابل مصرف هستند.

سوال 43

کدامیک از واکسن‌های زیر در ۶ ماهگی تجویز می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 سه‌گانه – MMR

گزینه 2 MMR

گزینه 3 سه‌گانه – قطره‌ی فلج اطفال – هپاتیت B

گزینه 4 سه‌گانه

نمایش پاسخ

سوال 44

در افرادی که به علت شغل ممکن است با حیوانات هار تماس داشته باشند. در صورتی که سابقه‌ی حساسیت شدید نسبت به واکسن‌های قبلی را ذکر نکنند. واکسن یادآور هاری چگونه تزریق می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 هر سال یک یادآور

گزینه 2 هر دو سال یک یادآور

گزینه 3 هر سه سال یک یادآور

گزینه 4 یادآور تزریق نمی‌شود.

نمایش پاسخ

سوال 45

کودک ۱۲ ساله‌ای مبتلا به تالاسمی جهت دریافت واکسن کزاز به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است. چند میلی‌لیتر واکسن به این کودک تزریق می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ۰/۱

گزینه 2 ۰/۵

گزینه 3 ۱

گزینه 4 ۲

نمایش پاسخ

سوال 46

کدام گزینه به منظور پیشگیری از بیماری هپاتیت B توسط دندان‌پزشک پس از فرو رفتن سوزن به دست وی در هنگام کار با فرد مشکوک صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 بررسی تیتتر آنتی‌بادی و در صورت بالاتر بودن از ۱۰ واحد بین‌المللی و داشتن سابقه‌ی واکسیناسیون، اقدامی لازم نیست.

گزینه 2 فوراً لازم است یک دوره‌ی واکسیناسیون مجدد در سه نوبت برعلیه بیماری هپاتیت B انجام شود.

گزینه 3 تزریق یک دوز HBIG در اسرع‌وقت حتی با واکسینه شدن دندان‌پزشک، لازم است.

گزینه 4 در صورت مثبت بودن HBsAg تزریق مجدد واکسن هپاتیت B برای دندان‌پزشک خطرناک است.

نمایش پاسخ

سوال 47

همه‌ی موارد زیر از موارد اصلی مصرف ایمونوگلوبین هپاتیت B (HBIG) محسوب می‌گردد، بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 کودکان ۱۰ ساله و بالاتر که واکسینه نشده‌اند.

گزینه 2 نوزادان مادران مبتلا به هپاتیت B طی سه ماهه‌ی دوم و سوم حاملگی

گزینه 3 کلیه افرادی که با افراد HBASg+ تماس جنسی داشته‌اند.

گزینه 4 کلیه افرادی که تماس با سر سوزن آلوده به ترشحات بیمار HBASg+ داشته‌اند.

نمایش پاسخ

سوال 48

ایمن‌سازی علیه بیماری هپاتیت B برای گروه‌های پرخطر با چند ماه فاصله از نوبت اول انجام می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 یک

گزینه 2 سه

گزینه 3 شش

گزینه 4 دوازده

نمایش پاسخ

سوال 49

در کودک نارس کدامیک از واکسن‌های زیر در ۱۸ ماهگی تلقیح می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 پنتاوالان

گزینه 2 سه‌گانه- فلج اطفال

گزینه 3 سه‌گانه- فلج اطفال- MMR

گزینه 4 سه‌گانه- فلج اطفال- هپاتیت B

نمایش پاسخ

سوال 50

شیرخوار ۲ ماهه‌ای جهت دریافت واکسن به مرکز بهداشتی درمانی آورده شده است. پس از خوراندن قطره‌ی فلج، مادر اظهار می‌دارد که شیرخوار دچار اسهال شدید است. کدام اقدام زیر را توصیه می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 تکرار یک دوز قطره روز بعد

گزینه 2 تکرار یک دوز قطره یک هفته بعد

گزینه 3 تکرار یک دوز قطره یک ماه بعد

گزینه 4 نیازی به تکرار نیست

نمایش پاسخ

ج

سوال 51

در خانم‌های باردار، کدام گروه از واکسن‌ها منع مصرف دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب شیراز)

گزینه 1 پولیو- هپاتیت B

گزینه 2 MMR- سه‌گانه

گزینه 3 MMR- تب زرد

گزینه 4 پولیو- شیر زرد

نمایش پاسخ

ب

سوال 52

تیتراژ آنتی‌بادی برای هپاتیت ب در یک دانشجوی پزشکی، ۳ ماه پس از دریافت یک دوره‌ی واکسن هپاتیت ب معادل ۲۰ واحد بین‌المللی در میلی‌لیتر است. اقدام بعدی چیست؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 تلقیح یک نوبت واکسن هپاتیت ب با دوز معمولی

گزینه 2 تلقیح ۳ نوبت واکسن هپاتیت ب با دوز معمولی

گزینه 3 تلقیح ۳ نوبت واکسن هپاتیت ب با دوز دو برابر

گزینه 4 نیازی به دوز بوستر ندارد.

نمایش پاسخ

د

سوال 53

ماهیت واکسن «ب.ث.ژ» کدامیک از موارد زیر است؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان)

گزینه 1 شبه سم

گزینه 2 میکروب زنده‌ی ضعیف شده

گزینه 3 میکروب کشته شده

گزینه 4 آنتی‌ژن سطحی میکروب

نمایش پاسخ

ب

سوال 54

کدام گزینه، در گروه واکسن‌های غیر زنده (غیر فعال) قرار می‌گیرد؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 ب. ث. ژ

گزینه 2 MMR (سرخک، سرخچه، اوریون)

گزینه 3 فلج اطفال خوراکی

گزینه 4 هپاتیت ب

نمایش پاسخ

د

سوال 55

واکسن هپاتیت B در برنامه‌ی واکسیناسیون عمومی کشوری کدامیک از دوره‌های زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 بدو تولد - ۲ ماهگی - ۴ ماهگی

گزینه 2 بدو تولد - ۲ ماهگی - ۱۲ ماهگی

گزینه 3 بدو تولد - ۶ ماهگی - ۱۲ ماهگی

گزینه 4 بدو تولد - ۲ ماهگی - ۶ ماهگی

نمایش پاسخ

د

سوال 56

ماهیت کدامیک از واکسن‌های زیر آنتی‌ژن سطحی ویروس است؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 فلج اطفال

گزینه 2 آنفولانزا

گزینه 3 سرخک

گزینه 4 هپاتیت B

نمایش پاسخ

سوال 57

در برنامه‌ی واکسیناسیون کودکی که در سن ۸ سالگی بدون سابقه‌ی واکسیناسیون مراجعه نموده است. در اولین مراجعه چه واکسن‌هایی را دریافت خواهد نمود؟
(پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 دوگانه بزرگسال- فلج اطفال- ب.ث.ژ- هپاتیت B

گزینه 2 ثلاث- فلج اطفال- MMR- هپاتیت ب

گزینه 3 دوگانه بزرگسالان- فلج اطفال- هپاتیت MMR-B

گزینه 4 ثلاث- فلج اطفال- MMR- ب.ث.ژ

نمایش پاسخ

سوال 58

منع مطلق مصرف واکسن‌ها چیست؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 سابقه‌ی زردی پس از تولد

گزینه 2 وجود سابقه‌ی حساسیت، آسم و سایر تظاهرات آلرژیک

گزینه 3 وجود سابقه‌ی خانوادگی تشنج

گزینه 4 واکنش شدید آنافیلاکسی پس از تجویز واکسن

نمایش پاسخ

سوال 59

تجویز واکسن کدام بیماری‌ها محدودیت سنی دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 هپاتیت ب – سیاه‌سرفه

گزینه 2 دیفتری – سیاه‌سرفه

گزینه 3 سیاه‌سرفه – هموفیلوس

گزینه 4 هپاتیت ب – هموفیلوس

نمایش پاسخ

سوال 60

در برنامه‌ی کشوری واکسیناسون در کودکان زیر ۶ سال، واکسن MMR در چند نوبت و چه سنی تزریق می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب مشهد)

گزینه 1 دو نوبت- ۱۲ و ۱۸ ماهگی

گزینه 2 یک نوبت- ۱۲ ماهگی

گزینه 3 دو نوبت- ۱۲ ماهگی و ۶ ماهگی

گزینه 4 سه نوبت- ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۶ سالگی

نمایش پاسخ

سوال 61

مادری با فرزند ۱۳ ساله‌اش به علت زخم در پا هنگام بازی در باغچه‌ی خانه به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده است. در صورتی که کودک برنامه‌ی واکسیناسیون کشوری را به طور کامل انجام داده باشد چه اقدامی در خصوص واکسیناسیون برای کودک مذکور توصیه می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۴- قطب مشهد)

گزینه 1 تزریق آمپول تتابولین برای کودک

گزینه 2 تزریق یک واکسن دوگانه برای کودک

گزینه 3 تزریق واکسن دوگانه و آمپول تتابولین برای کودک

گزینه 4 اقدام خاصی از نظر واکسیناسیون لازم ندارد

نمایش پاسخ

سوال 62

در کدامیک از شرایط زیر واکسن هپاتیت ب با دوز دو برابر مقدار معمول بزرگسالان تلقیح می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 نوزادان

گزینه 2 افراد مبتلا به هپاتیت C

گزینه 3 بزرگسالان دیالیزی

گزینه 4 پرسنل بهداشتی درمانی

نمایش پاسخ

سوال 63

کدامیک از واکسن‌های زیر در بدو تولد استفاده نمی‌شود؟ (پزشکی و دندان پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 فلج اطفال

گزینه 2 سرخک- سرخجه- اوریون

گزینه 3 هپاتیت ب

گزینه 4 ب.ث. ژ

نمایش پاسخ

ب

سوال 64

کدامیک از انواع هپاتیت‌های زیر اشکال مزمن ایجاد نمی‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵ و اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه B 1

گزینه A 2

گزینه C 3

گزینه D 4

نمایش پاسخ

ب. هپاتیت A و E احتمال مزمن شدن ندارند.

سوال 65

در کودکان کوچک‌تر از ۲ سال تزریق واکسن معمولاً در کدام ناحیه صورت می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 دلتویید

گزینه 2 قدامی خارجی ران

گزینه 3 قدامی داخلی ران

گزینه 4 عضله‌ی دوسر

نمایش پاسخ

ب

سوال 66

حداقل تیتراژ آنتی‌بادی هپاتیت ب (HBsAb) که نشان دهنده‌ی محافظت بیمار در مقابل ویروس است. چقدر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵ و اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 1000mIU/ml

گزینه 2 1mIU/ml

گزینه 3 100mIU/ml

گزینه 4 10mIU/ml

نمایش پاسخ

د

سوال 67

واکسن پنتاوالان از همه‌ی بیماری‌های زیر پیشگیری می‌کند، بجز: (پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 آنفولانزا

گزینه 2 سیاه‌سرفه

گزینه 3 دیفتری

گزینه 4 هپاتیت ب

نمایش پاسخ

الف

سوال 68

در برنامه‌ی رایج واکسیناسیون کشوری در چهار ماهگی کدام گروه از واکسن‌های زیر تلقیح می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 پنتاوالان – IPV

گزینه 2 DPT- MMR

گزینه 3 پنتاوالان –BCG

گزینه 4 هپاتیت B-DPT

نمایش پاسخ

الف

سوال 69

شایع‌ترین علت هپاتیت‌های حاد و مزمن و کارسینومای کبدی در ایران کدام نوع ویروس است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 HAV

گزینه 2 HBV

گزینه 3 HCV

گزینه 4 HDV

نمایش پاسخ

ب. برو به سبب سبز پاتولوژی!

سوال 70

در حال حاضر براساس برنامه‌ی کشوری ایمن‌سازی، واکسن فلج اطفال تزریقی در چه سنی تزریق می‌گردد؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 دو ماهگی

گزینه 2 چهار ماهگی

گزینه 3 شش ماهگی

گزینه 4 دوازده ماهگی

نمایش پاسخ

ب

سوال 71

در نوزادان متولد شده از مادران HIV مثبت، واکسن هپاتیت B چگونه تجویز می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 مطابق با برنامه‌ی جاری ایمن‌سازی

گزینه 2 یک ماه پس از برنامه‌ی جاری ایمن‌سازی

گزینه 3 پس از ۲ سالگی

گزینه 4 پس از ۵ سالگی

نمایش پاسخ

الف

سوال 72

کدام گزینه در مورد انواع هپاتیت درست نیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 تظاهرات خارج کبدی در سیر هپاتیت A بیش‌تر از هپاتیت B است.

گزینه 2 پیش‌آگهی هپاتیت C بهتر از هپاتیت B مزمن است.

گزینه 3 لازمه‌ی وقوع هپاتیت D، مثبت بودن HBsAg است.

گزینه 4 هپاتیت a عمدتاً از طریق تماس مدفوعی – دهانی انتقال می‌یابد.

نمایش پاسخ

الف

سوال 73

در کدامیک از موارد زیر می‌توانید واکسیناسیون سرخجه را انجام دهید؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 شش ماه قبل از بارداری

گزینه 2 دوران بارداری

گزینه 3 دوران بیماری تب‌دار

گزینه 4 ضعف ایمنی

نمایش پاسخ

الف

سوال 74

کودکی با سن ۷ سال و دو ماه جهت انجام واکسیناسیون مراجعه و تاکنون سابقه‌ی تزریق هیچ واکنشی را ندارد. در اولین مراجعه برای این کودک چه واکسن‌هایی تجویز می‌شود؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 BCG, OPV, Hep B, MMR, dT

گزینه 2 OPV, Hep B, MMR, DPT

گزینه 3 OPV, Hep B, MMR, dT

گزینه 4 BCG, OPV, Hep B, DPT

نمایش پاسخ

ج

سوال 75

در سیر طبیعی بیماری هپاتیت A، شدت و دوره‌ی آن نسبت به هپاتیت B به ترتیب چگونه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 شدت برابر- دوره‌ی کوتاه‌تر

گزینه 2 شدت بیش‌تر- دوره‌ی کوتاه‌تر

گزینه 3 شدت کم‌تر- دوره‌ی کوتاه‌تر

گزینه 4 شدت برابر- دوره‌ی بلندتر

نمایش پاسخ

ج. برو به سبب سبز ویروس!

سوال 76

تزریق و تجویز کدامیک از واکسن‌های زیر در بدو تولد صحیح و کامل است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 هیاتیت B- قطره‌ی فلج خوراکی – سل

گزینه 2 هیاتیت B- پنتاوالان

گزینه 3 سل و قطره‌ی فلج اطفال

گزینه 4 MMR و سل

نمایش پاسخ

الف

سوال 77

کدامیک از اجزای واکسن پنتاوالان میکروارگانسیم کشته شده است؟ (پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 دیفتری

گزینه 2 کزاز

گزینه 3 سیاه‌سرفه

گزینه 4 هموفیلوس آنفولانزای b

نمایش پاسخ

ج

سوال 78

کدامیک از واکسن‌های زیر باید ۶ ساعت بعد از آماده‌سازی دور ریخته شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 هیاتیت

گزینه 2 ثلاث

گزینه 3 فلج اطفال

گزینه 4 MMR

نمایش پاسخ

د

سوال 79

در برنامه‌ی کشوری واکسیناسیون ایران کدامیک از واکسن‌های زیر در بدو تولد تجویز می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 BCG – هیاتیت B – هموفیلوس آنفولانزای B

گزینه 2 BCG -هیاتیت MMR-B

گزینه 3 فلج اطفال – هیاتیت BCG-B

گزینه 4 هموفیلوس آنفولانزای B – فلج اطفال – MMR

نمایش پاسخ

ج

سوال 80

تمام موارد ذیل جزء اهداف برنامه‌ی واکسیناسیون هستند، بجز: (پزشکی شهریور ۹۶- هشت قطب مشترک)

گزینه 1 پیشگیری از بیماری تحت بالینی

گزینه 2 پیشگیری از بیماری بالینی

گزینه 3 کاهش میزان کشندگی

گزینه 4 افزایش ایمنی جامعه

نمایش پاسخ

ج

سوال 81

کودکان ایرانی به طور روتین در برابر همه‌ی بیماری‌های زیر واکسینه می‌شوند بجز: (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تهران)

گزینه 1 سیاه سرفه

گزینه 2 پنومونی پنوموکوکی

گزینه 3 اوریون

گزینه 4 هموفیلوس آنفولانزا تیپ B

نمایش پاسخ

ب

سوال 82

برای خانمی که به بیماری سرخجه مبتلا شده است و قصد بارداری دارد چه توصیه‌ای می‌کنید؟ (پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 اگر نیمه‌ی دوم سال ۸۲ واکسن سرخجه را دریافت نکرده واکسن زده و تا سه ماه باردار نشود.

گزینه 2 اگر نیمه‌ی دوم سال ۸۲ واکسن سرخجه را دریافت نکرده واکسن زده و بلافاصله باردار شود.

گزینه 3 واکسن تجویز می‌شود و می‌تواند باردار شود

گزینه 4 واکسن نیاز ندارد و می‌تواند باردار شود

نمایش پاسخ

الف. عدم پوشش در سیب سبز

سوال 83

کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 مادرانی که واکسن سرخجه را دریافت نموده‌اند باید تا مدت ۳ ماه از زمان واکسیناسیون باردار نشوند

گزینه 2 مادر باردار طی ماه هفتم و هشتم بارداری هر ۲ هفته یک بار و طی ماه نهم بارداری به صورت هفته‌ای باید ویزیت شود

گزینه 3 درجات شدید افسردگی پس از زایمان به دلیل تغییرات هیجانی- هورمونی نسبتاً شایع است

گزینه 4 انتقال توکسوپلاسموز از گربه به مادر باردار منجر به سقط جنین می‌شود

نمایش پاسخ

ج

سوال 84

کدامیک از واکسن‌های زیر در خانم باردار ممنوعیت تزریق دارد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 IPV

گزینه 2 تب زرد

گزینه 3 هپاتیت B

گزینه 4 آنفولانزای فصلی

نمایش پاسخ

ب

سوال 85

کدامیک از واکسن‌های زیر در بدو تولد تجویز نمی‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 BCG

گزینه 2 قطره‌ی فلج اطفال

گزینه 3 سرخک

گزینه 4 هپاتیت B

نمایش پاسخ

ج

سوال 86

کدامیک از موارد زیر برای واکسیناسیون کودکان HIV مثبت (بدون نشانه‌های بالینی ایدز) صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان)

گزینه 1 تنها واکسن‌های کشته شده توصیه می‌شود

گزینه 2 برنامه‌ی کامل واکسیناسیون کودکان با ارجحیت IPV به جای OPV توصیه می‌شود

گزینه 3 هیچ نوع واکسنی توصیه نمی‌شود

گزینه 4 کلیه‌ی واکسن‌های زنده و کشته شده بدون واکسن BCG توصیه می‌شود

نمایش پاسخ

ب

سوال 87

کدامیک از مداخلات زیر در زیر گروه مداخلات پیشگیری برای بیماری سرخک (Measles) قرار می‌گیرد؟ (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهرشتی)

گزینه 1 آموزش بهداشت

گزینه 2 تهویه‌ی مناسب منزل

گزینه 3 واکسیناسیون

گزینه 4 حمایت تغذیه‌ای

نمایش پاسخ

ج

سوال 88

کدامیک از موارد زیر درباره‌ی بیماری هپاتیت صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب اصفهان)

گزینه 1 سیر طبیعی هپاتیت B ارتباط مستقیمی با سن ابتلا به این عفونت دارد

گزینه 2 بسیاری از افراد با سابقه‌ی ابتلا به هپاتیت A ناقل مزمن محسوب می‌شوند

گزینه 3 سیر عفونت ناشی از ویروس هپاتیت B در شیرخواران معمولاً به صورت حاد است

گزینه 4 ویروس هپاتیت A به عنوان مهم‌ترین علت سیروز کبدی شناخته شده است

نمایش پاسخ

الف

سوال 89

واکسیناسیون MMR منجر به ایجاد ایمنی برعلیه همه‌ی ویروس‌های زیر می‌شود بجز: (پزشکی شهریور ۹۷- قطب شهیدبهشتی)

گزینه 1 فلج اطفال

گزینه 2 سرخک

گزینه 3 اوریون

گزینه 4 سرخجه

نمایش پاسخ

الف

سوال 90

کدامیک از واکسن‌های زیر در حاملگی ممنوع است؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 کزاز

گزینه 2 دیفتری

گزینه 3 سرخک

گزینه 4 هپاتیت B

نمایش پاسخ

ج. در حاملگی تزریق واکسن ویروسی زنده ممنوع است. واکسن سرخک در حاملگی ممنوع است.

سوال 91

کدامیک مصونیت فعال ایجاد نمی‌کند؟(پزشکی اسفند ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 تزریق ایمنوگلوبولین

گزینه 2 تزریق واکسن

گزینه 3 ابتلا به عفونت بالینی

گزینه 4 ابتلا به عفونت تحت بالینی

نمایش پاسخ

الف. تزریق واکسن مصونیت فعال ایجاد می‌کند اما تزریق ایمنوگلوبولین مصونیت غیر فعال ایجاد می‌کند.

سوال 92

خانمی جهت مشاوره‌ی پیش از بارداری مراجعه نموده، سابقه‌ی ابتلا به سرخجه ندارد. به توصیه‌ی پرسنل واکسن مربوطه تزریق شده است. باید تا چند ماه پس از تزریق واکسن باردار نشود؟ (پزشکی اسفند ۹۷- قطب اهواز)

گزینه 1 یک ماه

گزینه 2 دو ماه

گزینه 3 سه ماه

گزینه 4 چهار ماه

نمایش پاسخ

ج. بعد از تزریق واکسن سرخجه توصیه می‌شود که فرد تا ۳ ماه حامله نشود.

سوال 93

کدامیک از اقدامات زیر بر اساس رویکرد متمرکز بر پرخطری (the high – risk approach) انجام می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 اضافه شدن فلوراید به آب آشامیدنی در مناطق با فلوراید پایین

گزینه 2 واکسیناسیون دانشجویان دندان‌پزشکی بر علیه هپاتیت B

گزینه 3 اضافه کردن ید به نمک طعام مصرفی افراد جامعه

گزینه 4 آموزش پیشگیری از پوسیدگی به کارکنان شاغل در مراکز دندان‌پزشکی

نمایش پاسخ

ب. برای افراد پرخطر از جهت ابتلا به هپاتیت ب باید واکسیناسیون انجام بدیم. از جمله همه‌ی کادر درمان

سوال 94

افراد گروه پرخطر که واکسن هپاتیت B دریافت کرده‌اند، چه مدت بعد از دریافت آخرین دوز واکسن تیترا آنتی‌بادی (HBsAB) باید کنترل شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 ۱ تا ۲ ماه

گزینه 2 ۳ ماه

گزینه 3 ۶ ماه

گزینه 4 نیاز به کنترل ندارد.

نمایش پاسخ

الف. به طور معمول ۳۰ تا ۶۰ روز پس از واکسیناسیون باید تیترا آنتی‌بادی تعیین شود.

سوال 95

کدامیک از موارد زیر جزء منع واکسیناسیون محسوب می‌شود؟ (دندانپزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 شل بودن مدفوع

گزینه 2 سرماخوردگی

گزینه 3 سوءتغذیه

گزینه 4 بیماری تب‌دار شدید

نمایش پاسخ

د. تب شدید کنترااندیکاسیون واکسیناسیون است.

سوال 96

تمام هپاتیت‌های ویروسی بیماری مزمن ایجاد می‌کنند، بجز: (دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 E

گزینه 2 B

گزینه 3 C

گزینه 4 D

نمایش پاسخ

الف. هپاتیت A و E احتمال مزمن شدن ندارند.

سوال 97

در کدامیک از موارد زیر احتمال مزمن شدن عفونت هپاتیت B بیش‌تر است؟ (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 آلوده شدن از طریق جفت ب)

گزینه 2 آلوده شدن در سن زیر 10 سال

گزینه 3 آلوده شدن در میانسالی ناشی از تماس جنسی

گزینه 4 آلوده شدن در میانسالی ناشی از تزریق سرنگ آلوده

نمایش پاسخ

الف. منظورش اون جفت نیستا. جفت جنینی رو می‌گه که شانس مزمن شدن رو بالا می‌بره.

سوال 98

در مورد بیماری هپاتیت همه‌ی گزینه‌های زیر درست است، بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان)

گزینه 1 در بیماری هپاتیت A حالت ناقلی مزمن وجود ندارد.

گزینه 2 دوره‌ی بیماری هپاتیت B طولانی‌تر از هپاتیت A است.

گزینه 3 سیر طبیعی بیماری هپاتیت B ارتباطی با سن ابتلا به این عفونت ندارد.

گزینه 4 شروع هپاتیت A ناگهانی بوده و میزان مرگ و میر آن کم است.

نمایش پاسخ

ج. سیر طبیعی بیماری هپاتیت B ارتباطی با سن ابتلا به این عفونت ندارد.

سوال 99

عامل مؤثر در ایجاد ایمنی جامعه (herd immunity) کدام است؟ (علوم پایه دندان‌پزشکی دی ۹۹-میان‌دوره)

گزینه 1 نوع پادتن ایجاد شده در بدن افراد

گزینه 2 ایمن‌سازی افراد جامعه

گزینه 3 تجویز سرم ایمنوگلوبولین

گزینه 4 ایمنی اکثریت افراد جامعه

نمایش پاسخ

د / عامل مؤثر در ایجاد ایمنی جامعه، ایمنی اکثریت افراد جامعه است.

بهداشت دهان و دندان

تعدادسوال: ۱۲۵

درجه سختی: متوسط

نکات:۱-تجمع پلاک عامل اصلی بیماری لثه میباشد

۲-اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی

اهمیت و میزان سختی سئوالات پزشکی و دندان‌پزشکی مشابه است.

خودآزمایی

سوال 1

کدامیک از موارد زیر در خصوص پوسیدگی دندان صحیح است؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب شیراز)

گزینه 1 دندان‌هایی که شیارهایی کم عمق تر و برجستگی‌های کوچک‌تری دارند نسبت به پوسیدگی حساس‌ترند.

گزینه 2 عوامل ژنتیکی نقشی در ایجاد پوسیدگی ندارند.

گزینه 3 خوردن پنیر در آخرین وعده‌ی غذایی می‌تواند در کاهش پوسیدگی دندان مؤثر باشند.

گزینه 4 مقدار مصرف کربوهیدرات‌ها در یک وعده نسبت به تعداد دفعات مصرف آن، نقش بیش‌تری در ایجاد پوسیدگی دارد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 2

با چه میزان فلوراید آب آشامیدنی در مناطق مختلف کشور، توزیع دهان‌شویه توصیه می‌شود؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 کم‌تر از ۰/۴ پی پی ام

گزینه 2 کم‌تر از ۰/۵ پی پی ام

گزینه 3 کم‌تر از ۰/۶ پی پی ام

گزینه 4 کم‌تر از ۰/۷ پی پی ام

نمایش پاسخ

الف

سوال 3

در کسانی که پوسیدگی فعال دندانی دارند فلوراید تکمیلی تا چه سنی توصیه می‌گردد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اصفهان)

گزینه 1 ۱۶ سالگی

گزینه 2 ۶ سالگی

گزینه 3 ۱۲ سالگی

گزینه 4 ۱۸ سالگی

نمایش پاسخ

الف

سوال 4

هزینه- اثربخش‌ترین راهکار جوامع برای پیشگیری از پوسیدگی دندان چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز/دندان شهریور ۹۴_ قطب شمال/ دندان اسفند ۹۵_ قطب دانشگاه آزاد)

گزینه 1 آموزش مصرف موادغذایی حاوی فلوئور

گزینه 2 استفاده از خمیردندان حاوی فلوئور

گزینه 3 اضافه کردن فلوئور به آب آشامیدنی

گزینه 4 تجویز دهان‌شویه حاوی فلوئور

نمایش پاسخ

ج

سوال 5

مینای لکه‌دار دندان Mottled enamel در اثر افزایش مصرف کدام ترکیب شیمیایی ذیل ایجاد می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب همدان)

گزینه 1 فلوراید

گزینه 2 آهن

گزینه 3 سرب

گزینه 4 جیوه

نمایش پاسخ

سوال 6

کدامیک از میکروارگانیس‌م‌های زیر نقش کلیدی در ایجاد پوسیدگی دندان دارد؟ (پزشکی اسفند ۹۳- قطب کرمان/دندان شهریور ۹۴ _ قطب شمال / سیب _ دندان شهریور ۹۴ _ قطب تبریز)

گزینه 1 استرپتوکوک موتانس

گزینه 2 لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

گزینه 3 استافیلوکوک اورئوس

گزینه 4 هلیکوباکتریلوری

نمایش پاسخ

سوال 7

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد عوامل محیطی مربوط به پوسیدگی دندان صحیح نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 نوع ماده‌ی غذایی مصرفی در ایجاد پوسیدگی نقش دارد.

گزینه 2 تعداد دفعات مصرف مواد قندی در ایجاد پوسیدگی نقش ندارد.

گزینه 3 وجود فلوراید در محیط از جمله آب در پیشگیری از پوسیدگی نقش دارد.

گزینه 4 مصرف بیش از حد فلوراید، ممکن است منجر به پوسیدگی دندان شود.

نمایش پاسخ

سوال 8

چه میزانی از فلوراید در آب آشامیدنی می‌تواند بیش‌ترین میزان مقاومت را در دندان‌ها در مقابل پوسیدگی ایجاد نماید؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب کرمان/ دندان شهریور ۹۴ _ قطب تبریز/ دندان پزشکی اسفند۹۴ _ قطب شمال/ دندان اسفند۹۵ وشهریور ۹۷ _ قطب شمال/دندان پزشکی اسفند ۹۶ _ قطب تبریز)

گزینه 1 1ppm

گزینه 2 1/5ppm

گزینه 3 0/5ppm

گزینه 4 2ppm

نمایش پاسخ

سوال 9

ابتدایی‌ترین ضایعات فلوروزیس دندان به چه صورتی دیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 مینای زرد

گزینه 2 مینای قهوه‌ای سوخته

گزینه 3 مینای لکه‌دار (mottled)

گزینه 4 مینای شیاردار

نمایش پاسخ

سوال 10

مقدار فلوراید آب آشامیدنی در کدام مقدار زیر بیش‌ترین مقاومت را در دندان‌ها ایجاد می‌کند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ۰/۵ppm

گزینه 2 ۱ppm

گزینه 3 ۱/۵ppm

گزینه 4 ۲ppm

نمایش پاسخ

سوال 11

در میان گروه‌های موادغذایی کدامیک بیش‌ترین تأثیر را در ایجاد پوسیدگی دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 کربوهیدرات

گزینه 2 چربی‌ها

گزینه 3 غلات

گزینه 4 پروتئین‌ها

نمایش پاسخ

سوال 12

بزاق با تمام مکانیسم‌های زیر نقش پیشگیری در پوسیدگی دندان دارد بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 شویندگی

گزینه 2 خنثی‌کنندگی

گزینه 3 ایجاد محیط اسیدی

گزینه 4 ضد میکروبی

نمایش پاسخ

ج

سوال 13

«مثلث اپیدمیولوژیک» برای ایجاد پوسیدگی شامل کدامیک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تبریز/دندان اسفند ۹۶ _ قطب تبریز)

گزینه 1 عوامل محیطی- عوامل ژنتیکی- عوامل فردی

گزینه 2 میزبان- عوامل محیطی- میکروارگانیسم‌ها

گزینه 3 میزبان- پلاک دندان- بزاق

گزینه 4 بزاق- عوامل ژنتیکی- عوامل فردی

نمایش پاسخ

ب

سوال 14

کدام گزینه در مورد فلئوروزیس دندان صحیح‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 موجب بروز لکه‌های زرد یا قهوه‌ای در عاج دندان می‌شود.

گزینه 2 در صورت مصرف آب آشامیدنی حاوی فلوراید بیش از ۰/۷PPM ممکن است ایجاد شود.

گزینه 3 در حالت خفیف به صورت لکه‌های زرد بر روی سطح دندان دیده می‌شود.

گزینه 4 در اثر مصرف خمیردندان حاوی فلوراید در سنین زیر یک سال با درجات متوسط دیده می‌شود.

نمایش پاسخ

ب

سوال 15

کدام مورد در زمینه‌ی نقش تغذیه در ایجاد پوسیدگی دندان صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 در حال حاضر به صرفه‌ترین روش پیشگیری کنترل مصرف مواد قندی است.

گزینه 2 کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها در ایجاد پوسیدگی کنترل مصرف تأثیر بیش‌تری دارند.

گزینه 3 تعداد دفعات مصرف قندها در یک روز بیش‌تر از مقدار مصرف در یک وعده اهمیت دارد.

گزینه 4 میزان فلوراید آب آشامیدنی تأثیر زیادی در پیشگیری از پوسیدگی ندارد.

نمایش پاسخ

ج

سوال 16

کدامیک از موارد زیر، جزء نقش‌های اصلی بزاق در پیشگیری از پوسیدگی‌های دندانی محسوب نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان)

گزینه 1 ضد میکروبی

گزینه 2 شویندگی

گزینه 3 خنثی‌کنندگی

گزینه 4 ترمیم

نمایش پاسخ

د

سوال 17

کدامیک از ویژگی‌های رژیم غذایی در پوسیدگی دندان نقش بیش‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 تعداد دفعات مصرف کربوهیدرات

گزینه 2 میزان مصرف کربوهیدرات‌ها در هر وعده

گزینه 3 تعداد دفعات مصرف چربی‌ها در یک روز

گزینه 4 میزان مصرف لبنیات در یک روز

نمایش پاسخ

سوال 18

با توجه به شواهد موجود، کدامیک از موارد زیر به طور مستقیم با بیماری‌های لثه و دندان مرتبط است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 استعمال دخانیات

گزینه 2 استرس روحی

گزینه 3 وضعیت اقتصادی

گزینه 4 سن

نمایش پاسخ

الف

سوال 19

کدامیک از گزینه‌های زیر معادل با جدا شدن لثه از دندان به علت التهاب با عفونت است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 سلولیت

گزینه 2 پلیکال

گزینه 3 پاکت پرپودنتال

گزینه 4 موکوزیت

نمایش پاسخ

ج

سوال 20

مهم‌ترین علت ابتلا به بیماری لثه کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز/دندان پزشکی شهریور ۹۵ _ قطب تبریز/ دندان پزشکی شهریور ۹۵_قطب شمال)

گزینه 1 سیگار

گزینه 2 تجمع پلاک دندانی

گزینه 3 افزایش سن

گزینه 4 استرس‌های روحی

نمایش پاسخ

ب

سوال 21

در مورد بیماری بافت‌های نگهدارنده‌ی دندان کدام گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 تجمع پلاک دندانی مهم‌ترین علت ابتلا به آن محسوب می‌شود.

گزینه 2 بیماری‌های سیستمیک اکتسابی نقش عمده در بروز آن دارند.

گزینه 3 ژنژیویت در اکثر موارد به بیماری پرپودونتیت پیشرفته منتهی می‌شود.

گزینه 4 پیشگیری از بروز آن باید در گروه‌های سنی بالاتر و به صورت فردی انجام شود.

نمایش پاسخ

الف

سوال 22

شایع‌ترین بیماری سیستمیک که افراد را برای ابتلا بیماری لثه مستعد می‌کند، کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تهران)

گزینه 1 افزایش فشار خون

گزینه 2 کم‌خونی

گزینه 3 بیماری مزمن قلبی

گزینه 4 دیابت

نمایش پاسخ

د

سوال 23

مهم‌ترین علت بروز بیماری‌های لثه کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 بیماری‌های سیستمیک

گزینه 2 تجمع پلاک دندانی

گزینه 3 استعمال دخانیات

گزینه 4 استرس‌های روحی

نمایش پاسخ

ب

سوال 24

در گزارش بررسی وضعیت سلامت دندان یک جامعه ۸۰% از Scxtant ها خون‌ریزی داشته‌اند، کدام اقدام مناسب است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب اهواز)

گزینه 1 درمان طبی

گزینه 2 آموزش

گزینه 3 جراحی لثه

گزینه 4 کارگذاری پروتز

نمایش پاسخ

ب

سوال 25

کدامیک از شاخص‌های ذیل مهم‌ترین شاخصی است که نشان دهنده‌ی میزان ابتلا مردم به پوسیدگی دندان است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب آزاد)

گزینه 1 DMFT

گزینه 2 CPTTN

گزینه 3 edentulousness

گزینه 4 BPE

نمایش پاسخ

الف

سوال 26

شاخص DMFT عبارت است از: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- مشترک کشوری)

گزینه 1 تعداد دندان‌های کشیده شده هریک از افراد جامعه

گزینه 2 تعداد دندان‌های پوسیده، پر شده و کشیده شده هر یک از افراد جامعه

گزینه 3 میانگین تعداد دندان‌های پوسیده، پر شده و کشیده شده تمام افراد جامعه

گزینه 4 میانگین تعداد دندان‌های پوسیده و پر شده تمام افراد جامعه

نمایش پاسخ

ج

سوال 27

شاخص dmft در یک دختر ۸ ساله ۴ است. میزان این شاخص در کدام سطح پوسیدگی قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب اهواز)

گزینه 1 کم

گزینه 2 متوسط

گزینه 3 بالا

گزینه 4 خیلی بالا

نمایش پاسخ

ب

سوال 28

دندان‌پزشکی بعد از معاینه‌ی دهان و دندان یک بیمار ۴۰ ساله در پرونده‌ی او شاخص ارزیابی وضعیت لثه (CPITN) را با Score با کد چهار ثبت کرده است. کدامیک از وضعیت‌های زیر را مشاهده نموده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 وجود جرم

گزینه 2 پاکت کم عمق

گزینه 3 خون‌ریزی لثه

گزینه 4 پاکت عمیق

نمایش پاسخ

د

سوال 29

مهم‌ترین شاخصی که برای ارزیابی میزان ابتلا به پوسیدگی دندانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/دندان پزشکی اسفند و شهریور ۹۴ _ قطب تبریز)

گزینه 1 درصد افراد بدون دندان پوسیده (Caries free)

گزینه 2 تعداد دندان‌های پوسیده، کشیده شده و پر شده (DMFT)

گزینه 3 تعداد دندان‌های پوسیده (DT)

گزینه 4 تعداد دندان‌های کشیده شده (MT)

نمایش پاسخ

ب

سوال 30

ارزیابی سطوح دندان‌های دائمی از نظر پوسیدگی، تخریب و پر شدن در کدام شاخص در نظر گرفته می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 DMFT

گزینه 2 Dmft

گزینه 3 DMFS

گزینه 4 Dmfs

نمایش پاسخ

الف

سوال 31

براساس شاخص CPITN (ارزیابی وضعیت تنه‌ی افراد جامعه) اگر فردی در معاینه‌ی کلینیک دارای جرم‌دندانی (Calculus) باشد در کدام Sever قرار می‌گیرد؟
(دندان‌پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال)

گزینه 1 یک

گزینه 2 دو

گزینه 3 سه

گزینه 4 چهار

نمایش پاسخ

ب

سوال 32

در معاینه‌ی وضعیت لثه به وجود پاکت عمیق چه نمره‌ای از CPTN تعلق می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ۱

گزینه 2 ۲

گزینه 3 ۳

گزینه 4 ۴

نمایش پاسخ

د

سوال 33

میانگین DMFT در کدام مقدار زیر به عنوان میانگین متوسط گروه‌بندی می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 ۲/۶-۱/۲

گزینه 2 ۴/۴-۲/۷

گزینه 3 ۶/۵-۲/۵

گزینه 4 بیش از ۶/۶

نمایش پاسخ

ب

سوال 34

Score 3 در بررسی پریودنتال نشان دهنده‌ی کدامیک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 پاکت کم عمق

گزینه 2 پاکت عمیق

گزینه 3 وجود جرم‌دندانی

گزینه 4 پاکت خیلی عمیق

نمایش پاسخ

الف

سوال 35

مهم‌ترین شاخص ارزیابی سلامت دندان کدامیک از موارد زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب تبریز)

گزینه 1 درصد پوسیدگی

گزینه 2 DMFT

گزینه 3 درصد بی‌دندانی

گزینه 4 CPITN

نمایش پاسخ

ب

سوال 36

شاخص ارزیابی وضعیت لثه‌ی افراد جامعه از نظر خون‌ریزی لثه، وجود جرم، وجود پلاکت کم عمق و عمیق کدام است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شمال/دندان اسفند ۹۵- قطب تهران/ دندان شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 DMFT

گزینه 2 Dmft

گزینه 3 DMFS

گزینه 4 CPITN

نمایش پاسخ

د

سوال 37

شاخص وضعیت پوسیدگی سطوح دندان‌های شیری کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 DmfbDmfb

گزینه 2 Dmft

گزینه 3 Dmfn

گزینه 4 Dmfs

نمایش پاسخ

ب. (هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ dmft است)

سوال 38

ارزیابی سطوح دندان‌های شیری از نظر پوسیدگی، تخریب و پر شدن در کدام شاخص زیر در نظر گرفته می‌شوند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب شمال)

گزینه 1 DMFT

گزینه 2 Dmfs

گزینه 3 DMFS

گزینه 4 Dmft

نمایش پاسخ

د. (هیچکدام از گزینه‌ها صحیح نیست. پاسخ dmft است)

سوال 39

کدامیک از گروه‌های ذکر شده به عنوان گروه هدف برنامه‌ی کشوری ادغام بهداشت دهان و دندان در شبکه قلمداد نمی‌گردد؟ (پزشکی شهریور ۹۴- قطب همدان)

گزینه 1 زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله

گزینه 2 زنان باردار و شیرده

گزینه 3 کودکان زیر ۶ سال

گزینه 4 کودکان ۶ تا ۱۲ سال

نمایش پاسخ

الف

سوال 40

کدامیک از اهداف سلامت WHO برای کودکان ۵-۶ ساله در حال حاضر مناسب‌تر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 ۹۰ درصد افراد همه‌ی دندان‌های خود را حفظ کرده باشند.

گزینه 2 DMFT بیش از یک نباشد.

گزینه 3 ۹۰ درصد فاقد پوسیدگی دندان باشند.

گزینه 4 در ۹۰ درصد افراد همه‌ی نواحی لثه سالم باشند.

نمایش پاسخ

ج

سوال 41

در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه‌های بهداشتی کدامیک از گروه‌های زیر به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان/ پزشکی شهریور ۹۳- قطب همدان)

گزینه 1 سالمندان

گزینه 2 کودکان زیر ۶ سال

گزینه 3 نوجوانان

گزینه 4 همه‌ی گروه‌های سنی

نمایش پاسخ

ب

سوال 42

کدامیک از گروه‌های زیر هدف سلامت خدمات دهان و دندان نیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب زنجان/دندان پزشکی شهریور ۹۴ _ قطب شمال)

گزینه 1 زنان باردار

گزینه 2 کودکان زیر ۱۲ سال

گزینه 3 سالمندان

گزینه 4 زنان شیرده

نمایش پاسخ

ج

سوال 43

در تعریف ارائه شده از سوی انجمن دندان پزشکی آمریکا کدام مورد جزء وظایف ریشه‌ی سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی است؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 انجام تحقیقات کاربردی در دندان پزشکی

گزینه 2 درمان و کنترل بیماری‌های دهان و دندان

گزینه 3 بررسی جمعیت و تنظیم خانواده و نقش آن بر سلامت دهان و دندان

گزینه 4 ارائه‌ی خدمات درمانی به بیماران خاص

نمایش پاسخ

الف

سوال 44

در رابطه با طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه‌ی (PHC) نیروهای درگیر در سطح دوم کدامند؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد/دندان پزشکی شهریور ۹۵ _ قطب زنجان)

گزینه 1 بهداشت‌کاران دهان و دندان

گزینه 2 کاردان‌های بهداشت خانواده

گزینه 3 رابطین بهداشت

گزینه 4 بهورزان

نمایش پاسخ

الف

سوال 45

کدامیک از موارد زیر جزء وظایف بهورزان در رابطه با بهداشت دهان و دندان نیست؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۴- قطب کرمان)

گزینه 1 مراجعه به مدارس تحت پوشش، بیماریابی و ارجاع

گزینه 2 معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان زنان باردار و شیرده

گزینه 3 آموزش بهداشت دهان و دندان به زنان و کودکان

گزینه 4 انجام عمل جرم‌گیری برای زنان باردار و شیرده

نمایش پاسخ

د

سوال 46

در حال حاضر مقرون به صرفه‌ترین روش پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها در جوامع کدام است؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 مصرف دهان‌شویه حاوی فلوراید

گزینه 2 مصرف غذاهای دریایی حاوی فلوراید

گزینه 3 اضافه کردن فلوراید به آب آشامیدنی در مناطق با فلوراید کم

گزینه 4 صرف قرص فلوراید

نمایش پاسخ

ج

سوال 47

اگر افراد به مدت طولانی در مناطق دارای آب آشامیدنی که بیش از حد مجاز فلوراید دارند زندگی نمایند دچار عارضه‌ای بنام می‌شوند؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 خشکی دهان (xerostomia)

گزینه 2 فلوروزیس دندان

گزینه 3 پریودنتیت

گزینه 4 ژنژریویت

نمایش پاسخ

ب

سوال 48

در مورد تأثیر دهان‌شویه فلوراید کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (دندان پزشکی اسفند ۹۵- قطب تبریز)

گزینه 1 مصرف دهان‌شویه فلوراید در مناطقی که میزان فلوراید آن بالاتر از حد طبیعی است باعث فلوروزیس می‌شود.

گزینه 2 تأثیر دهان‌شویه فلوراید موضعی است.

گزینه 3 مصرف دهان‌شویه‌ی فلوراید باعث دمینرالیزاسیون سطح داخلی مینا می‌شود.

گزینه 4 توزیع دهان‌شویه در مناطقی که فلوراید آب آشامیدنی آن بالاتر از ۴/۰ ppm است در اولویت است.

نمایش پاسخ

ب

سوال 49

میزان تجویز فلوراید مکمل جهت کودکان ۳- ۶ سال که غلظت فلوراید آب آشامیدنی آن‌ها ۴ / ۰-۶۰۰ است. کدامیک از عبارات ذیل است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵-
قطب اهواز)

گزینه 1 0/5PPM

گزینه 2 0/7PPM

گزینه 3 0/25PPM

گزینه 4 1PPM

نمایش پاسخ

ج

سوال 50

کدامیک از علائم ذیل در بیماری پریودنتال دیده نمی‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 تحلیل استخوان نگهدارنده‌ی دندان

گزینه 2 ایجاد پاکت پریودنتال

گزینه 3 ایجاد پاکت کاذب لثه

گزینه 4 تحلیل بافت نرم نگهدارنده‌ی دندان

نمایش پاسخ

ج

سوال 51

چه میزان فلوراید در آب آشامیدنی می‌تواند باعث فلوروزیس دندانی گردد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 ۰/۶PPM

گزینه 2 ۰/۳-۰/۷ppm

گزینه 3 زیر ۱PPM

گزینه 4 مصرف طولانی‌مدت آب آشامیدنی حاوی فلوراید بیش از حد مجاز

نمایش پاسخ

د

سوال 52

لایه‌ی نرم متشکل از باکتری‌های سازمان یافته بر روی دندان که باعث پوسیدگی و التهاب لثه می‌گردد چه نامیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 ماتریا آلبا (Materia Alba)

گزینه 2 پلیکل (plicle)

گزینه 3 پلاک دندانی (Dental Pluqe)

گزینه 4 الف و ب

نمایش پاسخ

ج

سوال 53

در کدام نوع رادیوگرافی، فیلم در مجاورت گروه دندانی مورد نظر در هر دو فک قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 رادیوگرافی پری اپیکال

گزینه 2 رادیوگذافی بایت وینگ

گزینه 3 رادیوگرافی اکلوزال

گزینه 4 رادیوگرافی پانورامیک

نمایش پاسخ

ب

سوال 54

معمولاً کدام دندان‌های دائمی در سن ۶ سالگی رویش می‌کنند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 دندان‌های مولر اول و سانترال‌های قدامی مندیبل

گزینه 2 دندان‌های سانترال و لترال مندیبل و ماگزिला

گزینه 3 دندان‌های سانترال و لترال ماگزिला و مولر اول

گزینه 4 مولر اول ماگزिला و مولرهای اول و دوم

نمایش پاسخ

الف

سوال 55

برداشت قسمت‌های پوسیده شده‌ی سطح ریشه‌ی دندان و جایگزینی آن با مواد مخصوص به کدام رشته‌ی دندان‌پزشکی ارتباط بیش‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵-
قطب شیراز)

گزینه 1 دندان‌پزشکی ترمیمی

گزینه 2 درمان بیماری‌های ریشه‌ی (اندودانتیکس)

گزینه 3 بیماری‌های دهان و فک و صورت

گزینه 4 آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت

نمایش پاسخ

الف

سوال 56

بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های لثة کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب کرمان)

گزینه 1 استفاده از خمیردندان‌های ضدپلاک و ضد جرم

گزینه 2 کنترل پلاک دندان‌ی از طریق استفاده از دهان‌شویه

گزینه 3 جرم‌گیری و برساژ دندان‌ها توسط دندان‌پزشک

گزینه 4 کنترل پلاک دندان‌ی از طریق مسواک زدن

نمایش پاسخ

د

سوال 57

کدامیک از شاخص‌های زیر درصد افراد بدون پوسیدگی را نشان می‌دهد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 caries free

گزینه 2 Dental fluorosis

گزینه 3 Decay missing filling tooth

گزینه 4 perecent of edentulousness

نمایش پاسخ

الف

سوال 58

کودک ۸ ساله‌ای با پوسیدگی دندان فعال در منطقه‌ای با غلظت فلوراید بین (0-0/2) ppm زندگی می‌کند مقدار مطلوب دریافت فلوراید روزانه برحسب میلی‌گرم چقدر
است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 ۰/۷۵

گزینه 2 ۱

گزینه 3 ۰/۵

گزینه 4 ۰/۲۵

نمایش پاسخ

ب

سوال 59

همه‌ی گزینه‌های زیر در رابطه با وظایف دندان‌پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در راستای طرح دانش‌آموزی صحیح است بجز: (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب
مشهد)

گزینه 1 تنظیم اطلاعات آماری مورد نیاز

گزینه 2 آموزش به معلم داوطلب در مدرسه

گزینه 3 ارائه‌ی خدمات ترمیم در دانش‌آموزان

گزینه 4 جراحی‌های فک و صورت

نمایش پاسخ

د

سوال 60

کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد پوسیدگی دندان صحیح است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران/دندان اسفند ۹۵ _قطب شمال)

گزینه 1 بیماری باکتریایی نسوج کلسیفیه دندان است.

گزینه 2 از طریق عوامل غیر باکتریایی سبب تخریب دندان می‌شود.

گزینه 3 با پیشرفت بیماری‌های پریودنتال ایجاد می‌گردد.

گزینه 4 کربوهیدرات‌ها در ایجاد آن تأثیر کم‌تری از سایر مواد غذایی دارند.

نمایش پاسخ

الف

سوال 61

مینای لکه‌دار (Mottled enamel) چیست؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب تهران)

گزینه 1 در اثر فلوئوروزیس بسیار شدید به وجود می‌آید

گزینه 2 ضایعات مینای دندان در اثر کاهش مصرف فلوراید

گزینه 3 نوعی از پوسیدگی دندان‌ی در سطح مینا است

گزینه 4 ضایعات مینای دندان در اثر افزایش مصرف فلوراید

نمایش پاسخ

د

سوال 62

کدام شاخص زیر برای ارزیابی سلامت دندان‌ها در گروه سنی ۶۵ ساله به بالا استفاده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 DMFT

گزینه 2 CPITN

گزینه 3 Caries Free

گزینه 4 Percent of edentulousness

نمایش پاسخ

د

سوال 63

mottled enamel در چه حالتی دیده می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 فلوروزیس دندان‌ی

گزینه 2 xerostomia

گزینه 3 بیماری پریودنتال

گزینه 4 فعالیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

نمایش پاسخ

الف

سوال 64

DMFT به چه معنی است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 مجموع دندان‌های پوسیده شده- از دست داده شده به علتی غیر از پوسیدگی و سالم

گزینه 2 مجموع دندان‌های ازدست رفته به علت پوسیدگی- از دست رفته به علتی غیر از پوسیدگی و پوسیده

گزینه 3 مجموع دندان‌های پوسیده شده- غیر پوسیده و پرشده

گزینه 4 مجموع دندان‌های پوسیده شده- ازدست داده شده به علت پوسیدگی و پرشده

نمایش پاسخ

د

سوال 65

در میان مواد غذایی که مصرف می‌شوند کدام مواد تأثیر بیش‌تری روی پوسیدگی دارند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب تبریز)

گزینه 1 چربی‌ها

گزینه 2 کربوهیدرات‌ها

گزینه 3 ویتامین‌ها

گزینه 4 پروتئین‌ها

نمایش پاسخ

ب

سوال 66

براساس شاخص ارزیابی وضعیت لثی افراد جامعه (CPTTN) «وجود پاکت کم عمق» معادل کدام score زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 score 1

گزینه 2 score 2

گزینه 3 score 3

گزینه 4 score 4

نمایش پاسخ

ج

سوال 67

مجموع تعداد دندان‌های شیری پوسیده، پرشده و کشیده شده را چه می‌نامند؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 DMFT

گزینه 2 DMFS

گزینه 3 dmft

گزینه 4 dmfs

نمایش پاسخ

ج

سوال 68

مینای لکه‌دار (mottled enamel) به کدامیک از گزینه‌های زیر ارتباط دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب مشهد)

گزینه 1 تجمع پلاک دندان‌ی روی مینا

گزینه 2 مراحل نخست فلوئوروزیس دندان

گزینه 3 مراحل شدید فلوئوروزیس دندان

گزینه 4 مراحل اولیه‌ی دمینرالیزاسیون دندان

نمایش پاسخ

ب

سوال 69

شاخص DMFT در جامعه‌ای برابر با ۳ است. ابتدا به پوسیدگی و سایر مشکلات دندان‌ی در این جامعه چگونه است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 خیلی کم

گزینه 2 کم

گزینه 3 متوسط

گزینه 4 زیاد

نمایش پاسخ

ج

سوال 70

علامت شروع فلوئوروزیس روی دندان‌ها به صورت کدامیک از لکه‌های زیر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شمال، اصفهان و کرمان)

گزینه 1 قهوه‌ای

گزینه 2 سفید

گزینه 3 زرد

گزینه 4 قهوه‌ای سوخته

نمایش پاسخ

ب

سوال 71

توزیع دهان‌شویه‌ها در ایران در مناطقی با چه میزان فلوراید آب آشامیدنی توصیه می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب اهواز)

گزینه 1 کم‌تر از 0.4ppm

گزینه 2 کم‌تر از 0.5ppm

گزینه 3 کم‌تر از 0.6ppm

گزینه 4 کم‌تر از 0.7ppm

نمایش پاسخ

الف

سوال 72

بوجود آمدن خشکی دهان (xerostomia) اختلال در کدام عامل مثلث اپیدمیولوژیک است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز، همدان و زنجان)

گزینه 1 عوامل مربوط به میزبان

گزینه 2 عوامل محیطی

گزینه 3 میکروارگانیسم‌ها

نمایش پاسخ

الف

سوال 73

عارضه‌ی فلوئوروزیس دندانی در کدام منطقه شایع‌تر است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۶- قطب شیراز، همدان و زنجان)

گزینه 1 مناطق با آب و هوای معتدل و میزان فلوراید حدود 1ppm

گزینه 2 مناطق با آب و هوای گرم و میزان فلوراید بیش‌تر از 1ppm

گزینه 3 مناطق با آب و هوای گرم و میزان فلوراید 0.6-0.7ppm

گزینه 4 مناطق با آب و هوای نسبتاً خشک و میزان فلوراید کم‌تر از 1ppm

نمایش پاسخ

ب

سوال 74

در مناطقی که آب و هوای گرم دارند چه میزان از فلوراید آب آشامیدنی، نیاز بدن را تأمین می‌نماید؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۴- قطب آزاد)

گزینه 1 1.1-1.2ppm

گزینه 2 1.3-4.4ppm

گزینه 3 0.6-0.7ppm

گزینه 4 1.4-1.5ppm

نمایش پاسخ

ج

سوال 75

کدامیک از افراد زیر در طرح ادغام سیستم شبکه مسئول ارائه‌ی سطح یک خدمات بهداشت دهان و دندان است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۵- قطب شمال)

گزینه 1 بهداشت کاران دهان و دندان

گزینه 2 دندان‌پزشکان عمومی

گزینه 3 دندان‌پزشکان متخصص

گزینه 4 بهورزان

نمایش پاسخ

د

سوال 76

افراد شاغل در تیم دندان‌پزشکی، در معرض خطر همه‌ی هپاتیت‌های ویروسی زیر هستند، بجز: (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اصفهان)

گزینه 1 HBV

گزینه 2 HCV

گزینه 3 HDV

گزینه 4 HEV

نمایش پاسخ

د

سوال 77

بهترین راهکار پیشگیری از پوسیدگی دندان ناشی از سندروم شیشه شیر چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب اهواز)

گزینه 1 آموزش با تأکید بر افزایش آگاهی

گزینه 2 آموزش با تأکید بر تغییر نگرش

گزینه 3 آموزش خود مراقبتی دهان

گزینه 4 درمان لزیون‌ها

نمایش پاسخ

ج

سوال 78

طرح استفاده از دهان‌شویه‌ی فلوراید در مدارس ابتدایی کشور در کدامیک از استراتژی‌های پیشگیری از پوسیدگی طبقه‌بندی می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب مشهد)

گزینه 1 استراتژی جمعیتی

گزینه 2 استراتژی تمرکز روی افراد کم خطر

گزینه 3 استراتژی تمرکز روی افراد پر خطر

گزینه 4 استراتژی حمایتی

نمایش پاسخ

ج

سوال 79

لامینیت ویتیر با کدامیک از رشته‌های دندان‌پزشکی ارتباط بیش‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 ارتودنسی

گزینه 2 رادیولوژی

گزینه 3 پروتز ثابت

گزینه 4 پروتز متحرک

نمایش پاسخ

ج

سوال 80

کدام گزینه اهمیت اصلی شناخت تغییر رنگ‌های حفره‌ی دهان را بیان می‌کند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 تأثیر بر زیبایی و در نتیجه کیفیت زندگی بیمار

گزینه 2 تأثیر بر هزینه‌های درمان‌های دندان‌پزشکی بیمار

گزینه 3 تشخیص افتراقی نئوپلاسم‌های بدخیم

گزینه 4 تشخیص لثه و بافت‌های نگهدارنده‌ی سالم

نمایش پاسخ

ج

سوال 81

مهم‌ترین مزیت تکنیک تصویربرداری MRI چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۵- قطب شیراز)

گزینه 1 هزینه‌ی پایین نسبت به سایر روش‌ها

گزینه 2 نشان دادن جزییات بافت سخت

گزینه 3 عدم کاربرد اشعه‌ی یونیزاسیون

گزینه 4 زمان بسیار کوتاه تصویربرداری

نمایش پاسخ

ج

سوال 82

کدامیک از روش‌های فلوریداسیون زمان بر بوده و نیاز به پرسنل دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 آب میوه

گزینه 2 فلوراید موضعی

گزینه 3 قرص و قطره

گزینه 4 فلورایداسیون آب

نمایش پاسخ

ب

سوال 83

مهم‌ترین نحوه‌ی عمل فلوراید، در پیشگیری از پوسیدگی کدام گزینه‌ی زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب آزاد)

گزینه 1 اثر پیش رویشی و ترکیب شدن آن با هیدروکسی آپاتیت

گزینه 2 اثر پیش رویشی و معدنی شدن دوباره‌ی پوسیدگی‌های اولیه

گزینه 3 مداخله در مسیرهای متابولیک باکتری‌ها

گزینه 4 مصرف و جذب سیستمیک فلوراید

نمایش پاسخ

ب

سوال 84

کدامیک از گروه‌های زیر به عنوان گروه هدف در بهداشت دهان و دندان محسوب نمی‌شوند؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 کودکان تا ۶ سالگی

گزینه 2 کودکان ۶ تا ۱۲ سال

گزینه 3 نوجوانان

گزینه 4 زنان باردار

نمایش پاسخ

ج

کدام گزینه به «یافتن شواهد دندان پزشکی با استفاده از پژوهش‌های علمی اثبات شده برای کمک به تصمیم‌گیری‌های بالینی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی» اشاره دارد. (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 Community dentistry

گزینه 2 Evidence based dentistry

گزینه 3 Health promotion

گزینه 4 Dental public health

نمایش پاسخ

ب

کدام عملکرد از وظایف مستقیم دندان‌پزشک جامعه‌نگر در حیطه‌ی بیماری‌های دهان و دندان نیست؟ (پزشکی شهریور ۹۳- قطب تهران)

گزینه 1 پیشگیری از بیماری

گزینه 2 کنترل بیماری

گزینه 3 درمان کلینیکی بیماری

گزینه 4 ارتقای سطح سلامت

نمایش پاسخ

ج

روش مهر و موم کردن شیارهای اکلوزالی مستعد به پوسیدگی با استفاده از مواد رزینی چه نامیده می‌شود؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب شیراز)

گزینه 1 فلورایدتراپی

گزینه 2 پالپوتومی

گزینه 3 ترمیم

گزینه 4 فیشورسیلانت

نمایش پاسخ

د

روند Trend کلی پوسیدگی دندان در کشور ایران از سال ۱۳۳۶ تاکنون چگونه بوده است؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 کاهشی

گزینه 2 ابتدا کاهشی سپس افزایشی

گزینه 3 افزایشی

گزینه 4 ابتدا افزایشی سپس کاهشی

نمایش پاسخ

ج

کدامیک از موارد زیر جزء خدمات سطح یک دهان و دندان تقسیم می‌شود؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 معاینه و ثبت وضعیت دهان و دندان زنان باردار و شیرده و کودکان

گزینه 2 آموزش چهره به چهره

گزینه 3 مشارکت در طرح‌ها و تحقیقات کشوری

گزینه 4 شناسایی منطقه‌ی تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

نمایش پاسخ

الف

مقایسه‌ی آمارهای ایران و کشورهای صنعتی، نیاز به کدام مورد را در زمینه‌ی سلامت دهان و دندان نشان می‌دهد؟ (دندان پزشکی شهریور ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 ارائهی درمان‌های بیش‌تر به مردم

گزینه 2 توزیع بیش‌تر دهان‌شویه‌ی فلوراید

گزینه 3 ارتقای آگاهی و نگرش در زمینه‌ی سلامت دهان و دندان

گزینه 4 ارائهی آمار منظم و دقیق‌تر

نمایش پاسخ

ج

افزایش و کاهش کدام عامل شیمیایی زیر در آب آشامیدنی باعث تهدید سلامتی دندان می‌شود؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 سرب

گزینه 2 آهن

گزینه 3 فلوئور

گزینه 4 کادمیوم

نمایش پاسخ

ج

سوال 102

برای دو کودک ۵ ساله، که آب آشامیدنی محل زندگی آن‌ها به ترتیب محتوی 0/5PPM و 0/3 فلوراید است. میزان تکمیلی به ترتیب چند میلی‌گرم است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 ۰/۷۵-۰/۵

گزینه 2 ۰/۲۵-۰/۲۵

گزینه 3 ۰/۲۵-۰/۵

گزینه 4 ۰-۰/۲۵

نمایش پاسخ

ج

سوال 103

شاخص اپیدمیولوژیک درصد افراد بدون پوسیدگی caries free برای کدام گروه سنی بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 سالمندان

گزینه 2 میانسالان

گزینه 3 کودکان و نوجوانان

گزینه 4 جوانان

نمایش پاسخ

ج

سوال 104

مهم‌ترین عامل پوسیدگی دندان کدامیک از گزینه‌ها است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 رژیم غذایی

گزینه 2 آب

گزینه 3 هوا

گزینه 4 وراثت

نمایش پاسخ

الف. کربوهیدرات و قندهای مصرفی عامل اصلی پوسیدگی دندان هستند.

سوال 105

کدام گزینه در مورد تعریف دندان‌پزشکی اجتماعی صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اهواز)

گزینه 1 علم و عمل درمان بیماری‌های دهان

گزینه 2 ایجاد فرصت‌هایی به منظور اجرای درمان‌های مؤثر برای مشکلات سلامت دهان و مسائل مربوط به مراقبت‌های اولیه‌ی سلامت در حیطه‌ی فردی

گزینه 3 ارتقاء سلامت دهان و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه

گزینه 4 غیر قابل پیشگیری بودن بیماری‌های دهان یکی از معیارهای سلامت جامعه است.

نمایش پاسخ

ج. ازون سوالایی که درس خوندن نمی‌خواست! دندون‌پزشکی اجتماعی اومده که باعث ارتقاء سلامت دهان و بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی توی «جامعه» بشه

سوال 106

کدامیک از شاخص‌های زیر جهت بررسی «نیازهای درمانی پریودنتال» کاربرد دارد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب تبریز)

گزینه 1 CPITN

گزینه 2 IOTN

گزینه 3 PAR

گزینه 4 Dean’S Index

نمایش پاسخ

الف. CPITN مخفف چیه؟ Community Periodontal Index for Treatment Needs

سوال 107

در یک کلاس پنجم ابتدایی ۲۰ نفره اگر تعداد دندان‌های Missing=4 و Dcay=7 و Filling=6 باشد، شاخص DMFT آن چقدر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب زنجان)

گزینه 1 ۰.۶۵

گزینه 2 ۰.۹۵

گزینه 3 ۰.۷۵

گزینه 4 ۰.۸۵

نمایش پاسخ

د. طبق فرمول، جمع دندان‌های پوسیده، کشیده شده و پر شده میشه ۱۷. و ۱۷ تقسیم بر ۲۰ میشه چند؟

سوال 108

در شاخص DMFT حرف F نشان دهنده‌ی چیست؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 پوسیده

گزینه 2 از دست داده شده به علت پوسیدگی

گزینه 3 پرشده

گزینه 4 دندان

نمایش پاسخ

ج. حروف DMFT مخفف چیه؟ Decayed Missing Filled Teeth مثل ترتیب گزینه‌ها

سوال 109

شاخص CPITN برای ارزیابی کدامیک از موارد زیر مناسب است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷ و شهریور ۹۸- قطب شمال)

گزینه 1 اندازه‌گیری پوسیدگی‌ها

گزینه 2 نیازهای بهداشتی

گزینه 3 نیازهای درمانی

گزینه 4 اندازه‌گیری تأثیر درمان

نمایش پاسخ

ج. CPITN مخفف چیه؟ Community Periodontal Index for Treatment Needs

سوال 110

کدام گزینه مستقیماً به درمان بیماری نمی‌پردازد؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب کرمان)

گزینه 1 رشته‌ی آسیب‌شناسی

گزینه 2 رشته‌ی ترمیمی و زیبایی

گزینه 3 رشته‌ی دندان‌پزشکی جامعه‌نگر

گزینه 4 رشته‌ی ارتودنسی

نمایش پاسخ

ج

سوال 111

در مورد عوامل ایجادکننده‌ی پوسیدگی دندان، کدام عبارت صحیح است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب اصفهان و همدان)

گزینه 1 سه دسته عوامل ژنتیک، پلاک دندان‌ی و میکروارگانیسم‌ها، مثلث اپیدمیولوژیک پوسیدگی را تشکیل می‌دهد.

گزینه 2 کودکانی که والدینشان پوسیدگی دندان‌ی بیش‌تری داشته‌اند، به طور ژنتیکی استعداد بیش‌تری در ابتلا به پوسیدگی دارند.

گزینه 3 هر چه میزان مصرف کربوهیدرات‌ها در وعده‌های غذایی بیش‌تر باشد احتمال پوسیدگی دندان فرد بیش‌تر است.

گزینه 4 میکروارگانیسم گرم مثبت استرپتوکوک موتانس نقش کلیدی و شناخته شده‌ای در پوسیدگی دندان‌ی دارد.

نمایش پاسخ

دال. رد الف: ژنتیک، میکروارگانیسم و عوامل محیطی میشن مثلث اپیدمیولوژیک / رد ب: ژنتیک از طریق جنس دندان، علاقه به مصرف مواد قندی، قوام و ترکیبات بزاق و... در پوسیدگی نقش دارد / رد ج: تعداد دفعات مصرف قند مهمه نه میزان مصرف

سوال 112

آموزش «چهره به چهره» جزء وظایف کدام گروه زیر است؟ (دندان‌پزشکی شهریور ۹۸- قطب مشهد)

گزینه 1 دندان‌پزشکان

گزینه 2 بهورزان

گزینه 3 رابط‌های بهداشتی

گزینه 4 کاردان‌های بهداشت خانواده

نمایش پاسخ

الف. وظیفه خودته عزیزم. هر ۶تا وظیفه‌ی دندان‌پزشکا رو از کتاب مرور کن.

سوال 113

تمام گزینه‌های زیر گروه هدف در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه‌های بهداشتی درمانی هستند، بجز: (دندان‌پزشکی دی ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 کودکان از بدو تولد تا ۶ سالگی

گزینه 2 کودکان ۶-۱۲ سال

گزینه 3 نوجوانان ۱۲-۱۴ سال

گزینه 4 زنان باردار و شیرده

نمایش پاسخ

ج. گروه‌های هدف طرح ادغام کیان؟ کودکان از بدو تولد تا ۶ سالگی / کودکان ۶-۱۲ سال / زنان باردار و شیرده

سوال 114

در مورد ارتباط رژیم غذایی و پوسیدگی دندان‌ی گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 تأثیر پوسیدگی‌زایی مواد قندی بعد از رویش دندان‌ها و قبل از رویش آن‌ها یکسان است.

گزینه 2 مقدار مصرف قندها در ایجاد پوسیدگی دندان‌ی مهم‌تر از دفعات مصرف آن‌هاست.

گزینه 3 قندهای داخلی موجود در میوه‌جات و سبزیجات تازه پوسیدگی‌زایی فراوان دارند.

گزینه 4 شیرین‌کننده‌های جایگزین یا غیر قندی (حجیم و زیاد) غیر پوسیدگی‌زا هستند.

نمایش پاسخ

د. شیرین‌کننده‌های مصنوعی جایگزین یا غیرقندی مثل آسپارتام پوسیدگی ایجاد نمی‌کنند.

سوال 115

در مورد خمیر دندان‌های حاوی فلوراید کدام گزینه صحیح است؟ (دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 در کاهش پوسیدگی‌ها در سطح جامعه مؤثر نیست.

گزینه 2 مصرف کننده آزادی عمل در انتخاب دارد.

گزینه 3 خطر دریافت دوز بیش‌تر (overdose) ندارد.

گزینه 4 دوز فلوراید آن برای کودکان و بزرگسالان یکسان است.

نمایش پاسخ

ب. شما مختاری خمیردندون پونه بخری یا سنسوداین! هدف اضافه کردن فلوئور به خمیردندون کاهش پوسیدگیه و دوزش برای اطفال و بزرگسالان متفاوته. اگه از یه

حدی بیشتر بشه باعث اوردوز هم میشه.

سوال 116

در همه‌ی گزینه‌های زیر استفاده از پوشاندن شیارهای دندان‌ها با مواد مخصوص (Fissure sealant) می‌شود، بجز: (دندان‌پزشکی آذر ۹۷- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 کودکان دارای دندان شیری سالم

گزینه 2 کودکان با نیازهای خاص

گزینه 3 کودکان دارای پوسیدگی در دندان‌های شیری ($DMFS > 2$)

گزینه 4 کودک دارای یک دندان دائمی پوسیده محدود به سطح مینا

نمایش پاسخ

الف. فیشر سیلانت به مهر و موم کردن شیارهای اکلوزالی مستعد پوسیدگی با استفاده از مواد رزینی می‌گویند. پس برای کودکان با دندان‌های سالم استفاده نمی‌شود.

سوال 117

نقش بزاق در پیشگیری از پوسیدگی دندان به همه‌ی خاصیت‌های زیر مربوط است، بجز: (دندان‌پزشکی خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 ضد میکروبی

گزینه 2 خنثی کنندگی

گزینه 3 ملح زدایی

گزینه 4 شویندگی

نمایش پاسخ

د. بزاق دارای خاصیت‌های آنتی میکروبیال، شویندگی و خنثی کنندگی است.

سوال 118

در حال حاضر هزینه اثر بخش‌ترین روش پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها در جوامع کدام است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد و خرداد ۹۸- میان‌دوره‌ی کشوری)

گزینه 1 استفاده از پنیر به عنوان ماده ضد پوسیدگی در سطح مدارس

گزینه 2 استفاده از سبزی‌ها و میوه‌ها به عنوان ماده حاوی فلوراید

گزینه 3 ترویج استفاده از خمیر دندان‌های حاوی فلوراید در سطح جوامع

گزینه 4 اضافه کردن مصنوعی فلوراید به آب اشامیدنی در مناطق با فلوراید کم

نمایش پاسخ

د. بهترین روش پیشگیری از پوسیدگی از نظر هزینه- اثربخشی، اضافه کردن مصنوعی فلوراید به آب اشامیدنی در مناطق با فلوراید کم است.

سوال 119

کدام‌یک از موارد زیر از مشکلات شاخص DMFT است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب شمال)

گزینه 1 ثابت ماندن امتیاز نهایی یک فرد با گذشت زمان

گزینه 2 قائل شدن ارزش یکسان برای هر سه جزء

گزینه 3 امتیاز دندان پر شده بیش‌تر از اجزاء دیگر

گزینه 4 لحاظ کردن هر نوع از دست رفتن دندان

نمایش پاسخ

ب. به مشکل اساسی شاخص DMFT اینه که برای پوسیدگی، پرشدگی و از بین رفته ارزش یکسانی قائله

سوال 120

کدام‌یک از موارد زیر نشان‌دهنده‌ی تعداد سطوح درگیر در دندان‌های شیری است؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب تبریز)

گزینه 1 (m+f)/dmf

گزینه 2 (f/dmf)

گزینه 3 (M+F)/dmf

گزینه 4 dmfs

نمایش پاسخ

د. dmfs مخفف decayed/missing/filled surface هست و نشان دهنده‌ی سطوح (surface) درگیر توی دندانای شیریه.

سوال 121

در بروز بیماری‌های دندان و لثه کدام عامل نقش مهم‌تری دارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 ردیف نبودن دندان‌ها

گزینه 2 وجود پلاک میکروبی

گزینه 3 عدم وجود فلوراید در آب آشامیدنی

گزینه 4 ماندن غذا در بین دندان‌ها

نمایش پاسخ

ب. پلاک دندان‌ی لایه‌ی نرم متشکل از باکتری سازمان یافته بر روی دندان‌ه که باعث پوسیدگی و التهاب لثه میشه. این پلاک مهم‌ترین نقش رو توی بیماری دندان و لثه داره.

سوال 122

افزایش و کاهش کدام عامل شیمیائی زیر در آب آشامیدنی باعث تهدید سلامتی دندان می‌شود؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب همدان)

گزینه 1 سرب

گزینه 2 آهن

گزینه 3 فلوئور

گزینه 4 کادمیوم

نمایش پاسخ

ج. سؤال ازین راحت‌تر؟! افزایش فلوئور باعث فلوئوروزیس میشه و کاهشش باعث افزایش شانس پوسیدگی

سوال 123

کدام یک از گروه‌های سنی به عنوان گروه هدف در بهداشت دهان و دندان محسوب می شوند؟ (دندانپزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 ۶ تا ۱۱ ساله

گزینه 2 ۱۳ تا ۱۸ ساله

گزینه 3 جوانان

گزینه 4 سالمندان

نمایش پاسخ

الف. ج. گروه‌های هدف طرح ادغام کیان؟ کودکان از بدو تولد تا ۶ سالگی / کودکان ۶-۱۲ سال / زنان باردار و شیرده

سوال 124

کدام یک از موارد زیر جزء شرح وظایف دندانپزشک در مراکز بهداشتی درمانی است؟ (دندانپزشکی اسفند ۹۷- قطب زنجان)

گزینه 1 آموزش چهره به چهره

گزینه 2 ارائه خدمات بهداشتی – درمانی

گزینه 3 مشارکت در طرح ها و تحقیقات کشوری

گزینه 4 همه موارد فوق

نمایش پاسخ

د. شرح وظایف دندان‌پزشکا رو خوندی دیگه؟

سوال 125

کدام‌یک از موارد زیر به بعد پیشگیری در طرح کشوری بهداشت دهان دانش آموزان مقطع ابتدایی اشاره ندارد؟ (دندان‌پزشکی اسفند ۹۷- قطب مشهد)

گزینه 1 تهیه‌ی شناسنامه‌ی دندان‌پزشکی

گزینه 2 نظارت بر تغذیه‌ی سالم دانش آموزان و آموزش آن

گزینه 3 اجرای برنامه‌ی استفاده از دهان‌شویه سدیم فلوراید

گزینه 4 نظارت بر اجرای استفاده از دهان‌شویه در مدارس

نمایش پاسخ

ب. گزینه‌ی ب برخلاف سه گزینه‌ی دیگه ربط مستقیمی به دندون نداره!